


MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NA SUB-BACIA DO RIO PARÁ

RELATÓRIO ANUAL 2007



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Instituto Mineiro de Gestão das Águas





Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

**MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NA BACIA
DO RIO PARÁ EM 2007**

Relatório Anual

Belo Horizonte
Dezembro/2008

**SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável**

Secretário

José Carlos Carvalho

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Diretoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Marília de Carvalho Melo

Gerência de Monitoramento e Geoprocessamento

Zenilde das Graças Guimarães Viola

Coordenação do Projeto Águas de Minas

Wanderlene Ferreira Nacif

FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente

Presidente

José Cláudio Junqueira Ribeiro

CETEC – Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

Presidente

Alfredo Gontijo de Oliveira

Diretoria de Desenvolvimento e Serviços Tecnológicos

Marcílio César de Andrade

Coordenação do Setor de Medições Ambientais – SAM

José Antônio Cardoso

Coordenação do Setor de Análises Químicas

Olguita Geralda Ferreira Rocha

Coordenação do Setor de Recursos da Água

Agostinho Clóvis da Silva

I59m

Instituto Mineiro de Gestão das Águas.
Monitoramento da qualidade das águas
superficiais na Bacia do Rio Pará em 2007. --- Belo
Horizonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas,
2008.
152p. : mapas

Relatório anual.

1. Qualidade da água – Minas Gerais. 2. Bacia
Hidrográfica do Rio Pará. II. Título

CDU: 556.51(815.1)



QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

REALIZAÇÃO:

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Diretoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Marília de Carvalho Melo, Engenheira Civil - Diretora

Gerência de Monitoramento e Geoprocessamento

Zenilde das Graças Guimarães Viola, Química - Gerente

Coordenação do Projeto Águas de Minas

Wanderlene Ferreira Nacif, Química - Coordenadora

Equipe Técnica

Ângela Aparecida Pezzuti, Geógrafa

Beatriz Trindade Laender, Geógrafa

Cristiane Freitas de Azevedo Barros, Bióloga

Igor Lacerda Ferreira, Geógrafo

Katiane Cristina de Brito Almeida, Bióloga

Laylla Gabrielle Borges Correia, Estagiária

Leonardo Corradi Coelho, Geógrafo

Lívia Marcelle Evangelista Borges, Estagiária

Ludmila Vieira Lage, Estatística

Milton Olavo de Paiva Franco, Químico

Mariana Moreira Nunes de Carvalho, Ecóloga

Nádia Antônia Pinheiro Santos, Geógrafa

Patrícia Sena Coelho, Bióloga

Priscilla Lacombe Retes, Estagiária

Raquel Souza Mendes, Bióloga

Regina Márcia Pimenta de Mello, Bióloga

Rômulo Cajueiro de Melo, Biólogo

Sérgio Pimenta Costa, Biólogo

Thiago Augusto Borges Rodrigues, Biólogo

Vanessa Kelly Saraiva, Química

APOIO:

Informações Hidrológicas

IGAM- Gerência de Apoio a Regularização Ambiental

IGAM - Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais/SIMGE

Coletas de Amostras e Análises

CETEC – Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

Setor de Medições Ambientais – SAM

José Antônio Cardoso, Químico - Coordenador

João de Deus, técnico em Química

Maurílio César de Faria, técnico em Química

Patrícia Neres dos Santos, Química

Patrícia Pedrosa Marques, Química

Sávio Gonçalves Rosa, Biólogo

Marina Miranda Marques Viana, Química

Setor de Análises Químicas

Olguita Geralda Ferreira Rocha, Química e Bioquímica Farmacêutica - Coordenadora

Renata Vilela Cecílio Dias, Química

Setor de Recursos da Água

Agostinho Clóvis da Silva, Biólogo - Coordenador

Célia de Fátima Machado, Bióloga

Fábio de Castro Patrício, Biólogo

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

APRESENTAÇÃO

A pressão do desenvolvimento econômico e do crescimento populacional já se fazem sentir com frequência, gerando situações de conflito e escassez dos recursos hídricos em Minas Gerais.

A água, além de ser essencial à sobrevivência dos seres vivos, é também um elemento vital para as atividades econômicas.

Nesse contexto, conhecer a qualidade das águas superficiais em nosso Estado é ferramenta básica para definir estratégias que busquem a conservação, a recuperação e o uso racional dos recursos hídricos, reduzindo os conflitos e implementando o direcionamento das atividades econômicas.

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), por meio do Projeto Águas de Minas vem, desde 2001, ampliando a rede de monitoramento das águas superficiais.

Os dados e as informações contidos nesta publicação são o resultado deste esforço, que visa subsidiar decisões dos Comitês de Bacias Hidrográficas, dos órgãos governamentais, empresas, bem como da sociedade e entidades que lutam em prol da sustentabilidade, da qualidade de vida e da consolidação da Gestão compartilhada e descentralizada dos recursos hídricos.

Cleide Izabel Pedrosa de Melo
Diretora Geral do IGAM

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	1
1.1.	A Resolução CONAMA 357/2005 e a Qualidade das Águas do Estado.....	3
2.	UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.....	4
3.	PARÂMETROS INDICATIVOS DA QUALIDADE DAS ÁGUAS.....	10
3.1.	Significado Ambiental dos Parâmetros.....	11
3.1.1.	Parâmetros Físicos.....	11
3.1.2.	Parâmetros Químicos.....	13
3.1.3.	Parâmetros Microbiológicos.....	23
3.1.4.	Parâmetro Hidrobiológicos.....	24
3.1.5.	Bioensaios Ecotoxicológicos.....	25
4.	INDICADORES DA QUALIDADE DAS ÁGUAS.....	26
4.1.	Índice de Qualidade das Águas – IQA.....	26
4.2.	Contaminação por Tóxicos - CT.....	28
4.3.	Bioensaios Ecotoxicológicos.....	29
5.	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	29
5.1.	Rede de Monitoramento.....	29
5.2.	Coletas e Análises.....	30
5.2.1.	Coletas.....	30
5.2.2.	Análises.....	49
5.3.	Avaliação Temporal.....	50
5.4.	Avaliação Espacial.....	51
5.5.	Avaliação Ambiental – Pressão x Estado x Resposta.....	51
6	ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA.....	53
6.1.	O que é Enquadramento dos Corpos de Água.....	53
6.2.	Modalidades de enquadramento dos corpos de água.....	53
6.3.	Enquadramento dos corpos de água em Minas Gerais.....	53
6.4.	Procedimentos metodológicos do enquadramento.....	54
7.	OUTORGA.....	55
7.1.	O Que é Outorga de Direito de Uso.....	55
7.2.	Modalidades de Outorga.....	56
7.3.	A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos em Minas Gerais..	56
7.4.	A Quem Solicitar.....	57
7.5.	Como Solicitar a Outorga.....	57



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

7.6.	Quando se Deve Solicitar a Outorga.....	57
7.7.	Os Usos de Recursos Hídricos Sujeitos a Outorga.....	58
7.8.	Usos que independem da Outorga.....	58
7.9.	Procedimento para a Solicitação de Outorga.....	58
7.10.	Documentação Necessária para a Obtenção da Outorga.....	59
8.	SITUAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007.....	60
8.1.	IQA – Índice de Qualidade das Águas nas Bacias Hidrográficas.....	62
8.2.	CT – Contaminação por Tóxicos nas Bacias Hidrográficas.....	72
8.3.	Parâmetros em desacordo com a legislação.....	80
8.3.1.	No Estado de Minas Gerais.....	80
8.3.2.	Nas bacias hidrográficas.....	82
8.4.	Ensaio de Ecotoxicidade.....	88
9.	CARACTERIZAÇÃO GERAL DA SUB-BACIA DO RIO PARÁ.....	98
10	CONSIDERAÇÕES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE 2007.....	110
10.1.	Rio Pará e seus afluentes	110
10.1.1.	Rio Pará.....	110
10.1.2.	Ribeirão Passa Tempo.....	113
10.1.3.	Rio do Peixe.....	114
10.1.4.	Ribeirão Paiol.....	114
10.1.5.	Rio Itapeçerica.....	116
10.1.6.	Ribeirão Boa Vista.....	118
10.1.7.	Córrego do Pinto ou Buriti.....	118
10.1.8.	Ribeirão da Fatura ou Gama.....	119
10.1.9.	Rio São João e seu afluente.....	122
10.1.9.1.	Rio São João.....	122
10.1.9.2.	Ribeirão Paciência.....	126
10.1.10.	Rio Lambari e seu afluente.....	128
10.1.10.1	Rio Lambari.....	128
10.1.10.2	Ribeirão Diamante.....	129
10.1.11.	Rio do Peixe.....	131
10.1.12.	Córrego Salobro.....	131
10.1.13	Rio do Picão.....	131
11.	AVALIAÇÃO AMBIENTAL	135
11.1.	Análise das Violações.....	135
12.	AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL – RESPOSTA.....	144



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

12.1. Contaminação por esgoto sanitário.....	144
12.2. Contaminação por atividades industriais e minerárias.....	147
12.3. Contaminação por mau uso do solo.....	147
13. BIBLIOGRAFIA.....	148

ANEXOS

Anexo A – Municípios com Sede na Bacia do Rio Grande.....	A-1
Anexo B – Curvas de Qualidade e Equações para Cálculo do Índice de Qualidade das Águas.....	B-1
Anexo C – Classificação das Coleções de Água.....	C-1
Anexo D – Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas em 2005.....	D-1

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 –	Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos em Minas Gerais (UPGRHs), suas respectivas áreas de drenagem, população e número de estações de amostragem.....	7
Tabela 5.1 -	Relação dos parâmetros analisados nas campanhas completas...	31
Tabela 5.2 -	Relação dos parâmetros comuns a todas as estações de amostragens analisados nas campanhas intermediárias.....	32
Tabela 5.3 -	Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem.....	33
Tabela 5.4 -	Relação dos métodos de ensaios utilizados no Projeto "Águas de Minas".....	49
Tabela 6.1 -	Classificação dos corpos de água segundo os usos preponderantes.....	55
Tabela 8.1 -	Avaliação dos resultados dos testes de ecotoxicidade, entre agosto/2003 e dezembro/2007 na bacia do rio Grande.....	90
Tabela 8.2 -	Resultados dos testes de ecotoxicidade observados nas estações da bacia do rio Grande monitoradas na 4ª campanha de 2007.....	91
Tabela 8.3 -	Avaliação dos resultados dos testes de ecotoxicidade realizados entre agosto/2003 e dezembro/2007 na bacia do rio Paranaíba.....	93
Tabela 8.4 -	Avaliação dos resultados dos testes de ecotoxicidade realizados entre agosto/2003 e dezembro/2007 na bacia do rio São Francisco.....	94
Tabela 8.5 -	Resultados dos testes de ecotoxicidade observados nas estações da bacia do rio São Francisco monitorados a partir do 3º trimestre de 2007.....	95
Tabela 9.1 -	Dados Gerais da Sub-Bacia do rio Pará em Minas Gerais.....	98
Tabela 9.2 -	Descrição das estações de amostragem da sub-bacia do rio Pará..	104
Tabela 11.1	Classificação dos parâmetros monitorados em ordem decrescente segundo percentual de violações de classe de enquadramento em toda a sub-bacia do rio Pará, no período de 1997 a 2007.....	136
Tabela 12.1	Evolução da média anual do IQA da sub-bacia do rio Pará nos municípios que possuem população urbana superior a 30.000 habitantes.....	145
Tabela 12.2	Avaliação dos parâmetros associados aos esgotos sanitários dos municípios da sub-bacia do rio Pará que possuem população urbana superior a 30.000 habitantes.....	146

LISTA DE FIGURAS

Figura 8.1:	Evolução temporal do Índice de Qualidade das Águas - IQA, no Estado de Minas Gerais.....	61
Figura 8.2:	Evolução temporal da Contaminação por Tóxicos – CT, no Estado de Minas Gerais.....	61
Figura 8.3:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA nas UPGRHs SF1, SF4, SF6, SF7, SF8, SF9 e SF10, no ano de 2007.....	62
Figura 8.4:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Pará – UPGRH SF2, no ano de 2007.....	63
Figura 8.5:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Paraopeba – UPGRH SF3, no ano de 2007.....	64
Figura 8.6:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio das Velhas – UPGRH SF5, no ano de 2007.....	65
Figura 8.7:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Grande – UPGRHs GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7 e GD8, no ano de 2007.....	66
Figura 8.8:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Doce – UPGRHs DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6, no ano de 2007.....	67
Figura 8.9:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Paraíba do Sul – UPGRHs PS1 e PS2, no ano de 2007.....	68
Figura 8.10:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Paranaíba – UPGRHs PN1, PN2 e PN3, no ano de 2007.....	69
Figura 8.11:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Jequitinhonha – UPGRHs JQ1, JQ2 e JQ3.....	70
Figura 8.12:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Mucuri – UPGRH MU1.....	71
Figura 8.13:	Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Pardo – UPGRH PA1.....	72
Figura 8.14:	Freqüência de ocorrência de Contaminação por Tóxicos no Estado de Minas Gerais, no ano de 2007.....	73
Figura 8.15:	Ocorrência de parâmetros avaliados na Contaminação por Tóxicos no Estado de Minas Gerais, no ano de 2007.....	74
Figura 8.16:	Freqüência de ocorrência de Contaminação por Tóxicos nas sub-bacias do rio São Francisco, no ano de 2007.....	74
Figura 8.17:	Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRHs SF1, SF4, SF6, SF7, SF8, SF9 e SF10.....	75

Figura 8.18:	Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRH SF2.....	76
Figura 8.19:	Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRH SF3.....	76
Figura 8.20:	Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRH SF5.....	77
Figura 8.21:	Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRHs GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7 e GD8.....	77
Figura 8.22:	Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRHs DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6.....	78
Figura 8.23:	Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRHs PS1 e PS2.....	78
Figura 8.24:	Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Média no ano de 2007 – UPGRHs PN1, PN2 e PN3.....	79
Figura 8.25:	Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta no ano de 2007 – UPGRHs JQ1, JQ2 e JQ3.....	79
Figura 8.26:	Freqüência da ocorrência de metais fora dos limites estabelecidos na legislação no Estado de Minas Gerais, em 2007..	81
Figura 8.27:	Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação no Estado de Minas Gerais, em 2007..	81
Figura 8.28:	Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRHs SF1, SF4, SF6, SF7, SF8, SF9 e SF10.....	82
Figura 8.29:	Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH SF2.....	83
Figura 8.30:	Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH SF3.....	83
Figura 8.31:	Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH SF5.....	84
Figura 8.32:	Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRHs GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7 e GD8.....	84
Figura 8.33:	Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6.....	85



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Figura 8.34:	Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH PS1 e PS2.....	85
Figura 8.35:	Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRHs PN1, PN2 e PN3...	86
Figura 8.36:	Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRHs JQ1, JQ2 e JQ3....	86
Figura 8.37:	Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH MU1.....	87
Figura 8.38:	Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH PA1.....	87
Figura 8.39:	Variação dos percentuais de estações da bacia do rio Grande com resultados positivos para os ensaios de ecotoxicidade crônica.....	89
Figura 8.40:	Variação dos percentuais de estações da bacia do rio Paranaíba com resultados positivos para os ensaios de ecotoxicidade crônica.....	92
Figura 8.41:	Variação dos percentuais de amostras do rio Manhuaçu com resultados positivos para os ensaios de ecotoxicidade crônica.....	96
Figura 8.42:	Distribuição das estações entre as categorias Alta, Média e Baixa ocorrência de ecotoxicidade.....	96
Figura 9.1:	Extração de areia no Rio Pará, na localidade de Pará dos Vilelas (PA003); e a direita, assoreamento entre Passa Tempo e desterro de Entre Rios (PA001).....	99
Figura 9.2:	Extração de ardósia às margens do Rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará.....	99
Figura 9.3:	Porcentagem de água superficial utilizada na sub-bacia do rio Pará em 2007, em função da vazão outorgada.....	103
Figura 9.4:	Porcentagem de água subterrânea utilizada na sub-bacia do rio Pará em 2007, em função da vazão outorgada.....	103
Figura 10.1:	Evolução temporal da média anual do IQA na sub-bacia do Rio Pará.....	110
Figura 10.2:	Ocorrência de coliformes termotolerantes ao longo do rio Pará, no ano de 2007.....	111
Figura 10.3:	Ocorrência de turbidez ao longo do rio Pará, no ano de 2007.....	111
Figura 10.4:	Ocorrência de cor verdadeira no rio Pará na localidade de Velho da Taipa próximo ao município de Pitangui (PA013) e a montante de sua foz no rio São Francisco (PA019), no período de 1997 a 2007.....	112
Figura 10.5:	Ocorrência de ferro dissolvido ao longo do rio Pará, no ano de 2007.....	112
Figura 10.6:	Ocorrência de clorofila <i>a</i> ao longo do rio Pará, no ano de 2007.....	113

Figura 10.7:	Ocorrência de chumbo total e fenóis totais na estação de amostragem no rio Pará a montante de sua foz no rio São Francisco (PA019), no período de amostragem.....	113
Figura 10.8:	Ocorrência de oxigênio dissolvido na estação de amostragem no ribeirão Paiol a jusante da cidade de Carmópolis de Minas (PA002), no período de 2000 a 2007.....	115
Figura 10.9:	Ocorrência de manganês total, ferro dissolvido e cor verdadeira na estação de amostragem no ribeirão Paiol a jusante da cidade de Carmópolis de Minas (PA002), no período de 2000 a 2007.....	115
Figura 10.10	Ocorrência de coliformes termotolerantes no rio Itapecerica a montante de Divinópolis (PA004), no período de 2000 a 2007.....	116
Figura 10.11	Ocorrência de fósforo total e coliformes termotolerantes no rio Itapecerica a jusante da cidade de Divinópolis (PA007), no período de 1997 a 2007.....	116
Figura 10.12	Ocorrência de turbidez no rio Itapecerica a montante de Divinópolis (PA004), no período de 2000 a 2007.....	117
Figura 10.13	Ocorrência de manganês total no rio Itapecerica a montante da cidade de Divinópolis (PA004), no período de 2000 a 2007.....	117
Figura 10.14	Ocorrência de cor verdadeira no rio Itapecerica a jusante da cidade de Divinópolis (PA007), no período de 2000 a 2007.....	118
Figura 10.15	Ocorrência de coliformes termotolerantes, OD, fósforo total e DBO no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará, município de Nova Serrana (PA020) no período de 2005 a 2007.....	120
Figura 10.16	Ocorrência de substâncias tensoativas no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará, município de Nova Serrana (PA020) no período de 2005 a 2007.....	120
Figura 10.17	Ocorrência de turbidez e cor verdadeira no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará no município de Nova Serrana (PA020), no período de 2005 a 2007.....	121
Figura 10.18	Ocorrência de ferro dissolvido e manganês total no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará no município de Nova Serrana (PA020), no período de monitoramento.....	121
Figura 10.19	Ocorrência de nitrogênio amoniacal, fenóis totais e chumbo total no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará no município de Nova Serrana (PA020), no período de 2005 a 2007.....	122
Figura 10.20	Ocorrência de coliformes termotolerantes , fósforo total e DBO no rio São João a jusante do município de Itaúna (PA009) e próximo á sua foz no rio Pará (PA011), no período de 1997 a 2007.....	123
Figura 10.21	Alterações em substâncias tensoativas e óleos e no rio São João a jusante do município de Itaúna (PA009), no período de 1997 a 2007.....	124
Figura 10.22	Ocorrência de ferro dissolvido no rio São João próximo à sua foz no rio Pará (PA011), no período de 1997 a 2007.....	124

Figura 10.23	Ocorrência de cor verdadeira no rio São João a jusante do município de Itaúna (PA009) e próximo á sua foz no rio Pará (PA011), no período de 1997 a 2007.....	125
Figura 10.24	Ocorrência de clorofila <i>a</i> no rio São João próximo à sua foz no rio Pará (PA011), no período de monitoramento.....	125
Figura 10.25	Ocorrência de fenóis totais no rio São João a jusante do município de Itaúna (PA009), no período de 1997 a 2007.....	126
Figura 10.26	Ocorrência de coliformes termotolerantes e fósforo total no ribeirão Paciência a jusante de Pará de Minas (PA010), no período de 2000 a 2007.....	127
Figura 10.27	Alterações em DBO, oxigênio dissolvido e cor verdadeira no ribeirão Paciência a jusante de Pará de Minas (PA010), no período de 2000 a 2007.....	127
Figura 10.28	Ocorrência de turbidez e coliformes termotolerantes no rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará (PA015), no período de 2000 a 2007.....	128
Figura 10.29	Ocorrência de ferro dissolvido no rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará (PA015), no período de 1997 a 2007.....	128
Figura 10.30	Ocorrência de clorofila <i>a</i> no rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará (PA015), no período de monitoramento.....	129
Figura 10.31	Ocorrência de coliformes termotolerantes e fósforo total no ribeirão Diamante a jusante da cidade de Santo Antônio do Monte (PA022), no período de 2005 a 2007.....	130
Figura 10.32	Alterações de cor verdadeira no ribeirão Diamante a jusante da cidade de Santo Antônio do Monte (PA022), no período de 2005 a 2007.....	130
Figura 10.33	Ocorrência de ferro dissolvido no ribeirão Diamante a jusante da cidade de Santo Antônio do Monte (PA022), no período de 2005 a 2007.....	131
Figura 10.34	Ocorrências de coliformes termotolerantes, OD no rio do Picão próximo de sua foz no rio Pará (PA017) e coliformes termotolerantes e fósforo total a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021), no período de monitoramento.....	132
Figura 10.35	Ocorrência de manganês total e ferro dissolvido no rio Picão próximo de sua foz no rio Pará (PA017) e a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021), no período de monitoramento.....	133
Figura 10.36	Ocorrência de cor verdadeira no rio Picão a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021), no período de monitoramento.....	133
Figura 10.37	Ocorrência de clorofila <i>a</i> no rio do Picão próximo de sua foz no rio Pará (PA017) no período de monitoramento.....	134

LISTA DE MAPAS

Mapa 2.1:	Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos em Minas Gerais (UPGRHs).....	6
Mapa 9.1:	Uso da água na sub-bacia do rio Pará, segundo outorgas concedidas pelo IGAM, válidas em 2007.....	101
Mapa 9.2:	Volume de água outorgado pelo IGAM na sub-bacia do rio Pará, válido em 2007.....	102
Mapa 9.3:	Qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Pará no primeiro trimestre de 2007 - UPGRH SF2.....	105
Mapa 9.4	Qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Pará no segundo trimestre de 2007 - UPGRH SF2.....	106
Mapa 9.5	Qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Pará no terceiro trimestre de 2007- UPGRH SF2.....	107
Mapa 9.6	Qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Pará no quarto trimestre de 2007 - UPGRH SF2.....	108
Mapa 9.7	Qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Pará em 2007 – UPGRH SF2.....	109

1. INTRODUÇÃO

A água, recurso natural limitado, constitui bem de domínio público, conforme dispõe a Constituição Federal/88 em seus artigos 20 e 21, e as Políticas Nacional e Estadual de recursos hídricos, Leis N° 9.433/97 e N° 13.199/99, respectivamente. Como tal, necessita de instrumentos de gestão a serem aplicados na bacia hidrográfica, unidade territorial fundamental. Tais instrumentos visam assegurar às atuais e futuras gerações água disponível em qualidade e quantidade adequadas mediante seu uso racional e prevenir situações hidrológicas críticas, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

Em Minas Gerais, a Constituição Estadual/89 delinea ações gerais para gerenciamento e proteção dos recursos hídricos mineiros. A Lei 12.584/97 cria o IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas – em substituição ao antigo DRH – Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais – órgão do Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA), ligado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), cuja finalidade é a promoção do gerenciamento das águas de Minas Gerais de acordo com as ações previstas na legislação.

O Projeto "Águas de Minas" vem atender a uma das ações previstas na Lei 12.584/97, de criação do IGAM, em seu Art. 5º, inciso X – proceder à avaliação da rede de monitoramento da qualidade das águas no Estado - e também contribui para a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, que foi instituída pela Lei N° 13.199/99 fundamentada na Lei Federal N° 9.433/97.

O monitoramento das águas em Minas Gerais teve seu início em 1977, com a rede de amostragem operada pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, e que visava às bacias do rio das Velhas, rio Paraopeba e rio Paraíba do Sul para o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - até o ano de 1988. A FEAM monitorou a bacia hidrográfica do rio Verde de 1987 a 1995 utilizando os serviços do CETEC. A seguir, contratando os serviços da GEOSOL - Geologia e Sondagens – e, posteriormente, do CETEC, monitorou as bacias hidrográficas do rio das Velhas e do rio Paraopeba de 1993 a 1997.

Com o *status* adquirido pela questão hídrica refletida na promulgação da Lei 9.433/97 e a conseqüente criação de órgãos federais e estaduais dirigidos ao gerenciamento racional das águas, o trabalho de monitoramento foi reforçado pela FEAM, em 1997, desta vez com um monitoramento mais amplo e completo, estendido às oito principais bacias hidrográficas mineiras por meio de convênio com o Ministério do Meio Ambiente - MMA. No final de 1999, o Governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH, também destinou recursos para o Projeto Águas de Minas, passando o IGAM a integrar a coordenação do mesmo. Em 2001, por estar melhor inserido nas competências da Agenda Azul do que nas da Agenda Marrom, a coordenação geral deste Projeto passou para o IGAM, com participação da FEAM principalmente na elaboração do quadro Pressão-Estado-Resposta, que associa as alterações encontradas na qualidade das águas às diferentes fontes de poluição. Desde então, o IGAM tem sido responsável pela coordenação, operação e divulgação dos resultados do Projeto Águas de Minas.

O Projeto Águas de Minas, em execução há onze anos, vem permitindo identificar alterações na qualidade das águas do Estado, refletidas em tendências observadas.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

A operação da rede de monitoramento teve início com a seleção de 222 pontos de amostragem aos quais se foram agregando outros, levando a um total de 260 estações amostradas em 2006, com frequência trimestral. Em 2007 foram implantadas 50 novas estações de monitoramento distribuídas nas bacias dos rios Paraopeba (8), Pará (10), Urucuia (8), São Francisco - UPGRHs SF1 e SF4 (10) e Grande (14), totalizando 310 estações de amostragem. A descrição dos novos pontos pode ser observada nas tabelas específicas de cada bacia.

O IGAM pretende, através do Projeto Águas de Minas, atingir os seguintes objetivos:

- avaliar as condições reais das águas superficiais mineiras por meio de análises *in loco* e em laboratório de amostras coletadas nas estações de monitoramento;
- verificar as alterações espaciais e temporais na qualidade das águas, tentando ressaltar tendências observáveis;
- correlacionar essas condições com as características de ocupação das diferentes bacias;
- fornecer uma medida da eficácia dos sistemas de controle de outros órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente em relação às atividades potencialmente causadoras de impacto;
- facilitar a identificação e a implementação de estratégias de aperfeiçoamento de instrumentos gerenciais;
- definir bacias ou corpos de água onde o detalhamento da macro-rede mostre-se necessário, mediante redes dirigidas;
- divulgar aos órgãos do judiciário e aos usuários de água o relatório anual de qualidade das águas superficiais;
- disponibilizar via *Internet* os resultados trimestrais do monitoramento, bem como relatórios e mapas.

Para tanto, foram estabelecidas as análises a serem realizadas nas amostras de água coletadas. Além dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos já usuais são realizados ensaios de toxicidade com o microcrustáceo *Ceriodaphnia dubia*. No período de 2001 à 2004, foram inseridos os valores de vazão das estações de amostragem, obtidos, na sua maioria, pelo método de regionalização. As amostras coletadas nas campanhas completas (período chuvoso e estiagem) foram submetidas à avaliação de cerca de 50 parâmetros e nas campanhas intermediárias, 16 parâmetros, conforme descrito nos procedimentos metodológicos.

Os resultados de alguns parâmetros específicos são utilizados no cálculo do Índice de Qualidade de Água (IQA) multiplicativo, desenvolvido pela *National Sanitation Foundation* dos Estados Unidos e na interpretação dos dados de Contaminação por Tóxicos (CT), desenvolvido pela FEAM, tomando por base, no ano de 2007, os limites de classe definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), na Resolução CONAMA 357/2005.

Os resultados permitem inferir a qualidade das águas dos corpos de água nas Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRHs) em Minas Gerais, estabelecidas pela DN N° 06/02 do CERH, descritas em seu anexo único.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

A adoção das Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRHs, como um dos referenciais de análise deverá, igualmente, permitir a inserção das informações geradas no âmbito do processo de decisão política e administrativa no gerenciamento integrado de recursos hídricos, proporcionando, entre outras informações, um referencial comum entre o Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH.

Para o conjunto de resultados dos principais indicadores de qualidade e quantidade das águas, obtidos ao longo dos nove anos de monitoramento, são apresentadas avaliações em nível sazonal, ao longo do tempo e espacial, com o propósito de apresentar uma interpretação mais detalhada. Além de outras considerações, esta avaliação permite associar a componente quantidade aos indicadores de qualidade, contribuindo dessa forma, para a divulgação das informações de maneira a auxiliar de forma bastante significativa as ações de gestão e de tomada de decisão.

O desenvolvimento dos trabalhos possibilita ao Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais e aos órgãos e entidades vinculados identificarem e implementarem estratégias de aperfeiçoamento de seus instrumentos gerenciais. Destaca-se a importância do Projeto Águas de Minas, que permite aos usuários de água, o acompanhamento do quadro geral sobre a qualidade das águas das principais bacias hidrográficas do Estado, competência da Agenda Azul (IGAM), e para a efetividade das ações de controle das fontes de poluição e degradação ambiental da Agenda Marrom (FEAM).

A caracterização da qualidade das águas, bem como os aspectos de quantidade dos recursos hídricos vêm, ademais, estimulando a integração das ações das agendas ambientais do Estado de Minas Gerais.

É importante ressaltar que o alcance dos objetivos é gradativo e a continuidade do projeto vem proporcionando a interação efetiva entre os órgãos gestores e os usuários, com vistas ao alcance da gestão sustentável dos recursos hídricos.

1.1. A Resolução CONAMA 357/2005 e a Qualidade das Águas do Estado

Para avaliação da qualidade das águas no Estado de Minas Gerais, no âmbito do Projeto Águas de Minas, o Instituto Mineiro de Gestão de Águas vinha, até 2004, utilizando os limites estabelecidos na Deliberação Normativa nº10/1986, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. No entanto, em vista da necessidade de revisão desta DN, e da revisão da Resolução Federal do CONAMA nº20 de 1986, com sua publicação em março de 2005, optou-se por adotar esta legislação mais recente para embasar a avaliação anual da qualidade das águas de Minas Gerais.

A resolução CONAMA 357/2005 trouxe modificações significativas para a preservação dos recursos hídricos, podendo-se citar:

- Reconhecimento da importância de variáveis biológicas na avaliação da qualidade da água, considerando os testes de toxicidade e o monitoramento da densidade de cianobactérias e da concentração de clorofila-a como necessários para o enquadramento de um dado corpo de água;

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

- Estabelecimento de padrões de fósforo total específicos para cada tipo de ambiente (lêntico, lótico e intermediário) e a adequação da análise da concentração de nitrogênio amoniacal em função do pH;
- Com relação aos metais alumínio e cobre, passaram a ser consideradas, especificamente, as parcelas dissolvidas, responsáveis por causar problemas para abastecimento público e à biota, enquanto o cromo passou a ser avaliado em sua totalidade e não mais em suas formas tri ou hexavalente, como estabelecido pela DN 10/86;
- Alguns parâmetros como cianeto livre, arsênio total, bário total, boro total e chumbo total, passaram a ter limites inferiores menores que os estabelecidos na DN10/86 e esta diferença, que chega a até 5 vezes, configura a Resolução 357 como uma legislação mais rígida e capaz de garantir uma melhor preservação/restauração da qualidade da água.

Atualmente, a Deliberação Normativa COPAM nº10 de 1986, está passando por revisão para se adequar às condições da Resolução CONAMA 357/2005.

2. UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (UPGRHs)

A preservação e a utilização racional dos recursos hídricos são aspectos importantes para a resolução de problemas agudos relacionados à questão hídrica, visando ao bem estar de todos e à preservação do meio ambiente.

A pressão antrópica devido ao desenvolvimento das atividades econômicas e o adensamento populacional de forma desordenada vêm ocasionando crescentes problemas aos recursos hídricos. Em virtude disso, as instâncias públicas e civis mobilizaram-se para a criação de legislação e políticas específicas, a fim de fundamentar a gestão participativa e descentralizada dos recursos hídricos.

Dessa forma, gerou-se uma demanda do CERH ao IGAM no sentido de identificar e definir unidades de planejamento e gestão dos recursos hídricos no Estado, com o objetivo de orientar as ações relacionadas à aplicação da Política Estadual de Recursos Hídricos no âmbito estadual. Os trabalhos culminaram no estabelecimento das UPGRHs na Deliberação Normativa Nº 06/02 expedida pelo CERH.

Nesse contexto, foi necessário selecionar os municípios por UPGRH, tendo-se adotado como princípio que a localização do distrito sede define a inserção do mesmo na Unidade. A única exceção refere-se ao município de Contagem, considerado na UPGRH SF5 (Alto e Médio Cursos do rio das Velhas), embora seu distrito sede esteja localizado na sub-bacia do rio Paraopeba. Tal consideração baseou-se nas características específicas de distribuição da população e atividades econômicas do município, que geram pressões mais representativas na vertente da sub-bacia do rio das Velhas. Para as bacias cujas UPGRHs estão descritas neste volume, a relação dos municípios pertencentes a elas com a sua população urbana e rural são apresentadas no Anexo A.

As UPGRHs, que são unidades físico-territoriais, identificadas dentro das bacias hidrográficas do Estado, apresentam uma identidade regional caracterizada por aspectos físicos, sócio-culturais, econômicos e políticos.




Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007


Apesar do caráter técnico na concepção dessas unidades, sua definição foi resultado de um consenso entre os vários níveis de decisão relacionados à gestão das águas.

As 36 UPGRHs resultantes desse trabalho, detalhadas na Tabela 2.1 e ilustradas no Mapa 2.1, são adotadas pelo IGAM, pela SEPLAN (Secretaria Estadual de Planejamento e Coordenação Geral) e pela ANA (Agência Nacional das Águas) na gestão dos recursos hídricos em território mineiro.



BACIAS FEDERAIS

- Bacias do Leste
- Rio Doce
- Rio Grande
- Rio Jequitinhonha
- Rio Paranaíba
- Rio Paraíba do Sul
- Rio Pardo
- Rio Piracicaba/Jaguari
- Rio São Francisco
- Principais Rios



Execução:
Projeto Águas de Minas
2007

Mapa 2.1: Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos em Minas Gerais (UPGRHs).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 2.1: Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos em Minas Gerais (UPGRH), suas respectivas áreas de drenagem, população e número de estações de amostragem.

Bacia	UPGRH	nº	Área Drenada (Km ²)	Municípios com sede	População Total	População Urbana	População Rural	Nº estações de amostragem*	Densidade (Est/1000Km ²)	
Rio São Francisco (SF)	SF1 - Nascentes até confluência Rio Pará		14.204	20	214.094	177.685	36.409	7	0,49	
	SF4 - Entorno Represa Três Marias		18.714	15	182.769	154.168	28.601	17	0,91	
	SF6 - SF jusante Rio Abaeté até jusante do Rio Uruçuia		25.129	7	79.594	55.042	24.552	5	0,20	
	SF7 - Bacia Rio Paracatu		41.512	12	256.454	199.856	56.598	8	0,19	
	SF8 - Bacia Rio Uruçuia e afluentes esquerdos do SF		25.136	8	79.704	46.754	32.950	11	0,44	
	SF9 - SF jusante confluência Uruçuia até a montante do Rio Carinhanha		31.259	17	235.010	119.783	115.227	7	0,22	
	SF10 - Bacia Rio Verde Grande		27.043	22	641.784	476.054	165.730	7	0,26	
	Subtotal São Francisco e Afluentes	7	182.997	101	1.689.409	1.229.342	460.067	62	0,34	
	Pará	SF2 - Bacia do Rio Pará		12.262	27	631.887	547.941	83.946	26	2,12
	Paraopeba	SF3 - Bacia do Rio Paraopeba		12.092	35	909.486	814.609	94.877	30	2,48
	Velhas	SF5 - Bacia Rio das Velhas até foz no SF		29.173	56	4.307.828	4.121.255	186.573	33	1,13
	TOTAL SF	10	236.524	219	7.538.610	6.713.147	825.463	151	0,64	
Rio Paranaíba (PN)	PN1 - Nascentes Rio Paranaíba até jusante Barragem Itumbiara		22.292	18	430.955	361.277	69.678	5	0,22	
	PN2 - Bacia Rio Araguari		21.567	13	741.486	696.543	44.943	8	0,37	
	PN3 - Baixo curso, de Itumbiara até a foz		26.973	13	211.641	176.801	34.840	5	0,19	
	TOTAL PN	3	70.832	44	1.384.082	1.234.621	149.461	18	0,25	

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 2.1: Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos em Minas Gerais (UPGRH), suas respectivas áreas de drenagem, população e número de estações de amostragem (continuação).

Bacia	UPGRH	nº	Área Drenada (Km ²)	Municípios com sede	População Total	População Urbana	População Rural	Nº estações de amostragem*	Densidade (Est/1000Km ²)
Rio Grande (GD)	GD1 - Nascentes Rio Grande até confluência Rio das Mortes		8.805	21	131.998	93.889	38.109	5	0,57
	GD2 - Bacias Rios das Mortes e Jacaré		10.547	30	519.465	440.254	79.211	9	0,85
	GD3 - Entorno Represa de Furnas		16.562	36	670.651	511.408	159.243	4	0,24
	GD4 - Bacia Rio Verde		6.924	23	420.301	352.206	68.095	13	1,88
	GD5 - Bacia Rio Sapucaí		8.882	40	524.504	390.969	133.535	7	0,79
	GD6 - Bacias Rios Pardo e Mogi-Guaçu		5.983	20	378.631	296.219	82.412	7	1,17
	GD7 - Entorno Represa do Peixoto e Ribeirão Sapucaí		9.856	18	294.816	245.288	49.528	5	0,51
	GD8 - Baixo curso Rio Grande jusante Reservatório do Peixoto		18.785	18	457.099	403.239	53.860	6	0,32
	TOTAL GD	8	86.344	206	3.397.465	2.733.472	663.993	56	0,65
Rio Doce (DO)	DO1 - Nascentes Rio Piranga até confluência Rio Piracicaba		17.631	63	673.708	413.513	260.195	9	0,51
	DO2 - Bacia Rio Piracicaba		5.707	17	686.401	638.836	47.565	9	1,58
	DO3 - Bacia Rio Santo Antônio e margem esquerda Rio Doce entre Piracicaba e Sto.		10.799	23	200.885	117.757	83.128	1	0,09
	DO4 - Bacia Rio Suaçuí-Grande		20.537	46	1.055.941	815.427	240.514	5	0,24
	DO5 - Bacias Rio Caratinga		8.689	19	241.116	161.651	79.465	4	0,46
	DO6 - Bacia do Rio Manhuaçu		11.080	25				4	0,36
		TOTAL DO	6	74.443	193	2.858.051	2.147.184	710.867	32

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 2.1: Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos em Minas Gerais (UPGRH), suas respectivas áreas de drenagem, população e número de estações de amostragem (continuação).

Bacia	UPGRH	nº	Área Drenada (Km ²)	Municípios com sede	População Total	População Urbana	População Rural	Nº estações de amostragem*	Densidade (Est/1000Km ²)
Rio Jequitinhonha (JQ)	JQ1 - Nascentes até montante Rio Salinas		19.803	10	100.006	61.705	38.301	4	0,20
	JQ2 - Bacia Rio Araçuaí		16.273	21	282.969	120.559	162.410	3	0,18
	JQ3 - Rio Jequitinhonha do Rio Salinas até divisa do Estado		29.775	29	391.139	247.597	143.542	6	0,20
	TOTAL JQ	3	65.851	60	774.114	429.861	344.253	13	0,20
Rio Paraíba do Sul (PS)	PS1 - Bacia do Rio Paraibuna		7.223	22	598.644	551.273	47.371	13	1,80
	PS2 - Bacias Rios Pomba e Muriaé		13.553	58	760.535	601.577	158.958	16	1,18
	TOTAL PS	2	20.776	80	1.359.179	1.152.850	206.329	29	1,40
Rio Pardo (PA)	Toda a Bacia em MG	1	12.763	11	109.349	45.847	63.502	3	0,24
Rio Mucuri (MU)	Toda a Bacia em MG	1	14.859	12	296.845	205.132	91.713	8	0,54
Rio Piracicaba/Jaguari	Toda a Bacia em MG	1	1.161	4	57.794	35.551	22.243	-	-
Bacias do Leste	Bacia Rio Buranhém em MG		325	1	12.144	6.104	6.040	-	-
	Bacia Rio Jucuruçu em MG		712	2	14.276	7.362	6.914	-	-
	Bacia Rio Itanhém em MG		1.519	4	39.853	26.620	13.233	-	-
	Bacia Rio Peruípe em MG		57	-	8.182	6.498	1684	-	-
	Bacia Rio Itaúnas em MG		23	-	41.619	37.781	3.838	-	-
	Bacia Rio Itapemirim em MG		33	-	19.528	11.218	8.310	-	-
	Bacia Rio Itabapoana em MG		671	4	34.568	18.147	16.421	-	-
	Bacia Rio São Mateus em MG	1	5.682	13	102.815	58.825	43.990	-	-
	TOTAL Bacias Leste	1	9.022	24	272.985	172.555	100.430	-	-
No Estado	TOTAL de UPGRHs Amostradas	34	582.392	825	17.717.695	14.662.114	3.055.581	310	0,53
	TOTAL de UPGRHs	36	592.575	853	18.048.474	14.870.220	3.178.254		

* Há 3 estações de monitoramento da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul localizadas no estado do Rio de Janeiro e 1 estação da bacia hidrográfica do rio Pardo situada no estado da Bahia.

3. PARÂMETROS INDICATIVOS DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

A poluição das águas tem como origem diversas fontes, pontuais e difusas, associadas ao tipo de uso e ocupação do solo, dentre as quais destacam-se:

- efluentes domésticos;
- efluentes industriais;
- carga difusa urbana e agrossilvipastoril;
- mineração;
- natural;
- acidental.

Cada uma das fontes citadas acima possui características próprias quanto aos poluentes que carregam. Os esgotos domésticos, por exemplo, apresentam compostos orgânicos biodegradáveis, nutrientes e microrganismos patogênicos. Já para os efluentes industriais, há uma maior diversificação nos contaminantes lançados nos corpos de água em função dos tipos de matérias-primas e processos industriais utilizados. O deflúvio superficial urbano contém, geralmente, todos os poluentes que se depositam na superfície do solo. Na ocorrência de chuvas, os materiais acumulados em valas, bueiros, etc., são arrastados pelas águas pluviais para os corpos de água superficiais, constituindo-se numa fonte de poluição tanto maior quanto menos eficiente for a coleta de esgotos ou a limpeza pública.

A poluição agrossilvipastoril é decorrente das atividades ligadas à agricultura, silvicultura e pecuária. Quanto à atividade agrícola, seus efeitos dependem muito das práticas utilizadas em cada região e da época do ano em que se realizam as preparações do terreno para o plantio, assim como do uso intensivo dos defensivos agrícolas. A contribuição representada pelo material proveniente da erosão de solos intensifica-se quando da ocorrência de chuvas em áreas rurais. Os agrotóxicos com alta solubilidade em água podem contaminar águas subterrâneas e superficiais através do seu transporte com o fluxo de água.

A poluição natural está associada à salinização, decomposição de vegetais e animais mortos que são carregados pelo escoamento superficial, enquanto que a acidental é proveniente de derramamentos acidentais de materiais na linha de produção ou transporte.

De um modo geral, foram adotados parâmetros de monitoramento que permitem caracterizar a qualidade da água e o grau de contaminação dos corpos de água do Estado de Minas Gerais.

No monitoramento são analisados parâmetros físicos, químicos, microbiológicos, hidrobiológicos e bioensaios ecotoxicológicos de qualidade de água, levando em conta os mais representativos, os quais são relatados a seguir:

Parâmetros Físicos: temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais, sólidos dissolvidos totais, sólidos suspensos totais, cor, turbidez.

Parâmetros Químicos: alcalinidade total, alcalinidade de bicarbonato, dureza de cálcio, dureza de magnésio, dureza total, pH, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO_{5,20}), demanda química de oxigênio (DQO), série de nitrogênio (orgânico, amoniacal, nitrato e nitrito), fósforo total, substâncias tensoativas, óleos e graxas, cianeto livre, fenóis totais, cloreto, potássio, sódio, sulfato total, sulfetos, magnésio, ferro dissolvido,

manganês total, alumínio total, alumínio dissolvido, zinco total, bário total, cádmio total, boro total, arsênio total, níquel total, chumbo total, cobre total, cobre dissolvido, cromo (III), cromo (VI), cromo total, selênio total e mercúrio total.

Parâmetros microbiológicos: coliformes termotolerantes, coliformes totais e estreptococos totais.

Parâmetro hidrobiológico: clorofila -a.

Bioensaios Ecotoxicológicos: ensaios de toxicidade crônica com *Ceriodaphnia dubia*, inseridos no projeto a partir da terceira campanha de 2003, visando aprimorar as informações referentes à toxicidade causada pelos lançamentos de substâncias tóxicas nos corpos de água.

3.1. Significado Ambiental dos Parâmetros

3.1.1. Parâmetros Físicos

Condutividade Elétrica

A condutividade elétrica da água é determinada pela presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions e pela temperatura. As principais fontes dos sais de origem antropogênica naturalmente contidos nas águas são: descargas industriais de sais, consumo de sal em residências e no comércio, excreções de sais pelo homem e por animais.

A condutância específica fornece uma boa indicação das modificações na composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. À medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade específica da água aumenta. Altos valores podem indicar características corrosivas da água.

Cor verdadeira

A cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução de intensidade que a luz sofre ao atravessar uma coluna de água, devido à presença de sólidos dissolvidos (principalmente material em estado coloidal orgânico e inorgânico).

A cor é originada de forma natural, a partir da decomposição da matéria orgânica, principalmente dos vegetais – ácidos húmicos e fúlvicos, além do ferro e manganês. A origem antropogênica surge dos resíduos industriais e esgotos domésticos. Apesar de ser pouco freqüente a relação entre cor acentuada e risco sanitário nas águas coradas, a cloração da água contendo a matéria orgânica dissolvida responsável pela cor pode gerar produtos potencialmente cancerígenos, dentre eles, os trihalometanos.

Sólidos Totais

Todas as impurezas da água, com exceção dos gases dissolvidos, contribuem para a carga de sólidos presentes nos corpos de água. Os sólidos podem ser classificados de acordo com seu tamanho e características químicas. Os sólidos em suspensão, contidos em uma amostra de água, apresentam, em função do método analítico escolhido, características diferentes e, conseqüentemente, têm designações distintas.

A unidade de medição normal para o teor em sólidos não dissolvidos é o peso dos sólidos filtráveis, expresso em mg/L de matéria seca. A partir dos sólidos filtrados pode ser determinado o resíduo calcinado (em % de matéria seca), que é considerado uma medida da parcela da matéria mineral. O restante indica, como matéria volátil, a parcela de sólidos orgânicos.

Dentro dos sólidos filtráveis encontram-se, além de uma parcela de sólidos turvos, também os seguintes tipos de sólidos/substâncias não dissolvidos: sólidos flutuantes, que em determinadas condições estão boiando, e são determinados através de aparelhos adequados em forma de peso ou volume; sólidos sedimentáveis, que em determinadas condições afundam, sendo seu resultado apresentado como volume (mL/L) mais o tempo de formação; e sólidos não sedimentáveis, que não são sujeitos nem à flotação nem à sedimentação.

Temperatura

A temperatura da água é um fator que influencia a grande maioria dos processos físicos, químicos e biológicos na água como, por exemplo, a solubilidade dos gases dissolvidos. Uma elevada temperatura diminui a solubilidade dos gases como, por exemplo, do oxigênio dissolvido, além de aumentar a taxa de transferência de gases, o que pode gerar mau cheiro, no caso da liberação de compostos com odores desagradáveis.

Os organismos aquáticos possuem limites de tolerância térmica superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferencial em gradientes térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e incubação do ovo. As variações de temperatura fazem parte do regime climático normal e corpos de água naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical.

Turbidez

A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água, conferindo uma aparência turva à mesma. A turbidez tem como origem natural a presença de matéria em suspensão como partículas de rocha, argila, silte, algas e outros microrganismos e como fonte antropogênica os despejos domésticos, industriais e a erosão.

A alta turbidez reduz a fotossíntese da vegetação enraizada submersa e das algas. Esse desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a produtividade de peixes. Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas.

3.1.2. Parâmetros Químicos

Alcalinidade Total

É a quantidade dos íons hidróxido, carbonato e bicarbonato presentes na água, que reagirão para neutralizar os íons hidrogênio. As origens naturais da alcalinidade na água são a dissolução de rochas, as reações do dióxido de carbono (CO_2) da atmosfera e a decomposição da matéria orgânica. Além desses, os despejos industriais são responsáveis pela alcalinidade nos corpos de água. Esta variável deve ser avaliada por ser importante no controle do tratamento de água, estando relacionada com a coagulação, redução de dureza e prevenção da corrosão em tubulações.

Cianeto livre (CN)

Os cianetos são os sais do hidrácido cianídrico (ácido prússico, HCN), podendo ocorrer na água em forma de ânion (CN^-) ou de cianeto de hidrogênio (HCN). Em valores neutros de pH, prevalece o cianeto de hidrogênio.

Estas substâncias têm um efeito muito tóxico sobre microorganismos e uma diferenciação analítica entre cianetos livres e complexos é imprescindível, visto que a toxicidade do cianeto livre é muito maior.

Os cianetos são utilizados na indústria galvânica, no processamento de minérios (lixiviação de cianeto) e na indústria química. São também aplicados em pigmentos e praguicidas. Podem chegar às águas superficiais através dos efluentes das indústrias galvânicas, de têmpera, de coque, de gás e de fundições.

Cloretos

As águas naturais, em menor ou maior escala, contêm íons resultantes da dissolução de minerais. Os íons cloretos são advindos da dissolução de sais. Um aumento no teor desses ânions na água é indicador de uma possível poluição por esgotos (através de excreção de cloreto pela urina) ou por despejos industriais, e acelera os processos de corrosão em tubulações de aço e de alumínio, além de alterar o sabor da água.

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

É definida como a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica biodegradável sob condições aeróbicas, isto é, avalia a quantidade de oxigênio dissolvido, em mg/L, que será consumida pelos organismos aeróbios ao degradarem a matéria orgânica. Um período de tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 20°C é freqüentemente usado e referido como $\text{DBO}_{5,20}$.

Os maiores aumentos em termos de DBO em um corpo de água são provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir à completa extinção do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da micro-flora presente e interferir no equilíbrio da vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda, poder obstruir os filtros de areia utilizadas nas estações de tratamento de água.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Demanda Química de Oxigênio (DQO)

É a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica através de um agente químico. Os valores da DQO normalmente são maiores que os da DBO, sendo o teste realizado num prazo menor e em primeiro lugar, orientando o teste da DBO. A análise da DQO é útil para detectar a presença de substâncias resistentes à degradação biológica. O aumento da concentração da DQO num corpo de água se deve principalmente a despejos de origem industrial.

Dureza

É a concentração de cátions multimetálicos em solução. Os cátions mais frequentemente associados à dureza são os cátions bivalentes Ca^{2+} e Mg^{2+} . As principais fontes de dureza são a dissolução de minerais contendo cálcio e magnésio, provenientes das rochas calcárias e dos despejos industriais. A ocorrência de dureza elevada causa um sabor desagradável e pode ter efeitos laxativos. Além disso, causa incrustação nas tubulações de água quente, caldeiras e aquecedores, em função da maior precipitação nas temperaturas elevadas.

Fenóis Totais

Os fenóis são compostos orgânicos oriundos, nos corpos de água, principalmente dos despejos industriais. São compostos tóxicos aos organismos aquáticos em concentrações bastante baixas e afetam o sabor dos peixes e a aceitabilidade das águas. Para os organismos vivos, os compostos fenólicos são tóxicos protoplasmáticos, apresentando a propriedade de combinar-se com as proteínas teciduais. O contato com a pele provoca lesões irritativas e após ingestão podem ocorrer lesões cáusticas na boca, faringe, esôfago e estômago, manifestadas por dores intensas, náuseas, vômitos e diarreias, podendo ser fatal. Após absorção, tem ação lesiva sobre o sistema nervoso podendo ocasionar cefaléia, paralisias, tremores, convulsões e coma.

Fósforo Total

O fósforo é originado naturalmente da dissolução de compostos do solo e da decomposição da matéria orgânica. O aporte antropogênico é oriundo dos despejos domésticos e industriais, além de detergentes, excrementos de animais e fertilizantes. A presença de fósforo nos corpos de água desencadeia o desenvolvimento de algas ou de plantas aquáticas indesejáveis, principalmente em reservatórios ou corpos de água parada, podendo conduzir ao processo de eutrofização.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Série de Nitrogênio (amônia, nitrato, nitrito e nitrogênio orgânico)

O nitrogênio pode ser encontrado na água nas formas de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrato e nitrito. A forma do nitrogênio predominante é um indicativo do período da poluição dos corpos hídricos. Resultados de análise da água com alteração de nitrogênio nas formas predominantemente reduzidas (nitrogênio orgânico e amoniacal) indicam que a fonte de poluição encontra-se próxima, ou seja, caracteriza-se por uma poluição recente, enquanto que a prevalência da forma oxidada (nitrato e nitrito) sugere que a fonte de contaminação esteja distante do ponto de coleta, sendo a poluição, portanto, remota. Nas zonas de autodepuração natural dos rios, observa-se a presença de nitrogênio orgânico na zona de degradação, nitrogênio amoniacal na zona de decomposição ativa, nitrito na zona de recuperação e nitrato na zona de águas limpas.

A disponibilização do nitrogênio para o meio ambiente pode ocorrer de forma natural através de constituintes de proteínas, clorofila e compostos biológicos. As fontes antrópicas estão associadas aos despejos doméstico e industrial, excrementos de animais e fertilizantes.

O nitrogênio é um elemento de destaque para a produtividade da água, pois contribui para o desenvolvimento do fito e zooplâncton. Como nutriente é exigido em grande quantidade pelas células vivas. Entretanto, o seu excesso em um corpo de água provoca o enriquecimento do meio e, conseqüentemente, o crescimento exagerado dos organismos, favorecendo a eutrofização.

Nitrogênio Orgânico

Está presente na água em forma de suspensão e é oriundo principalmente de fontes biogênicas (bactérias, plâncton, húmus, proteínas e intermediários de processos de decomposição). O nitrogênio orgânico, não apresenta efeitos tóxicos, todavia podem surgir preocupações de ordem higiênica.

Nitrogênio Amoniacal Total (amônia)

É uma substância tóxica não persistente e não cumulativa. Em baixas concentrações, como é comumente encontrada, não causa nenhum dano fisiológico aos seres humanos e animais. Por outro lado, grandes quantidades de amônia podem causar sufocamento de peixes.

Como fontes de contribuição de nitrogênio amoniacal destacam-se o lançamento de efluentes domésticos e industriais químicos, petroquímicos, siderúrgicos, farmacêuticos, alimentícios, matadouros, frigoríficos e curtumes.

Nitrato

É a principal forma de nitrogênio encontrada nas águas. Concentrações de nitrato superiores a 10mg/L, conforme determinado pela Portaria 518/2004, do Ministério da Saúde, demonstram condições sanitárias inadequadas, pois as principais fontes de nitrogênio nitrato são dejetos humanos e animais.

Os nitratos estimulam o desenvolvimento de plantas, sendo que organismos aquáticos, como algas, florescem na presença destes e, quando em elevadas concentrações em lagos e represas, pode conduzir a um crescimento exagerado, processo denominado de eutrofização. Em grandes quantidades o nitrato contribui como causa da metaemoglobinemia (síndrome do bebê azul).

Nitrito

É uma forma química do nitrogênio normalmente encontrada em quantidades diminutas nas águas superficiais, pois o nitrito é instável na presença do oxigênio, ocorrendo como uma forma intermediária. O íon nitrito pode ser utilizado pelas plantas como uma fonte de nitrogênio. A presença de nitritos em água indica processos biológicos ativos influenciados por poluição orgânica. A indústria também disponibiliza o nitrito através das unidades de decapagem e da têmpera.

Oxigênio Dissolvido (OD)

Essencial à manutenção dos seres aquáticos aeróbios, a concentração de oxigênio dissolvido na água varia segundo a temperatura e a altitude, sendo a sua introdução condicionada pelo ar atmosférico, a fotossíntese e a ação dos aeradores.

O oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção de processos de autodepuração em sistemas aquáticos naturais e estações de tratamento de esgotos. Durante a estabilização da matéria orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo vir a causar uma redução de sua concentração no meio. Através da medição do teor de oxigênio dissolvido, os efeitos de resíduos oxidáveis sobre águas receptoras e a eficiência do tratamento dos esgotos durante a oxidação bioquímica, podem ser avaliados. Os níveis de oxigênio dissolvido também indicam a capacidade de um corpo de água natural em manter a vida aquática.

Óleos e Graxas

Os óleos e graxas são substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal ou animal. Estas substâncias geralmente são hidrocarbonetos, gorduras, ésteres, entre outros. São raramente encontrados em águas naturais, sendo normalmente oriundos de despejos e resíduos industriais, esgotos domésticos, efluentes de oficinas mecânicas, postos de gasolina, estradas e vias públicas. Os despejos de origem industrial são os que mais contribuem para o aumento de matérias graxas nos corpos de água. Dentre estes despejos, destacam-se os de refinarias, frigoríficos e indústrias de sabão.

A pequena solubilidade dos óleos e graxas constitui um fator negativo no que se refere à sua degradação em unidades de tratamento de despejos por processos biológicos e, quando presentes em mananciais utilizados para abastecimento público, causam problemas no tratamento de água.

A presença de óleos e graxas diminui a área de contato entre a superfície da água e o ar atmosférico, impedindo dessa forma, a transferência do oxigênio da atmosfera para a água.

Em processos de decomposição, a presença dessas substâncias reduz o oxigênio dissolvido elevando a DBO e a DQO, causando alteração no ecossistema aquático.

Na legislação brasileira não existem valores limites estabelecidos para esse parâmetro. A recomendação, segundo a Resolução CONAMA 357/2005, é que óleos e graxas sejam virtualmente ausentes nas Classes 1, 2 e 3, enquanto iridescências são toleradas para a Classe 4.

Potencial Hidrogeniônico (pH)

O pH define o caráter ácido, básico ou neutro de uma solução aquosa. Sua origem natural está associada à dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica e a fotossíntese, enquanto sua origem antropogênica está relacionada aos despejos domésticos e industriais. Os organismos aquáticos estão geralmente adaptados às condições de neutralidade e, em conseqüência, alterações bruscas do pH de uma água afetam as taxas de crescimento de microorganismos e podem resultar no desaparecimento dos organismos presentes na mesma. Os valores fora das faixas recomendadas podem alterar o sabor da água e contribuir para corrosão do sistema de distribuição de água, ocorrendo, assim, uma possível extração do ferro, cobre, chumbo, zinco e cádmio e dificultar a descontaminação das águas.

Sulfatos

Os sulfatos são sais moderadamente a muito solúveis em água, exceto sulfatos de estrôncio e de bário. A presença de sulfato nas águas está relacionada à oxidação de sulfetos nas rochas e à lixiviação de compostos sulfatados como gipsita e anidrita. Nas águas superficiais, ocorre através das descargas de esgotos domésticos (por exemplo, através da degradação de proteínas) e efluentes industriais (exemplos: efluentes de indústrias de celulose e papel, química, farmacêutica, etc.). Têm interesse sanitário para águas de abastecimento público por sua ação laxativa, como sulfato de magnésio e o sulfato de sódio.

Sulfetos

Os sulfetos são combinações de metais, não metais, complexos e radicais orgânicos, ou são os sais e ésteres do ácido sulfídrico (H_2S). A maioria dos sulfetos metálicos de uso comercial é de origem vulcânica. Sulfetos metálicos têm importante papel na química analítica para a identificação de metais. Sulfetos inorgânicos encontram aplicações como pigmentos e substâncias luminescentes. Sulfetos orgânicos e disulfetos são amplamente distribuídos nos reinos animal e vegetal. São aplicados industrialmente como protetores de radiação queratolítica.

Os íons sulfeto presentes na água podem precipitar na forma de sulfetos metálicos em condições anaeróbicas e na presença de determinados íons metálicos.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Substâncias tensoativas

As substâncias tensoativas reduzem a tensão superficial da água, pois possuem em sua molécula uma parte solúvel e outra não solúvel na água. A constituição dos detergentes sintéticos tem como princípio ativo o denominado “surfactante” e algumas substâncias denominadas de coadjuvantes, como o fosfato. O principal inconveniente dos detergentes na água se relaciona aos fatores estéticos, devido à formação de espumas em ambientes aeróbios.

Alumínio (Al)

O alumínio é o principal constituinte de um grande número de componentes atmosféricos, particularmente de poeira derivada de solos e partículas originadas da combustão de carvão. Na água, o alumínio é complexado e influenciado pelo pH, temperatura e a presença de fluoretos, sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes. O alumínio é pouco solúvel em pH entre 5,5 e 6,0, devendo apresentar maiores concentrações em profundidade, onde o pH é menor e pode ocorrer anaerobiose. O aumento da concentração de alumínio está associado com o período de chuvas e, portanto, com a alta turbidez.

Outro aspecto chave da química do alumínio é sua dissolução no solo para neutralizar a entrada de ácidos com as chuvas ácidas. Nesta forma, ele é extremamente tóxico à vegetação e pode ser escoado para os corpos de água.

A principal via de exposição humana não ocupacional é pela ingestão de alimentos e água. O acúmulo de alumínio no homem tem sido associado ao aumento de casos de demência senil do tipo Alzheimer. Não há indicação de carcinogenicidade para o alumínio.

Arsênio (As)

Devido às suas propriedades semimetálicas, o arsênio é utilizado em metalurgia como um metal aditivo. A adição de cerca de 2% de arsênio ao chumbo permite melhorar a sua esfericidade, enquanto 3% de arsênio numa liga à base de chumbo melhora as propriedades mecânicas e otimiza o seu comportamento à elevadas temperaturas. Pode também ser adicionado em pequenas quantidades às grelhas de chumbo das baterias para aumentar a sua rigidez.

O arsênio, quando muito puro, é utilizado na tecnologia de semicondutores, para preparar arsenieto de gálio. Este composto é utilizado na fabricação de diodos, LEDs, transistores e lasers. O arsenieto de índio é usado em detectores de infravermelho e em aplicações de efeito de Hall.

A toxicidade do arsênio depende do seu estado químico. Enquanto o arsênio metálico e o sulfeto de arsênio são praticamente inertes, o gás AsH_3 é extremamente tóxico. De um modo geral, os compostos de arsênio são perigosos, principalmente devido aos seus efeitos irritantes na pele. A toxicidade destes compostos se deve, principalmente, à ingestão e não à inalação, embora cuidados de ventilação em ambientes industriais que usem compostos de arsênio sejam necessários.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Bário (Ba)

Em geral, ocorre nas águas naturais em baixas concentrações, variando de 0,7 a 900µg/L. É normalmente utilizado nos processos de produção de pigmentos, fogos de artifício, vidros e praguicidas. A ingestão de bário em doses superiores às permitidas pode causar desde um aumento transitório da pressão sanguínea por vasoconstrição, até sérios efeitos tóxicos sobre o coração.

Boro (B)

O boro é muito reativo de forma que é dificultada a sua ocorrência no estado livre. Contudo, pode-se encontrá-lo combinado em diversos minerais. O boro, na sua forma combinada como bórax ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) é utilizado desde tempos imemoriais. É usado como matéria-prima na produção de vidro de borossilicato, resistente ao calor, para usos domésticos e laboratoriais, familiarmente conhecido pela marca registrada Pirex, bem como na preparação de outros compostos de boro.

Em sua forma elementar, é duro e quebradiço como o vidro, tendo aplicações semelhantes a este. Pode ser adicionado a metais puros, ligas ou outros sólidos, para aumentar a sua resistência plástica, acrescentando, assim, a rigidez do material.

O boro elementar não é significativamente tóxico, não podendo ser classificado como veneno; no entanto, quando em pó muito fino, é duro e abrasivo, podendo causar indiretamente problemas de pele, se esta for esfregada depois de estar em contato com ele. Pequenas quantidades de boro parecem ser indispensáveis para o crescimento das plantas, mas, em grandes quantidades, este elemento é tóxico. O boro acumulado no corpo através da absorção, ingestão ou inalação dos seus compostos, atua sobre o sistema nervoso central, causando hipotensão, vômitos e diarreia e, em casos extremos, coma.

Cádmio (Cd)

O cádmio possui uma grande mobilidade em ambientes aquáticos, é bioacumulativo, isto é, acumula-se em organismos aquáticos, podendo entrar na cadeia alimentar, e é persistente no ambiente. Está presente em águas doces em concentrações-traço, geralmente inferiores a 1µg/L. Pode ser liberado para o ambiente através da queima de combustíveis fósseis e é utilizado na produção de pigmentos, baterias, soldas, equipamentos eletrônicos, lubrificantes, acessórios fotográficos, praguicidas etc.

É um subproduto da mineração do zinco. O elemento e seus compostos são considerados potencialmente carcinogênicos e podem ser fatores para vários processos patológicos no homem, incluindo disfunção renal, hipertensão, arteriosclerose, doenças crônicas em idosos e câncer.

Chumbo (Pb)

Em sistemas aquáticos, o comportamento dos compostos de chumbo é determinado principalmente pela hidrossolubilidade. Teores de chumbo acima de 0,1mg/L inibem a oxidação bioquímica de substâncias orgânicas e são prejudiciais para os organismos aquáticos inferiores. Concentrações de chumbo entre 0,2 e 0,5mg/L empobrecem a fauna e, a partir de 0,5mg/L, inibem a nitrificação na água, afetando a ciclagem do nitrogênio.

A queima de combustíveis fósseis é uma das principais fontes de chumbo, além da sua utilização como aditivo anti-impacto na gasolina. Este metal é uma substância tóxica cumulativa e uma intoxicação crônica pode levar a uma doença denominada saturnismo, que ocorre, na maioria das vezes, em trabalhadores expostos ocupacionalmente. Outros sintomas de uma exposição crônica ao chumbo, quando o sistema nervoso central é afetado, são tonturas, irritabilidade, dor de cabeça, perda de memória, entre outros. Quando o efeito ocorre no sistema periférico, o sintoma é a deficiência dos músculos extensores. A toxicidade do chumbo, quando aguda, é caracterizada por sede intensa, sabor metálico, inflamação gastro-intestinal, vômitos e diarreias.

Cobre (Cu)

A disponibilização de cobre para o meio ambiente ocorre através da corrosão de tubulações de latão por águas ácidas, efluentes de estações de tratamento de esgotos, uso de compostos de cobre como algicidas aquáticos, escoamento superficial e contaminação da água subterrânea devido a usos agrícolas do cobre como fungicida e pesticida no tratamento de solos e efluentes, além de precipitação atmosférica de fontes industriais.

As principais fontes industriais são as minerações, fundições, refinarias de petróleo e têxteis. No homem, a ingestão de doses excessivamente altas pode acarretar em irritação e corrosão de mucosas, danos capilares generalizados, problemas hepáticos e renais e irritação do sistema nervoso central seguido de depressão.

Cromo (Cr)

O cromo está presente nas águas nas formas tri (III) e hexavalente (VI). Na forma trivalente, o cromo é essencial ao metabolismo humano e sua carência causa doenças. Já na forma hexavalente, é tóxico e cancerígeno. Atualmente, os limites máximos são estabelecidos basicamente em função do cromo total. Os organismos aquáticos inferiores podem ser prejudicados por concentrações de cromo acima de 0,1mg/L, enquanto o crescimento de algas já está sendo inibido no âmbito de teores de cromo entre 0,03 e 0,032mg/L.

O cromo, como outros metais, acumula-se nos sedimentos. É comumente utilizado em aplicações industriais e domésticas, como na produção de alumínio anodizado, aço inoxidável, tintas, pigmentos, explosivos, papel e fotografia.

Ferro (Fe)

O ferro aparece, normalmente, da dissolução de compostos do solo e dos despejos industriais. Em épocas de alta precipitação o nível de ferro na água aumenta em decorrência dos processos de erosão nas margens dos corpos de água. Nas indústrias metalúrgicas, o ferro é disponibilizado através da decapagem que consiste na remoção da camada oxidada das peças antes de seu uso. Em quantidade adequada, este metal é essencial ao sistema bioquímico das águas, podendo, em grandes quantidades, se tornar nocivo, dando sabor e cor desagradáveis à água, além de elevar a dureza, tornando-a inadequada ao uso doméstico e industrial.

Magnésio (Mg)

O magnésio é um elemento essencial para a vida animal e vegetal. A atividade fotossintética da maior parte das plantas é baseada na absorção da energia da luz solar, para transformar água e dióxido de carbono em hidratos de carbono e oxigênio. Esta reação só é possível devido à presença de clorofila, cujos pigmentos contêm um composto rico em magnésio.

A falta de magnésio no corpo humano pode provocar diarreia ou vômitos bem como hiper-irritabilidade ou uma ligeira calcificação nos tecidos. O excesso de magnésio é prontamente eliminado pelo corpo.

Entre outras aplicações dos seus compostos, salienta-se a utilização do óxido de magnésio na fabricação de materiais refratários e nas indústrias de borracha, fertilizantes e plásticos, o uso do hidróxido em medicina como antiácido e laxante, do carbonato básico como material isolante em caldeiras e tubagens e ainda nas indústrias de cosméticos e farmacêutica. Os sulfatos (sais de Epsom) são usados como laxantes, fertilizantes para solos empobrecidos em magnésio e ainda nas indústrias têxteis e papelaria; e o cloreto é usado na obtenção do metal, na indústria têxtil e na fabricação de colas e cimentos especiais.

As aplicações do magnésio são múltiplas, como a construção mecânica, sobretudo nas indústrias aeronáutica e automobilística, quer como metal puro, quer sob a forma de ligas com alumínio e zinco, ou com metais menos freqüentes, como o zircônio, o tório, os lantanídeos e outros.

Manganês (Mn)

O manganês aparece, normalmente, da dissolução de compostos do solo e dos despejos industriais. É utilizado na fabricação de ligas metálicas e baterias e, na indústria química, em tintas, vernizes, fogos de artifício e fertilizantes, entre outros. Sua presença, em quantidades excessivas, é indesejável em mananciais de abastecimento público devido ao seu efeito no sabor, no tingimento de instalações sanitárias, no aparecimento de manchas nas roupas lavadas e no acúmulo de depósitos em sistemas de distribuição. A água potável contaminada com manganês pode causar a doença denominada manganismo, com sintomas similares aos vistos em mineradores de manganês ou trabalhadores de plantas de aço.

Merúrio (Hg)

Entre as fontes antropogênicas de mercúrio no meio aquático destacam-se as indústrias cloro-álcali de células de mercúrio, vários processos de mineração e fundição, efluentes de estações de tratamento de esgotos, fabricação de certos produtos odontológicos e farmacêuticos, indústrias de tintas, dentre outras.

O mercúrio prejudica o poder de autodepuração das águas a partir de uma concentração de apenas 18µg/L. Este elemento pode ser adsorvido em sedimentos e em sólidos em suspensão. O metabolismo microbiano é perturbado pelo mercúrio através de inibição enzimática. Alguns microrganismos são capazes de metilar compostos inorgânicos de mercúrio, aumentando assim sua toxicidade.

O acúmulo de mercúrio nos tecidos do peixe é uma das principais vias a carga de mercúrio no corpo humano, já que o mercúrio mostra-se mais tóxico na forma de compostos organometálicos. A intoxicação aguda por este metal pesado, no homem, é caracterizada por náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, danos nos ossos e morte. A intoxicação crônica afeta glândulas salivares, rins e altera as funções psicológicas e psicomotoras.

Níquel (Ni)

O níquel é o 24º metal em abundância no meio ambiente, tendo sua ocorrência distribuída em vários minerais em diferentes formas. Ele está presente na superfície associado ao enxofre, ácido silícico, arsênio ou antimônio. A maior contribuição de níquel para o meio ambiente, através da atividade humana, é a queima de combustíveis fósseis. Além disso, as principais fontes são as atividades de mineração e fundição do metal, fusão e modelagem de ligas, indústrias de eletrodeposição e as fontes secundárias, como a fabricação de alimentos, artigos de panificadoras, refrigerantes e sorvetes aromatizados. Doses elevadas de níquel podem causar dermatites nos indivíduos mais sensíveis e afetar nervos cardíacos e respiratórios. O níquel acumula-se no sedimento, em musgos e plantas aquáticas superiores.

Potássio (K)

O potássio é encontrado em baixas concentrações nas águas naturais, já que as rochas que o contêm são relativamente resistentes às ações do tempo. Entretanto, sais de potássio são largamente usados na indústria e em fertilizantes para agricultura, entrando nas águas doces com descargas industriais e lixiviação das terras agrícolas. O potássio é usualmente encontrado na forma iônica, e os sais são altamente solúveis.

Selênio (Se)

É um elemento raro que tem a particularidade de possuir um odor pronunciado bastante desagradável. Ocorre na natureza juntamente com o enxofre ou sob a forma de selenetos em certos minerais.

As principais fontes de selênio são, todavia, os minérios de cobre, dos quais o selênio é recuperado como subproduto nos processos de refinação eletrolítica. Os maiores produtores mundiais são os Estados Unidos, o Canadá, a Suécia, a Bélgica, o Japão e o Peru.

O selênio e os seus compostos encontram largo uso nos processos de reprodução xerográfica, na indústria vidreira (seleneto de cádmio, para produzir cor vermelho-rubi), como desgaseificante na indústria metalúrgica, como agente de vulcanização, como oxidante em certas reações e como catalisador.

O selênio elementar é relativamente pouco tóxico. No entanto, alguns dos seus compostos são extremamente perigosos. A exposição aos vapores que contenham selênio pode provocar irritações dos olhos, nariz e garganta. A inalação desses vapores pode ser muito perigosa devido à sua elevada toxicidade.

Sódio (Na)

O sódio é um dos elementos mais abundantes na superfície terrestre e seus sais são altamente solúveis em água sendo, portanto, identificado em todas as águas naturais. É disponibilizado para a natureza através da decomposição de plantas e animais ou pode provir, principalmente, de esgotos, fertilizantes, indústrias de papel e celulose. É comumente medido onde a água é utilizada para beber ou para agricultura, particularmente na irrigação.

Zinco (Zn)

O zinco é oriundo de processos naturais e antropogênicos, dentre os quais se destacam produção de zinco primário, combustão de madeira, incineração de resíduos, siderurgias, cimento, concreto, cal e gesso, indústrias têxteis, termoelétricas e produção de vapor, além das efluentes domésticos. Alguns compostos orgânicos de zinco são aplicados como pesticidas. Quando disponível no ambiente aquático, acumula-se nos sedimentos. Na forma residual não é acessível para os organismos, entretanto, pode ser remobilizado do sedimento através de formadores de complexos. Por ser um elemento essencial para o ser humano, o zinco só se torna prejudicial à saúde quando ingerido em concentrações muito altas, podendo causar perturbações do trato gastrointestinal, irritações na pele, olhos e mucosas, deterioração dentária e câncer nos testículos.

3.1.3. Parâmetros Microbiológicos

Coliformes Totais

Conforme Portaria nº 518/2004 o grupo de coliformes totais é definido como bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a lactose com produção de ácidos, gás e aldeídos a $35,0 \pm 0,5^\circ\text{C}$ em 24-48 horas, e que podem apresentar atividade da enzima β -galactosidase. O grupo de coliformes totais constitui-se em um grande grupo de bactérias que têm sido isoladas de amostras de águas e solos poluídos e não poluídos, bem como em fezes de seres humanos e outros animais de sangue quente.

Coliformes termotolerantes

Segundo a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, os coliformes termotolerantes são subgrupo das bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a $44,5 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ em 24 horas.

As bactérias do grupo coliforme são alguns dos principais indicadores de contaminações fecais, originadas do trato intestinal humano e de outros animais. Essas bactérias reproduzem-se ativamente a $44,5^{\circ}\text{C}$ e são capazes de fermentar o açúcar. A determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro indicativo da possibilidade de existência de microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, disenteria bacilar e cólera.

Streptococos Fecais

Os estreptococos fecais incluem várias espécies ou variedades de estreptococos, tendo no intestino de seres humanos e outros animais de sangue quente o seu habitat usual. A ocorrência dessas bactérias pode indicar a presença de organismos patogênicos na água. Essas bactérias não conseguem se multiplicar em águas poluídas, sendo sua presença indicativa de contaminação fecal recente.

A partir de relações conhecidas entre os resultados de coliformes termotolerantes e estreptococos fecais pode-se ter uma indicação de se o material fecal presente na água é de origem humana ou animal. A relação menor que um (1) indica que os despejos são preponderantemente provenientes de animais domésticos, enquanto que, para despejos humanos, apresenta-se maior que quatro (4). Quando a relação se encontra na faixa entre os dois valores, a interpretação se torna duvidosa. Contudo, há algumas restrições para a interpretação sugerida:

- O pH da água deve se encontrar entre 4 e 9, para excluir qualquer efeito adverso do mesmo em ambos os grupos de organismo;
- Devem ser feitas, no mínimo, duas contagens em cada amostra;
- Para minimizar erros devidos a diferentes taxas de morte das bactérias, as amostras devem ser coletadas em no máximo 24 horas, a jusante da fonte geradora;
- Somente devem ser empregadas contagens de coliformes fecais obtidas a 44°C .

3.1.4. Parâmetros Hidrobiológicos

Como espécies representativas do nível trófico inferior, as algas são organismos ecologicamente importantes, porque servem como fonte de alimento fundamental para outras espécies aquáticas e ocupam, assim, uma posição única entre os produtores primários: são um elo importante na cadeia alimentar e essenciais à “economia” dos ambientes aquáticos como alimento. As algas são diretamente afetadas por efluentes domésticos, industriais e agrossilvopastoris.

Em casos de nutrientes em excesso, ocorre um rápido crescimento e multiplicação e, nestas condições, pode haver um deslocamento da população, dominação por uma(s) espécie(s) e/ou floração de algas, condições estas que indicam deterioração na qualidade da água.

Clorofila-a

As algas pertencentes ao reino protista apresentam pigmentos – clorofilas, carotenos e xantofilas – organizados em organelas denominadas plastos, que permitem a fotossíntese. A determinação quantitativa destes pigmentos fotossintetizantes em ambientes aquáticos tem grande importância na indicação do estado fisiológico da comunidade fitoplanctônica, bem como no estudo da produtividade primária de um ambiente. Esta determinação propicia a visualização do grau de eutrofização, constituindo uma estimativa da biomassa algal.

3.1.5 Bioensaios Ecotoxicológicos

Ensaio de Toxicidade Crônica

Os ensaios de toxicidade consistem na determinação do potencial tóxico de um agente químico ou de uma mistura complexa, sendo os efeitos desses poluentes detectados através da resposta de organismos vivos.

Com ampla utilização nos países desenvolvidos e em uso em alguns estados do Brasil, os testes de toxicidade complementam a metodologia tradicionalmente adotada através de padrões de emissão e de qualidade para controle de poluição das águas. Estes testes são ferramentas importantes para a melhor compreensão dos impactos das atividades econômicas sobre um dado corpo de água. Assim, podem ser utilizados como base para ações que visem a redução da toxicidade do despejo líquido, de seu efeito sobre o corpo receptor e, em última instância, a promoção da melhoria da qualidade ambiental.

No ensaio de toxicidade crônica o organismo aquático utilizado é o microcrustáceo *Ceriodaphnia dubia*. São utilizadas as denominações Agudo, Crônico e Não Tóxico, para descrever os eventuais efeitos deletérios sobre os organismos aquáticos. O efeito agudo é caracterizado por uma resposta severa e rápida a um estímulo, a qual se manifesta nos organismos aquáticos em tempos relativamente curtos (0 a 96 horas), sendo o efeito morte o mais observado. O efeito crônico caracteriza-se pela resposta a um estímulo que continua por longos períodos (1/10 do ciclo vital até a totalidade da vida do organismo) de exposição do organismo ao poluente, que pode ser expressa através de mudanças comportamentais, alterações fisiológicas, genéticas e de reprodução, etc.

Quando da ocorrência de eventos caracterizando qualquer efeito tóxico (agudo ou crônico) nas amostras de água coletadas, pode-se considerar que os respectivos corpos de água que estão sendo avaliados não apresentam condições adequadas para a manutenção da vida aquática.

4. INDICADORES DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

No intuito de traduzir de forma concisa e objetiva para as autoridades e o público a influência que as atividades ligadas aos processos de desenvolvimento provocam na dinâmica ambiental dos ecossistemas aquáticos, foram criados os indicadores de qualidade de águas.

O Projeto “Águas de Minas” adota o IQA – Índice de Qualidade das Águas, a CT – Contaminação por Tóxicos e os Testes Ecotoxicológicos como indicadores para refletir a situação ambiental dos corpos hídricos nas UPGRHs de Minas Gerais de maneira acessível aos não técnicos.

O IQA, por reunir em um único resultado os valores de nove diferentes parâmetros, oferece ao mesmo tempo vantagens e limitações. A vantagem reside no fato de sumarizar a interpretação de nove variáveis em um único número, facilitando a compreensão da situação para o público leigo. A limitação relaciona-se à perda na interpretação das variáveis individuais e da relação destas com as demais. Soma-se a isto o fato de que este índice foi desenvolvido visando avaliar o impacto dos esgotos domésticos nas águas utilizadas para abastecimento público, não representando efeitos originários de outras fontes poluentes.

Como uma forma de minimizar a parcialidade do IQA, foram adotados em Minas Gerais a CT – Contaminação por Tóxicos e os Testes Ecotoxicológicos, de maneira a complementar as informações do IQA, conferindo importância a outros fatores que afetam usos diversos da água. Os valores limites em relação a 12 parâmetros para contaminantes de origem industrial, minerária e difusa são os definidos na Resolução CONAMA 357/2005.

4.1. Índice de Qualidade das Águas - IQA

O IQA foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation dos Estados Unidos, através de pesquisa de opinião junto a vários especialistas da área ambiental, quando cada técnico selecionou, a seu critério, os parâmetros relevantes para avaliar a qualidade das águas e estipulou, para cada um deles, um peso relativo na série de parâmetros especificados.

O tratamento dos dados da mencionada pesquisa definiu um conjunto de nove (9) parâmetros considerados mais representativos para a caracterização da qualidade das águas: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez e sólidos totais. A cada parâmetro foi atribuído um peso, conforme apresentado na Tabela a seguir, de acordo com a sua importância relativa no cálculo do IQA, e traçadas curvas médias de variação da qualidade das águas em função da concentração do mesmo.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Parâmetro	Peso - w_i
Oxigênio dissolvido – OD (%ODSat)	0,17
Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)	0,15
pH	0,12
Demanda bioquímica de oxigênio – DBO (mg/L)	0,10
Nitratos (mg/L NO_3^-)	0,10
Fosfato total (mg/L PO_4^-)	0,10
Variação na temperatura (°C)	0,10
Turbidez (UNT)	0,08
Resíduos totais (mg/L)	0,08

No Projeto “Águas de Minas”, os resultados laboratoriais gerados, alguns deles utilizados no cálculo do IQA, são armazenados em um banco de dados em Access, que também efetua comparações entre os valores obtidos.

As metodologias para o cálculo do IQA consideram duas formulações, uma aditiva e outra multiplicativa. Neste trabalho, adota-se o IQA multiplicativo, que é calculado pela seguinte equação:

$$IQA = \prod_{i=1}^9 q_i^{w_i}$$

Onde:

IQA = Índice de Qualidade de Água, variando de 0 a 100;

q_i = qualidade do parâmetro i obtido através da curva média específica de qualidade;

w_i = peso atribuído ao parâmetro, em função de sua importância na qualidade, entre 0 e 1.

As curvas médias de qualidade de cada parâmetro que são utilizadas para o Projeto Águas de Minas estão apresentadas no Anexo B, bem como as respectivas equações que são utilizadas no programa de cálculo do IQA.

Para o cálculo do IQA é utilizado um software desenvolvido pelo CETEC – Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. Os valores do índice variam entre 0 e 100, conforme especificado a seguir:

Nível de Qualidade	Faixa
Excelente	$90 < IQA \leq 100$
Bom	$70 < IQA \leq 90$
Médio	$50 < IQA \leq 70$
Ruim	$25 < IQA \leq 50$
Muito Ruim	$0 \leq IQA \leq 25$

Assim definido, o IQA reflete a interferência por esgotos sanitários e outros materiais orgânicos, nutrientes e sólidos.

4.2. Contaminação por Tóxicos - CT

Em função das concentrações observadas dos parâmetros tóxicos: Amônia, Arsênio total, Bário total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livres, Cobre total (1997 a 2004) e Cobre dissolvido (a partir de 2005), Cromo hexavalente (1997 a 2004) e Cromo total (a partir de 2005), Fenóis totais, Mercúrio total, Nitritos, Nitratos e Zinco total, a contaminação por tóxicos é caracterizada como Baixa, Média ou Alta. Comparam-se os valores analisados com os limites definidos nas classes de enquadramento dos corpos de água pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, na Resolução Nº 357/05, para os dados obtidos a partir de 2005 e na Deliberação Normativa 10/86, para aqueles referentes ao período de 1997 a 2004. A denominação Baixa refere-se à ocorrência de substâncias tóxicas em concentrações que excedam em até 20% o limite de classe de enquadramento do trecho do corpo de água onde se localiza a estação de amostragem. A contaminação Média refere-se à faixa de concentração que ultrapasse os limites mencionados no intervalo de 20% a 100%, enquanto a contaminação Alta refere-se às concentrações que excedam em mais de 100% os limites, como mostrado na Tabela abaixo. A pior situação identificada no conjunto total de resultados das campanhas de amostragem, para qualquer parâmetro tóxico, define a faixa de contaminação do período em consideração. Portanto, se apenas um dos parâmetros tóxicos em uma dada estação de amostragem mostrar-se com valor acima de 100%, isto é, o dobro da sua concentração limite apontada na Resolução CONAMA 357/05 (dados a partir de 2005) e na DN 10/86 (dados de 1997 a 2004), em pelo menos uma das campanhas do ano, a contaminação da água por tóxicos naquela estação de amostragem será considerada Alta no ano em análise.

Contaminação	Concentração em relação à classe de enquadramento
Baixa	concentração $\leq 1,2.P$
Média	$1,2. P < \text{concentração} \leq 2.P$
Alta	concentração $> 2.P$

P = Limite de Classe definido na Resolução CONAMA Nº 357/05 (dados a partir de 2005) e Limite de Classe definido na Deliberação Normativa COPAM Nº 10/86 (dados de 1997 a 2004)

A partir dos resultados do IQA e da CT de cada estação de amostragem, foi produzido o mapa “Qualidade das Águas Superficiais em 2007 no Estado de Minas Gerais”. O nível de qualidade é apresentado com a cor do valor resultante da média aritmética anual dos valores de IQA das quatro campanhas de amostragem, no trecho de corpo de água situado a montante da estação em referência. A contaminação por tóxicos baseia-se no conjunto total de resultados avaliados para cada estação de amostragem, sendo representada no próprio ponto com a cor representativa da pior condição observada na estação no ano em referência. O mapa foi gerado a partir de bases cartográficas em escalas 1:100.000 e 1:50.000, digitalizadas no contexto do projeto GeoMINAS, cartas topográficas do IBGE utilizando-se o software ArcView.

Segundo a metodologia do cálculo do IQA, a falta de resultados dos parâmetros coliformes termotolerantes e o oxigênio dissolvido inviabiliza o cálculo desse índice, já que esses parâmetros possuem os maiores pesos no cálculo do IQA. Em 2007, ocorreram perdas de informações referentes ao parâmetro coliformes termotolerantes para algumas estações de amostragem da rede básica operada pelo IGAM. Deste modo, não foi possível calcular o IQA para a campanha na qual ocorreu a perda desse dado.

Conseqüentemente, a média anual do IQA para essas estações também não foi calculada, uma vez que esse resultado é obtido pela média aritmética do Índice de Qualidade das Águas calculado trimestralmente. Por tais razões nos relatórios são apresentados os mapas trimestrais com os resultados de qualidade, além do mapa anual, como de costume.

4.3 Bioensaios Ecotoxicológicos

Considerando a porcentagem de resultados positivos dos ensaios de ecotoxicidade realizados com o microcrustáceo *Ceriodaphnia dubia*, a ocorrência de toxidez da água na estação de amostragem analisada foi classificada como Baixa, Média ou Alta. A atribuição de Baixa Ocorrência de Toxicidade foi dada àquela estação que apresentou efeitos tóxicos em até 25% das análises, enquanto as denominações Média e Alta correspondem à ocorrência de resultados positivos em 25-50% e 51-100% dos testes, respectivamente.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos adotados norteiam-se pelos objetivos principais estabelecidos para os trabalhos de monitoramento da qualidade das águas, que são:

- Diagnóstico – conhecer e avaliar as condições de qualidade das águas;
- Divulgação – divulgar a situação de qualidade das águas para os usuários;
- Planejamento – fornecer subsídios para o planejamento da gestão dos recursos hídricos em geral, verificar a efetividade das ações de controle ambiental implementadas e propor prioridades de atuação.

Assim, primeiramente descreve-se a rede de monitoramento de 260 estações de amostragem distribuídas em 34 UPGRHs das 8 bacias principais de Minas Gerais. A seguir, detalham-se os dois tipos de campanhas anuais de coleta e o conjunto de análises executadas para as amostras. O próximo item indica a metodologia analítica dos ensaios feitos para os parâmetros medidos no Projeto “Águas de Minas”.

A partir daí descreve-se a avaliação temporal e a avaliação espacial dos resultados, a obtenção dos dados hidrológicos, bem como a avaliação ambiental e as ações de controle ambiental propostas para cada bacia.

5.1. Rede de Monitoramento

A rede de monitoramento é constituída, atualmente, de 260 estações de amostragem, que abrangem as oito maiores bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais cobrindo 578.336 Km², o que representa 98% de sua área total. Destaca-se que 50 novas estações foram implantadas em 2007, totalizando 310 pontos de monitoramento. Entretanto, para efeito de discussão dos dados, serão consideradas apenas as 260 estações já existentes, uma vez que, para as novas estações implantadas nesse ano, foram realizadas coletas a partir da terceira campanha na bacia do rio Uruçuaia e da quarta campanha nas bacias dos rios Pará, Paraopeba, São Francisco (UPGRHs SF1 e SF4) e Grande. Esses resultados serão apresentados nos relatórios de cada bacia.

Na definição dos locais de coleta, buscou-se identificar áreas que caracterizassem as condições naturais das águas de cada bacia hidrográfica e as principais interferências antrópicas, especialmente relacionadas à ocupação urbana e às atividades industriais e minerárias, além da agropecuária e silvicultura. Além disso, foram consideradas redes de qualidade de água anteriormente operadas em Minas Gerais e dados dos processos de licenciamento ambiental da FEAM/COPAM.

A localização dos pontos de coleta, efetuada em escritório, foi validada ou remanejada em levantamentos de campo, quando foram efetuados os georreferenciamentos utilizando-se mapas e GPS (Global Position System), o registro fotográfico dos pontos e a otimização dos roteiros das campanhas de coleta. As descrições dos pontos de coleta da UPGRH caracterizada neste relatório encontram-se no Item 9.

A rede em operação (macro-rede) foi adequada ao longo da execução dos trabalhos, adotando-se como referência a experiência desenvolvida pelos países membros da União Européia. Assim sendo, estabeleceu-se como meta a razão de uma estação de monitoramento por 1.000km², que é a densidade média adotada nos mencionados países.

Considerando-se os níveis de densidade populacional e infra-estrutura industrial, a rede em operação no Estado possui uma representatividade superior àquela empregada pela União Européia. Contudo, trata-se de uma macro-rede de monitoramento, permanecendo com abrangência regional para caracterização da qualidade de água. Nessa configuração, o número de pontos de coleta por bacia e sub-bacia contemplada, com as respectivas densidades, pôde ser observado na Tabela 2.1.

Considerando as 260 estações distribuídas por todo o Estado, a densidade atual de estações é 0,45/1000km². No entanto, a densidade de pontos é superior a uma estação/1.000km² nas seguintes UPGRHs: SF2, sub-bacia do rio Pará, SF3, sub-bacia do rio Paraopeba e SF5, sub-bacia do rio das Velhas; na GD4, sub-bacia do rio Verde; na DO2, sub-bacia do rio Piracicaba; e na PS1, sub-bacia do rio Paraibuna e PS2, sub-bacias dos rios Pomba e Muriaé. Nessas regiões, são dominantes as pressões ambientais decorrentes de atividades industriais, minerárias e de infra-estrutura, exigindo, portanto, uma caracterização mais particularizada da qualidade das águas e, dessa forma, devendo-se dar início a redes mais específicas denominadas redes dirigidas.

5.2. Coletas e Análises

As amostragens e análises são contratadas junto à Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, sendo realizadas a cada trimestre, com um total anual de 4 (quatro) campanhas de amostragem por estação. As amostras coletadas são do tipo simples, de superfície, tomadas preferencialmente na calha principal do corpo de água, tendo em vista que a grande maioria dos pontos de coleta localiza-se sobre pontes.

5.2.1. Coletas

Foram definidos dois tipos de campanhas de amostragem: **completas** e **intermediárias**. As campanhas completas, realizadas em janeiro/fevereiro/março e em julho/agosto/setembro, caracterizam respectivamente os períodos de chuva e estiagem, enquanto as intermediárias, realizadas nos meses abril/maio/junho e outubro/novembro/dezembro, caracterizam os demais períodos climáticos do ano.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Nas campanhas completas é realizada uma extensa série de análises, englobando, em média, 50 parâmetros comuns ao conjunto de pontos de amostragem, conforme apresentado na Tabela 5.1.

Nas campanhas intermediárias são analisados 16 parâmetros genéricos em todos os locais, como mostra a Tabela 5.2. Para as regiões onde a pressão de atividades industriais e minerárias é mais expressiva, como é o caso das sub-bacias dos rios das Velhas, Paraopeba, Pará, Verde e trechos das bacias dos rios Paraíba do Sul, Doce, Grande e São Francisco, também são incluídos parâmetros característicos das fontes poluidoras que contribuem para a área de drenagem da estação de coleta, conforme a Tabela 5.3.

Tabela 5.1: Relação dos parâmetros analisados nas campanhas completas

Parâmetros comuns a todos os pontos	
Alcalinidade Bicarbonato	Ferro Dissolvido
Alcalinidade Total	Fósforo Total
Alumínio Total*	Fenóis Totais
Alumínio dissolvido**	Manganês Total
Arsênio Total	Mercúrio Total
Bário Total	Níquel Total
Boro Total	Nitrato
Cádmio Total	Nitrito
Cálcio	Nitrogênio Amoniacal Total
Chumbo Total	Nitrogênio Orgânico
Cianeto Livre	Óleos e Graxas
Clorofila-a	Oxigênio Dissolvido - OD
Cloreto Total	pH "in loco"
Cobre Dissolvido**	Potássio
Cobre Total	Selênio Total
Coliformes Termotolerantes	Sódio
Coliformes Totais	Sólidos Dissolvidos Totais
Condutividade Elétrica "in loco"	Sólidos suspensos totais
Cor Verdadeira	Sólidos Totais
Cromo(III)	Substâncias tensoativas
Cromo(VI)	Sulfato Total
Cromo Total **	Sulfetos
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO	Temperatura da Água
Demanda Química de Oxigênio – DQO	Temperatura do Ar
Dureza (Cálcio)	Turbidez
Dureza (Magnésio)	Zinco Total
Estreptococos Fecais	

* Este parâmetro foi analisado somente nas bacias dos rios Doce, Paraíba do Sul e Grande.

** Parâmetros inseridos a partir de 2005, em adequação à resolução CONAMA 357/05.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.2: Relação dos parâmetros comuns a todas as estações de amostragens analisados nas campanhas intermediárias

Parâmetros comuns a todos os pontos	
Cloreto total	Nitrogênio amoniacal total
Clorofila-a	Oxigênio Dissolvido
Coliformes termotolerantes	pH "in loco"
Coliformes totais	Sólidos suspensos totais
Condutividade Elétrica "in loco"	Sólidos Totais
Demanda Bioquímica de Oxigênio	Temperatura da Água
Fósforo Total	Temperatura do Ar
Nitrato	Turbidez

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	
UPGRHs SF1 e SF4: Rio São Francisco Sul	
SF001	Fenóis totais e Densidade de cianobactérias
SF002	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF003	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF004	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Fenóis totais, Mercúrio total, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF005	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Mercúrio total, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF006	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF007	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF008	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF009	Cádmio total, Cor verdadeira, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Substâncias tensoativas
SF010	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF011	Cor, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total
SF013	Cádmio total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF015	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF017	Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF042	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre solúvel, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Ferro solúvel, Mercúrio total, Mercúrio total, Níquel total, Nitrito, Nitrogênio orgânico, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	
UPGRHs SF1 e SF4: Rio São Francisco Sul	
SF044	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre solúvel, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Ferro solúvel, Manganês total, Mercúrio total, Nitrito, Nitrogênio orgânico, Níquel total, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total
SF046	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre solúvel, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Ferro solúvel, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Nitrito, Nitrogênio orgânico, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total
SF048	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre solúvel, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Ferro solúvel, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Nitrito, Nitrogênio orgânico, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total
SF050	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre solúvel, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Ferro solúvel, Manganês total, Mercúrio total, Nitrito, Nitrogênio orgânico, Níquel total, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total
SF052	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre solúvel, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Ferro solúvel, Manganês total, Mercúrio total, Nitrito, Nitrogênio orgânico, Níquel total, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total
SF054	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre solúvel, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Ferro solúvel, Manganês total, Mercúrio total, Nitrogênio orgânico, Nitrito, Níquel total, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total, Densidade de cianobactérias
SF056	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre solúvel, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Ferro solúvel, Manganês total, Mercúrio total, Nitrogênio orgânico, Nitrito, Níquel total, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total
SF058	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre solúvel, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Ferro solúvel, Manganês total, Mercúrio total, Manganês, Nitrito, Nitrogênio orgânico, Níquel total, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total
SF060	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre solúvel, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Ferro solúvel, Manganês total, Mercúrio total, Manganês, Nitrito, Nitrogênio orgânico, Níquel total, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	
UPGRH SF2: Rio Pará	
PA001	Chumbo total, Cor verdadeira, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Níquel total, Substâncias tensoativas
PA002	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA003	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA004	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Fenóis totais, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA005	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA007	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Fenóis totais, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA009	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA010	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA011	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA013	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA015	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA017	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA019	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA020	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA021	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	
UPGRH SF2: Rio Pará	
PA022	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA024	Chumbo total, Cor, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Níquel total, Substâncias tensoativas.
PA026	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
PA028	Cádmio, Chumbo, Cianeto, Cobre, Cromo total, Ferro solúvel, Índice de fenóis, Mercúrio, Níquel, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco
PA032	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Fenóis totais, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total, Cianobactérias
PA034	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor real, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total, Densidade de cianobactérias,
PA036	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor real, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total, Densidade de cianobactérias,
PA040	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total, Cianobactérias
PA044	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor real, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
UPGRH SF3: Rio Paraopeba	
BP022	Cádmio total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Cor real
BP024	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor real, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Cor real
BP026	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BP027	Bário total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Selênio total, Substâncias tensoativas, Sulfetos, Zinco total
BP029	Cádmio total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BP032	Cádmio total, Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Cor real



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	
UPGRH SF3: Rio Paraopeba	
BP036	Cádmio total, Chumbo total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BP066	Cádmio total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Cor real
BP068	Cádmio total, Ferro dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Fenóis totais, Manganês total
BP069	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Surfactantes aniônicos, Sulfetos, Zinco total, Cor real
BP070	Cádmio total, Chumbo total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BP071	Cianeto livre, Cor verdadeira, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Substâncias tensoativas, Sulfetos, Zinco total
BP072	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cor verdadeira, Cromo (III), Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Substâncias tensoativas, Sulfetos, Zinco total
BP073	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Surfactantes aniônicos, Sulfetos, Zinco total, Cor real
BP074	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Zinco total, Cor real
BP076	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, DQO, Cor verdadeira, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Zinco total
BP078	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BP079	Cádmio total, Cor verdadeira, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BP080	Bário total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Selênio total, Substâncias tensoativas, Sulfetos, Zinco total
BP082	Cádmio total, Chumbo total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Substâncias tensoativas
BP083	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Zinco total
BP084	Arsênio total, Bário total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Selênio total, Substâncias tensoativas, Sulfetos, Zinco total
BP086	Arsênio total, Cádmio total, Chumbo total, Cor verdadeira, DQO, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	
UPGRH SF3: Rio Paraopeba	
BP088	Cádmio total, Cianeto livre, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Substâncias tensoativas, Sulfetos, Zinco total
BP090	Cádmio total, Chumbo total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Substâncias tensoativas
BP092	Arsênio total, Cádmio total, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BP094	Arsênio total, Cádmio total, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BP096	Cádmio total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BP098	Cádmio total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BP099	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Cor real
UPGRH SF5: Rio das Velhas	
BV013	Arsênio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Manganês total, Sulfetos, Níquel total,
BV035	Arsênio total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Dureza, Fenóis totais, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Óleos e Graxas, Substâncias tensoativas, Zinco total
BV037	Arsênio total, Cádmio total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Zinco total
BV062	Arsênio total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Dureza, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Óleos e Graxas, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BV063	Arsênio total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Dureza, DQO, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Óleos e Graxas, Selênio total, Sulfetos, Zinco total
BV067	Arsênio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Óleos e Graxas, Sulfetos, Surfactantes aniônicos, Zinco total
BV076	DQO, Fenóis totais, Manganês total, Óleos e Graxas, Ensaio ecotoxicológico, Zinco total
BV083	Arsênio total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Densidade de cianobactérias, Ensaio ecotoxicológico, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Óleos e Graxas, Substâncias tensoativas, Zinco total



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	
UPGRH SF5: Rio das Velhas	
BV105	Arsênio total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Densidade de cianobactérias, Ensaio ecotoxicológico, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Óleos e Graxas, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BV130	Alcalinidade, Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Dureza, DQO, Ensaio ecotoxicológico, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Óleos e Graxas, Substâncias tensoativas, Toxicidade crônica, Zinco total
BV135	Cor verdadeira, DQO, Ensaio ecotoxicológico, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BV137	Arsênio total, Cobre dissolvido, DQO, Densidade de cianobactérias, Ensaio ecotoxicológico, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Óleos e Graxas, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BV139	Arsênio total, Cobre dissolvido, DQO, Densidade de cianobactérias Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Óleos e Graxas, Zinco total
BV140	Alcalinidade, Chumbo total, Dureza, Cor verdadeira, DQO, Fenóis totais, Manganês total
BV141	Arsênio total, Cobre dissolvido, DQO, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Zinco total
BV142	Arsênio total, Cobre dissolvido, DQO, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Zinco total
BV143	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Óleos e Graxas, Zinco total
BV146	Arsênio total, Cobre dissolvido, DQO, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Zinco total
BV147	Cor verdadeira, Ferro dissolvido, Fenóis totais
BV148	Arsênio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Densidade de cianobactérias, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total
BV149	Arsênio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Densidade de cianobactérias, DQO, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total
BV152	Arsênio total, DQO, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Manganês total
BV153	Arsênio total, Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Densidade de cianobactérias, Ensaio ecotoxicológico, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Óleos e Graxas, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BV154	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ensaio ecotoxicológico, Ferro dissolvido, Manganês total, Níquel total, Óleos e Graxas, Substâncias tensoativas, Zinco total

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	
UPGRH SF5: Rio das Velhas	
BV155	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ensaio ecotoxicológico, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BV156	Arsênio total, DQO, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas
BV160	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Ensaio ecotoxicológico, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Óleos e graxas, Substâncias tensoativas, Zinco total
BV161	Arsênio total, DQO, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total
BV162	Cor verdadeira, Dureza, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total
UPGRHs SF6, SF7, SF8, SF9, SF10: Rio São Francisco Norte	
SF019	Boro dissolvido, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Densidade de cianobactérias, Ensaio ecotoxicológico, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF021	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF023	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Manganês total, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF025	Densidade de cianobactérias, Manganês total, Substâncias tensoativas
SF026	DQO, Nitrogênio orgânico
SF027	Densidade de cianobactérias, Manganês total, Substâncias tensoativas
SF028	DQO, Nitrogênio orgânico
SF029	Boro dissolvido, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Nitrito, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Ensaio ecotoxicológico, Zinco total
SF031	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Manganês total, Nitrito, Substâncias tensoativas, Zinco total
SF033	Densidade de cianobactérias, Manganês total, Substâncias tensoativas
SF034	DQO, Nitrogênio orgânico
SF040	DQO, Nitrogênio orgânico
PT001	Cianeto livre, Cor verdadeira, Fenóis totais, Manganês total
PT003	Cádmio total, Cianeto livre, Cor verdadeira, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Níquel total, Substâncias tensoativas
PT005	Arsênio total, Bário total, Boro dissolvido, Cádmio total, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Ensaio ecotoxicológico, Zinco total



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO	
UPGRHs SF6, SF7, SF8, SF9, SF10: Rio São Francisco Norte	
PT007	Ensaio ecotoxicológico, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total, Substâncias tensoativas
PT009	Cor verdadeira, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total, Substâncias tensoativas
PT010	Cádmio total, DQO, Densidade de cianobactérias, Nitrogênio orgânico
PT011	Cádmio total, Cor verdadeira, Fenóis totais, Manganês total
PT013	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, Fenóis totais, Manganês total
UR001	Cádmio total, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Manganês total, Nitrito, Substâncias tensoativas, Ensaio ecotoxicológico
UR007	Cádmio total, Cor verdadeira, Fenóis totais, Nitrito, Substâncias tensoativas
UR009	Fenóis totais, Substâncias tensoativas
UR011	Cádmio Total, Arsênio Total, Fenóis Totais, Manganês Total, Sulfatos, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Ensaio ecotoxicológico
UR012	Cádmio Total, Arsênio Total, Fenóis Totais e Manganês Total
UR013	Cádmio Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Cor Verdadeira, Cromo Total, Fenóis Totais, Mercúrio Total Ensaio ecotoxicológico,
UR014	Cádmio Total, Arsênio Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Cor Verdadeira, Cromo Total, Fenóis Totais, Surfactantes Aniônicos Densidade de cianobactérias, Ensaio ecotoxicológico
UR015	Cádmio Total, Cor Verdadeira, Cromo Total e Fenóis Totais
UR016	Cádmio Total, Chumbo Total, Cobre Dissolvido, Fenóis Totais, Níquel Total, Ensaio ecotoxicológico
UR017	Cádmio Total, Chumbo Total, Cianeto Livre, Cobre Dissolvido, Cor Verdadeira, Cromo Total, Fenóis Totais, Manganês Total, Níquel Total, Sulfetos, Surfactantes Aniônicos, Zinco Total, Ensaio ecotoxicológico
VG001	Cádmio total, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Substâncias tensoativas, Zinco total
VG003	Boro dissolvido, Cádmio total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Substâncias tensoativas, Sulfetos, Ensaio ecotoxicológico, Zinco total
VG004	Cádmio total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Nitrito, Substâncias tensoativas
VG005	Cádmio total, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Manganês total, Substâncias tensoativas
VG007	Cádmio total, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Substâncias tensoativas, Ensaio ecotoxicológico
VG009	Cádmio total, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Ensaio ecotoxicológico
VG011	Cádmio total, Densidade de cianobactérias, Fenóis totais, Ensaio ecotoxicológico



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO GRANDE	
UPGRH GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7 e GD8	
BG001	Cádmio total, Chumbo total, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Ensaio ecotoxicológico
BG003	Cádmio total, DQO, Ensaio ecotoxicológico, Ferro dissolvido, Fenóis totais,
BG005	Cádmio total, Chumbo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais
BG007	Cádmio total, Chumbo total, DQO, Fenóis totais, Níquel total, Ensaio ecotoxicológico
BG010	DQO, Ferro dissolvido, Manganês total
BG012	DQO, Ferro dissolvido, Manganês total
BG013	DQO, Ferro dissolvido, Manganês total
BG014	DQO, Ferro dissolvido, Manganês total
BG015	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Níquel total
BG017	Chumbo total, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total
BG019	Cádmio total, DQO, Fenóis totais, Mercúrio total, Manganês total, Ensaio ecotoxicológico
BG021	Cádmio total, Chumbo total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Ensaio ecotoxicológico
BG023	Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Zinco total
BG025	Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Fenóis totais
BG027	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BG028	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Ensaio ecotoxicológico, Zinco total
BG029	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Ensaio ecotoxicológico, Zinco total
BG030	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Zinco total
BG031	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Ensaio ecotoxicológico
BG032	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BG033	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Fenóis totais, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total, Ferro dissolvido, Manganês total

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO GRANDE	
UPGRH GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7 e GD8	
BG034	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BG035	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Ensaio ecotoxicológico, Zinco total
BG036	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Ensaio ecotoxicológico, Zinco total
BG037	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BG039	Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Zinco total
BG041	Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total
BG043	Cádmio total, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Zinco total
BG044	Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Mercúrio total, Ensaio ecotoxicológico
BG045	Cádmio total, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total
BG047	Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Ensaio ecotoxicológico
BG049	Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Ensaio ecotoxicológico
BG051	Cobre dissolvido, Fenóis totais
BG053	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Zinco total
BG055	Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Ensaio ecotoxicológico, Zinco total
BG057	Cádmio total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Densidade de cianobactérias, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BG058	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Densidade de cianobactérias, DQO
BG059	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Densidade de cianobactérias, Ensaio ecotoxicológico
BG061	Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Fenóis totais
BG063	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, DQO, Ensaio ecotoxicológico



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO GRANDE	
UPGRH GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7 e GD8	
BG065	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG067	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG069	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG071	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG073	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG075	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG077	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG079	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG081	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG083	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG085	Cianeto livre, Densidade de cianobactérias, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico
BG087	Cianeto livre, Índice de fenóis, Cádmio total, Cromo total, Mercúrio total e Ensaio ecotoxicológico Densidade de cianobactérias
BACIA DO RIO PARANAÍBA	
UPGRH PN1, PN2, PN3	
PB001	Cádmio total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Fenóis totais, Manganês total
PB003	Cádmio total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Ensaio ecotoxicológico
PB005	Cádmio total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Fenóis totais, Manganês total
PB007	Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, DQO, Fenóis totais, Manganês total, Ensaio ecotoxicológico
PB009	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, DQO, Fenóis totais, Manganês total, Ensaio ecotoxicológico
PB011	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Ensaio ecotoxicológico
PB013	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Ensaio ecotoxicológico
PB015	Cádmio total, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Ensaio ecotoxicológico

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO PARANAÍBA	
UPGRH PN1, PN2, PN3	
PB017	Cádmio total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Fenóis totais, Manganês total, Toxicidade crônica
PB019	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Fenóis totais, Manganês total, Ensaio ecotoxicológico
PB021	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Fenóis totais, Manganês total
PB022	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais
PB023	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Densidade de cianobactérias, DQO, Ensaio ecotoxicológico, Ferro dissolvido, Fenóis totais
PB025	Cádmio total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Fenóis totais, Ensaio ecotoxicológico
PB027	Cádmio total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Zinco total, Ensaio ecotoxicológico
PB029	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Ensaio ecotoxicológico, Zinco total
PB031	Cádmio total, Cobre dissolvido, Fenóis totais
PB033	Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Níquel total, Ensaio ecotoxicológico
BACIA DO RIO DOCE	
UPGRHs DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6	
RD001	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
RD004	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Fenóis totais
RD007	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
RD009	Arsênio total, Cobre dissolvido, Fenóis totais, mercúrio total
RD013	Alumínio dissolvido, Cobre dissolvido
RD018	Cobre dissolvido, Fenóis totais, Ferro dissolvido, Manganês total
RD019	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
RD021	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Fenóis totais
RD023	Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Sulfetos
RD025	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Substâncias tensoativas, Zinco total
RD026	Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Manganês total, Sulfetos, Substâncias tensoativas
RD027	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

BACIA DO RIO DOCE	
UPGRHs DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6	
RD029	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
RD030	Cobre dissolvido, Níquel total
RD031	Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
RD032	Cobre dissolvido, Manganês total
RD033	Cobre dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
RD034	Cobre dissolvido
RD035	Cobre dissolvido
RD039	Cobre dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
RD040	Cobre dissolvido
RD044	Cobre dissolvido
RD045	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Manganês total, Sulfetos
RD049	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Sulfetos
RD053	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Manganês total, Sulfetos
RD056	Cobre dissolvido, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Sulfetos
RD057	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Sulfetos
RD058	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Sulfetos
RD059	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Sulfetos
RD064	Cobre dissolvido, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Sulfetos, Ensaio ecotoxicológico
RD065	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Sulfetos
RD067	Cobre dissolvido, Ferro dissolvido, Sulfetos
BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	
UPGRHs PS1 e PS2	
BS002	Cobre dissolvido, Cor verdadeira, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BS006	Alumínio dissolvido, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Selênio total, Substâncias tensoativas, Zinco total
BS017	Alumínio dissolvido, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BS018	Alumínio dissolvido, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BS024	Alumínio dissolvido, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	
UPGRHs PS1 e PS2	
BS028	Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais
BS029	Alumínio dissolvido, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BS031	DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Óleos e Graxas, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BS032	Alumínio dissolvido, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BS033	Cor verdadeira, Cromo total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Zinco total
BS042	DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Sulfetos
BS043	Chumbo total, DQO, Ferro dissolvido, Sulfetos
BS046	Cianeto livre, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Substâncias tensoativas
BS049	Alumínio dissolvido, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Substâncias tensoativas
BS050	Alumínio dissolvido, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Substâncias tensoativas
BS054	Alumínio dissolvido, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Substâncias tensoativas
BS056	Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Substâncias tensoativas
BS057	Ferro dissolvido, DQO, Fenóis totais, Substâncias tensoativas
BS058	Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Substâncias tensoativas
BS059	DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Substâncias tensoativas
BS060	Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BS061	Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais
BS071	DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Zinco total
BS073	Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Selênio total
BS075	Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Sulfetos, Substâncias tensoativas
BS077	Alumínio dissolvido, Cádmio total, Chumbo total, DQO, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Sulfetos
BS081	Cádmio total, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Substâncias tensoativas
BS083	Alumínio dissolvido, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto livre, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Sulfetos, Substâncias tensoativas, Zinco total
BS085	Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 5.3: Relação dos parâmetros específicos analisados nas campanhas intermediárias por estação de amostragem (continuação)

Estação	Parâmetros específicos
BACIA DO RIO JEQUITINHONHA	
UPGRHs JQ1, JQ2 e JQ3	
JE001	Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total
JE003	Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
JE005	Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Manganês total, Zinco total
JE007	Cádmio total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Zinco total
JE009	Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Níquel total
JE011	Cádmio total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total
JE013	Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total
JE015	Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Níquel total
JE017	Cádmio total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total, Níquel total
JE019	Cádmio total, Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total
JE021	Cobre dissolvido, Cor verdadeira, DQO, Fenóis totais, Manganês total, Níquel total, Zinco total
JE023	Cor verdadeira, Ferro dissolvido, DQO, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total
JE025	Cádmio total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total
BACIA DO RIO MUCURI	
UPGRHs MU1	
MU001	Cor verdadeira, Ferro dissolvido, DQO, Fenóis totais, Manganês total
MU003	Cádmio total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total
MU005	Cianeto livre, Cor verdadeira, DQO, Fenóis totais, Manganês total
MU006	Cor verdadeira, Ferro dissolvido, DQO, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total
MU007	Cor verdadeira, DQO, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total, Mercúrio total
MU009	Chumbo total, Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Manganês total
MU011	Cor verdadeira, DQO, Fenóis totais, Manganês total, Sólidos dissolvidos totais
MU013	Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido, Fenóis totais, Manganês total
BACIA DO RIO PARDO	
UPGRHs PA1	
PD001	Chumbo total, Cobre dissolvido, DQO, Ferro dissolvido
PD003	Cor verdadeira, DQO, Ferro dissolvido
PD005	DQO, Densidade de cianobactérias, Ferro dissolvido, Fenóis totais

5.2.2. Análises

Na Tabela 5.4 são apresentadas as metodologias das variáveis avaliadas no monitoramento do Projeto "Águas de Minas".

Tabela 5.4: Relação dos métodos de ensaios utilizados no Projeto "Águas de Minas"

Ensaio	Tipo de ensaio	Referência Normativa
Alcalinidade bicarbonato	potenciometria	APHA 2320 B
Alcalinidade total	potenciometria	APHA 2320 B
Alumínio dissolvido	espectrometria de AA* - plasma	APHA 3120 B
Arsênio total	espectrometria de AA - gerador de hidretos	APHA 3114 B
Bário total	espectrometria de AA - plasma	APHA 3120 B
Boro total	espectrometria de AA - plasma	APHA 3120 B
Cádmio total	espectrometria de AA - forno de grafite	APHA 3113 B
Cálcio total	titulometria	APHA 3500-Ca B
Chumbo total	espectrometria de AA - forno de grafite	APHA 3113 B
Cianeto livre	titulometria	APHA 4500-CN ⁻ D
Cloreto total	colorimetria	USGS- I -1187 78
Cobre dissolvido	espectrometria de AA - plasma	APHA 3120 B
Clorofila-a	colorimetria	APHA 10200H
Coliformes termotolerantes	tubos múltiplos	APHA 9221 E
Coliformes totais	tubos múltiplos	APHA 9221 B
Condutividade elétrica	condutimetria	SM 2510 B
Cor verdadeira	colorimetria	APHA 2120 B
Cromo total	espectrometria de AA - plasma	APHA 3120 B
DBO	Winkler/incubação	ABNT NBR 12614/1992
DQO	titulometria	ABNT NBR 10357/1988
Dureza de cálcio	titulometria	APHA 3500-Ca D
Dureza de magnésio	titulometria	APHA 3500-Mg E
Estreptococos	tubos múltiplos	APHA 9230 B
Ferro dissolvido	espectrometria de AA - plasma	APHA 3120 B
Fósforo total	colorimetria	APHA 4500-P E
Fenóis totais	colorimetria	ABNT NBR 10740/1989
Manganês total	espectrometria de AA - plasma	APHA 3120 B
Mercúrio total	espectrometria de AA - vapor frio	APHA 3112 B
Níquel total	espectrometria de AA - forno de grafite	APHA 3113 B
Nitrogênio amoniacal	colorimetria	ABNT NBR 10560/1988
Nitrato	colorimetria	APHA 4500-NO ₃ ⁻ E
Nitrito	colorimetria	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Nitrogênio orgânico	colorimetria	APHA 4500-N _{org} B

Tabela 5.4: Relação dos métodos de ensaios utilizados no Projeto "Águas de Minas" (continuação)

Ensaio	Tipo de ensaio	Referência Normativa
Óleos e graxas	gravimetria	APHA 5520 B
Oxigênio dissolvido	titulometria	ABNT NBR 10559/1988
pH	potenciometria	APHA 4500 H ⁺ B
Potássio solúvel	espectrometria de AA - plasma	APHA 3120 B
Selênio total	espectrometria de AA - gerador de hidretos	APHA 3114 B
Sódio solúvel	espectrometria de AA - plasma	APHA 3120 B
Sólidos dissolvidos totais	gravimetria	ABNT NBR 10664/1989
Sólidos suspensos totais	gravimetria	ABNT NBR 10664/1989
Sólidos totais	gravimetria	ABNT NBR 10664/1989
Substâncias tensoativas	colorimetria	ABNT NBR 10738/1989
Sulfatos	turbidimetria	APHA 4500-SO ₄ ²⁻ E
Sulfetos	titulometria	APHA 4500-S ²⁻ F
Temperatura da água/ar	termometria	APHA 2550 B
Ensaio ecotoxicológico	ensaio com <i>Ceriodaphnia dubia</i>	ABNT NBR 13373
Turbidez	turbidimetria	APHA 2130 B
Zinco total	espectrometria de AA - plasma	APHA 3120 B

*AA=absorção atômica

5.3. Avaliação Temporal

Um importante aspecto na avaliação da qualidade da água em um corpo hídrico é acompanhar a sua tendência de evolução no tempo, possibilitando, dessa forma, a identificação de medidas preventivas bem como a eficiência de algumas medidas adotadas.

O acompanhamento da evolução temporal da qualidade das águas pode ser traduzido dentro de rigorosas hipóteses estatísticas. Entretanto, o período de monitoramento relativamente curto das águas do Estado dificulta, no momento, a aplicação de modelos auto-regressivos que utilizam testes de hipótese para indicar uma tendência na evolução do índice de qualidade das águas utilizado.

A análise por ora empreendida resume-se a uma avaliação visual de gráficos que tratam da evolução do IQA desde 1997 até 2007, tentando descrever a evolução da qualidade das águas nos diferentes corpos de água do estado de Minas Gerais sem, contudo, saber se o aumento ou diminuição do Índice de Qualidade das Águas em uma determinada bacia é estatisticamente significativa ou se tal diferença não é devida simplesmente a variações amostrais.

Alguns parâmetros foram observados ao longo dos anos e comparados com os limites das classes de enquadramento (Anexo C) do corpo de água em análise, conforme a Resolução CONAMA Nº357/05. Outros foram ajustados através do cálculo da Média Móvel dos meses anteriores, o que possibilitou a minimização dos efeitos das variações de curto período, dando prioridade ao comportamento mais geral da série observada.

5.4. Avaliação Espacial

Considerando que a qualidade das águas varia em função de uma enormidade de fatores, tais como uso e ocupação do solo da bacia de drenagem e existência de indústrias com lançamento de efluentes diversificados, verifica-se a importância da análise do perfil espacial para se identificar os trechos mais críticos.

Para representar o perfil espacial dos parâmetros selecionados ao longo do corpo de água, foram utilizadas algumas representações gráficas. Para certos parâmetros, ressaltou-se o comportamento ao longo do corpo de água monitorado, em relação à campanha de amostragem em que os mesmos ocorreram em condições mais críticas. Outros foram avaliados de acordo com a sua média anual ao longo do corpo hídrico em questão, comparando-se mais de um ano de ocorrência. O Índice de Qualidade das Águas anual das estações de amostragem para os anos 2006 e 2007 foi representado ao longo do corpo de água e ao longo da bacia hidrográfica.

Entretanto, a análise efetuada até o momento refere-se a uma avaliação qualitativa do comportamento espacial desses parâmetros, sendo representada com gráficos de barras e descritas as alterações observadas ao longo do rio ou bacia hidrográfica.

5.5. Avaliação Ambiental – Pressão x Estado x Resposta

Considerando a série de resultados, no período de 1997 a 2007, para as estações de amostragem de cada bacia hidrográfica avaliaram-se os parâmetros monitorados com relação ao percentual de amostras cujos valores violaram em mais de 20% os limites legais da Resolução CONAMA 357/2005, para os dados gerados a partir de 2005 e da DN COPAM 10/86, para aqueles obtidos no período compreendido entre 1997 e 2004, considerando o enquadramento do corpo de água no local de cada estação. Os percentuais de violações em ordem decrescente do valor obtido para cada parâmetro foram apresentados em uma tabela, indicando os constituintes mais críticos na bacia.

Os resultados do monitoramento da qualidade das águas superficiais dos rios do Estado de Minas Gerais foram apresentados em quadros-resumo, que especificam, por corpo de água e estação de amostragem, os principais fatores de PRESSÃO sobre a qualidade das águas associados aos indicadores de degradação verificados em 2007 e os parâmetros que apresentaram as maiores violações em relação aos limites legais no período de 1997 a 2007, caracterizando o ESTADO da qualidade das águas.

Os fatores de PRESSÃO foram definidos considerando as seguintes atividades: lançamento de esgoto sanitário, lançamento de efluente industrial, carga difusa, agricultura, agropecuária, suinocultura, atividade minerária, garimpo, resíduo sólido urbano, queimada, expansão urbana, erosão, assoreamento, dentre outros.

Esse processo norteou a definição das ações prioritárias para o controle da poluição ambiental recomendadas neste relatório (RESPOSTA). As recomendações apresentadas foram sintetizadas a partir da metodologia estabelecida pelo sistema Pressão – Estado – Resposta, desenvolvido pelo Departamento de Meio Ambiente da Organização de Coordenação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. Esse sistema baseia-se nos seguintes princípios de causalidade:

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

- as atividades humanas exercem PRESSÕES sobre o meio ambiente, alterando o ESTADO dos recursos naturais em qualidade e disponibilidade;
- a sociedade apresenta RESPOSTAS a essas mudanças através de políticas setoriais, econômicas e ambientais.

A variável RESPOSTA foi apresentada em item a parte, onde foram estabelecidas ações de controle prioritárias inerentes às violações identificadas nos pontos de coleta e na bacia como um todo, ressaltando o lançamento de esgoto sanitário, a ocorrência de metais pesados e o efeito tóxico crônico nas águas.

Para tratar o fator de PRESSÃO por esgoto sanitário, em todas as bacias foram levantados os municípios com população urbana superior a 30.000 habitantes, conforme censo do IBGE 2000, e que possuem estação de amostragem em trecho de corpo de água a montante e/ou a jusante da área urbana destes municípios. Em cada estação de amostragem, avaliou-se a evolução do IQA – Índice de Qualidade das Águas ao longo dos anos. O IQA é um bom indicador da contaminação por esgoto sanitário, pois é uma síntese da ocorrência de sólidos, nutrientes e principalmente matéria orgânica e fecal. Além disso, verificaram-se as ocorrências de desconformidades em relação aos principais parâmetros associados aos esgotos sanitários: oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio (matéria orgânica); amônia não ionizável e nitrogênio amoniacal (nutrientes).

No Estado de Minas Gerais foram verificadas no período de 1997 a 2007 algumas ocorrências de metais tóxicos, quais sejam: Cobre total (entre 1997 e 2004), Cobre dissolvido (a partir de 2005), Mercúrio total, Arsênio total, Cádmiio total, Zinco total, Bário total, Cromo IV (de 1997 a 2004), Cromo total (a partir de 2005) e Chumbo total, bem como outras substâncias tóxicas como fenóis totais, amônia e íons cianeto livres em desconformidade com os padrões legais. Foram destacadas as estações em que as ocorrências destes metais resultaram em Contaminação por Tóxicos Alta em 2007, levantando-se as causas da contaminação, e feitas recomendações visando a melhoria da qualidade dos corpos de água onde se verificaram estas ocorrências.

É objetivo do projeto Águas de Minas a ampliação da divulgação das ações de controle recomendadas às diversas instituições que trabalham no âmbito do gerenciamento ambiental e de recursos hídricos, fortalecendo o sistema de tomada de decisões para a melhoria da qualidade das águas e, conseqüentemente, da qualidade ambiental em todo Estado de Minas Gerais.

6. ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA

6.1 O que é Enquadramento dos Corpos de Água

Instrumento das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433/97 e Lei nº 13.199/99, respectivamente, o enquadramento dos corpos de água em classes visa estabelecer metas de qualidade para os corpos hídricos, a fim de assegurar os usos preponderantes, ou seja, o conjunto de usos, atuais e futuros da água, com relevâncias econômicas, sociais e ambientais de um determinado trecho do corpo hídrico.

O enquadramento dos corpos de água é um dos mais importantes instrumentos de gestão dos recursos hídricos por compatibilizar os usos múltiplos com o desenvolvimento econômico. É, portanto, um mecanismo de planejamento ambiental de bacias hidrográficas que visa o uso sustentável da água. Além disso, fornece subsídios a outros instrumentos da gestão de Recursos Hídricos, tais como à outorga e à cobrança pelo uso da água, de modo que, quando implementados, tornam-se complementares, propiciando às entidades gestoras de recursos hídricos, mecanismos para assegurar a disponibilidade quantitativa e qualitativa das águas.

6.2 Modalidades de enquadramento dos corpos de água

Segundo a Resolução CNRH nº12/2000, que dá diretrizes básicas para os procedimentos metodológicos de enquadramento dos corpos hídricos, há duas alternativas de enquadramento, sendo elas:

- Proposta de Referência - visa a atender aos usos atuais dos recursos hídricos na bacia hidrográfica.
- Proposta Prospectiva - visa a atender, de forma satisfatória, a uma determinada alternativa de usos futuros para os corpos hídricos da bacia hidrográfica.

Essas propostas devem ser elaboradas com base nas informações obtidas no diagnóstico e prognóstico do uso e ocupação do solo e considerando os usos atuais e futuros dos recursos hídricos e analisados os benefícios sócio-econômicos e ambientais, bem como os custos e prazos decorrentes, que serão utilizados para a definição do enquadramento a ser proposto.

6.3 Enquadramento dos corpos de água em Minas Gerais

A primeira experiência de classificação dos corpos de água que abrangeu um rio do estado de Minas Gerais foi o enquadramento da bacia do rio São Francisco estabelecido pela Portaria do IBAMA nº 715/89-P, de 20 de setembro de 1989. Segundo essa portaria, apenas os rios federais afluentes do rio São Francisco foram enquadrados, enquanto que para os rios das Velhas e Paraopeba, de domínio estadual, foram sugeridas proposta de enquadramento.

Pode se dizer que as experiências de enquadramento realizadas no Estado ocorreram efetivamente a partir de 1993, quando a Fundação Estadual de Minas Gerais – FEAM passou a ser responsável pelo enquadramento dos corpos de água em Minas Gerais.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Nesse período, priorizou-se o enquadramento das seguintes bacias: Piracicaba, Velhas, Paraopeba, Verde, Paraibuna e Pará. Com a formalização da Política Estadual de Recursos Hídricos, concretizada na Lei nº 13.199/1999, o enquadramento dos corpos de água foi instituído instrumento da gestão de recursos hídricos, passando a sua elaboração a ser de competência do IGAM. Desde então, o IGAM propôs o reenquadramento dos corpos de água da bacia hidrográfica do rio das Velhas (2004) e da bacia hidrográfica do rio Paracatu (2005), ambas aprovadas pelos respectivos comitês, sendo o próximo passo o encaminhamento do ato normativo ao CERH-MG.






6.4 Procedimentos metodológicos do enquadramento

Segundo a Resolução CNRH nº12/2000, os procedimentos metodológicos de enquadramento devem compreender as seguintes etapas: diagnóstico e prognóstico do uso e ocupação do solo, elaboração da proposta e aprovação da proposta de enquadramento e respectivos atos jurídicos.

Conforme versa a Lei 13.199/99, a Política de Recursos Hídricos tem como premissa a gestão participativa e descentralizada, considerando, portanto, as expectativas e necessidades dos usuários. Neste sentido, o processo de enquadramento dos corpos de água, assim como a sua implantação, devem ser efetuados no âmbito da bacia hidrográfica, sendo, o respectivo comitê de bacia hidrográfica - CBH - o responsável pela sua aprovação.

O enquadramento dos corpos de água em Classes, de acordo com o uso preponderante, e em conformidade com a Resolução CONAMA nº 357/2005, classifica as águas doces em cinco classes como apresentados na Tabela 6.1.

Tabela 6.1: Classificação dos corpos de água segundo os usos preponderantes.

Classe	Cor	Usos Possíveis
Especial		Abastecimento para consumo humano com desinfecção; Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; Preservação dos ambientes aquáticas em unidades de conservação de proteção integral.
1		Abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado; À proteção das comunidades aquáticas; À recreação de contato primário (nadar); À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo; À proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas.
2		Abastecimento para consumo humano após tratamento convencional; À proteção das comunidades aquáticas; À recreação de contato primário; À irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; À aquicultura e à atividade de pesca.
3		Abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado; À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; À pesca amadora; À recreação de contato secundário; À dessedentação de animais.
4		À navegação; À harmonia paisagística.

Ressalta-se que, de acordo com a resolução CONAMA nº 357/2005, art. 42, enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas Classe 2, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente.

7. OUTORGA

7.1. O Que é Outorga de Direito de Uso

As preocupações com o planejamento e a gestão dos recursos hídricos, levaram os países desenvolvidos a implantarem políticas para conservação e exploração desses recursos de uma maneira sustentável.

No Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988, as águas se tornaram de domínio público, sendo, portanto, necessária uma regulamentação para que as pessoas pudessem fazer uso dos recursos hídricos. A Lei Federal nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Através da nova lei, foram estabelecidos diversos organismos, inteiramente novos na administração dos bens públicos brasileiros que são os Conselhos, os Comitês e as Agências de Bacia e estabelecidos instrumentos econômicos que são as “ferramentas” a serem utilizadas na gestão dos recursos hídricos.

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é, talvez, o instrumento de gestão mais importante na atual fase, pois é o meio através do qual se faz a repartição dos recursos hídricos disponíveis entre os diversos usuários que, eventualmente, disputam recursos escassos para as suas necessidades.

A outorga de direito de uso da água (bem de domínio público) é um beneplácito, um consentimento aos vários interesses públicos, individuais e coletivos, cujo estabelecimento cabe àqueles que detêm o respectivo domínio (União ou Estados), para utilização de específica quantidade de água, em determinada localização, para específica finalidade.

A outorga garante ao usuário o direito de uso da água, condicionado à disponibilidade hídrica. Cabe ao poder outorgante (Governo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal) examinar cada pedido de outorga e verificar a existência de suficiente água, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos, para que o pedido possa ser atendido. Uma vez concedida, a outorga de direito de uso da água protege o usuário contra o uso predador de outros usuários que não possuam outorga.

7.2. Modalidades de Outorga

- **AUTORIZAÇÃO** – Obras, serviços ou atividades desenvolvidas por pessoa física ou jurídica de direito privado e quando não se destinarem à finalidade de utilidade pública (prazo máximo de 5 anos).
- **CONCESSÃO** - Obras, serviços ou atividades desenvolvidas por pessoa física ou jurídica de direito público e quando se destinarem à finalidade de utilidade pública (prazo máximo de 20 anos).

7.3. A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos em Minas Gerais

No Estado de Minas Gerais, as primeiras outorgas de direito de uso da água foram concedidas através de Decretos, por ato do Governador do Estado, após análise e aprovação do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais – DAE/MG, apoiadas nos termos do Código de Águas – Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934.

Desde julho de 1997, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, passou a atuar como órgão gestor das águas no Estado de Minas Gerais, compondo a estrutura da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Com a divulgação do instrumento da outorga junto ao grande público, além das companhias de saneamento e abastecimento, diversos usuários têm solicitado ao IGAM autorização para captação de água superficial e exploração de água subterrânea para as mais diversas finalidades, sendo a agricultura irrigada o setor de maior demanda de recursos hídricos. Também, diversas intervenções nos corpos de água como construção de reservatórios, diques, açudes, desvios, entre outras obras, são objetos de solicitação de outorga, conforme preconiza a Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e a Portaria Administrativa do IGAM nº 010/98, que ordena os procedimentos aplicáveis aos processos de outorga de águas sob domínio estadual.

De acordo com a Portaria 010/98, até que se estabeleçam as diversas vazões de referência a serem utilizadas nas bacias hidrográficas, a vazão de referência adotada em todo o Estado de Minas Gerais é a $Q_{7,10}$ (vazão mínima de sete dias de duração e dez anos de recorrência). Através desta mesma Portaria, é fixado o percentual de 30% da $Q_{7,10}$ como o limite máximo de derivações consultivas a serem outorgadas em cada seção da bacia hidrográfica considerada, ficando garantidos assim, fluxos residuais mínimos a jusante equivalentes a 70% da $Q_{7,10}$.

No IGAM, a Gerência de Apoio à Regularização Ambiental– GEARA é responsável pelos processos de requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos e mantém um banco de dados com as informações obtidas dos requerentes e usuários outorgados. As coordenadas geográficas das captações ou intervenções nos corpos de água são georreferenciadas. A análise dos processos é então realizada, sendo que, para o deferimento ou indeferimento de um requerimento, diversas etapas são processadas com consulta em cartas geográficas e delimitação das áreas de drenagem.

7.4. A Quem Solicitar

As outorgas em águas de domínio do Estado são obtidas junto ao IGAM (Lei 13.199/99). Já as outorgas em águas de domínio da União são emitidas pela ANA (Lei 9.984/2000).

7.5. Como Solicitar a Outorga

A outorga de direito de uso da água deve ser solicitada por meio de formulários próprios do IGAM, que contêm todas as informações necessárias para a avaliação técnica do empreendimento e da disponibilidade hídrica.

7.6. Quando se Deve Solicitar a Outorga

Antes da implantação de qualquer empreendimento cujo uso da água venha a alterar o regime, a quantidade ou a qualidade do corpo de água, incluindo captações e derivações ou lançamentos de efluentes.

7.7. Os Usos de Recursos Hídricos Sujeitos a Outorga

- Captação em corpo de água (rios, lagoas naturais etc);
- Captação em barramento em curso de água;
- Barramento em curso de água, sem captação;
- Perfuração de poço tubular;
- Captação de água subterrânea por meio de poço tubular já existente ou poço manual (cisterna);
- Captação de água subterrânea para fins de rebaixamento de nível de água em mineração;
- Captação de água em surgência (nascente);
- Desvio parcial ou total de curso de água;
- Dragagem, limpeza ou desassoreamento de curso de água;
- Canalização e/ou retificação de curso de água;
- Travessia rodo-ferroviária (pontes e bueiros);
- Estrutura de transposição de nível (eclusa);
- Lançamento de efluente em corpo de água;
- Aproveitamento de potencial hidrelétrico;
- Outros usos que alterem a qualidade, a quantidade ou o regime de um corpo de água.

7.8. Usos que Independem de Outorga

O parágrafo primeiro do artigo 18 da lei 13.199/99 estabelece que os usos considerados insignificantes não são sujeitos a outorga e sim a cadastro junto ao IGAM. A Deliberação Normativa CERH-MG N° 09/2004 define assim os usos considerados insignificantes:

- Água Subterrânea: Poço manual e nascentes
Consumo de até 10m³/dia;
- Água Superficial:
Captações: 1L/s ou 0,5L/s;
Acumulações: 5.000m³ ou 3.000m³.

7.9. Procedimento para a Solicitação de Outorga

Preenchimento do Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento FCEI disponível no site do IGAM, indicando no campo "Uso do Recurso Hídrico" o código das intervenções em corpos de água existentes e/ou projetados.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

7.10. Documentação Necessária para a Obtenção da Outorga

- Requerimento assinado pelo requerente ou procurador, juntamente com a procuração;
- Formulários fornecidos pelo IGAM;
- Relatório técnico conforme modelo fornecido pelo IGAM;
- Comprovante de recolhimento dos valores relativos aos custos de análise e publicações;
- Cópias do CPF/CNPJ e da carteira de identidade do requerente ou procurador;
- Cópia do registro do imóvel ou de posse do local onde será efetuada a captação;
- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável técnico pela elaboração do processo de outorga, recolhida na jurisdição do CREA-MG;
- Documento de concessão ou autorização fornecido pela ANEEL, em caso de hidrelétrica ou de termelétrica;
- Anotação Documento emitido pelo Comitê de Bacias contendo as prioridades de uso, caso existente.

8. SITUAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Foram obtidos, a partir das análises laboratoriais realizadas em 2007, os indicadores da situação ambiental no Estado de Minas Gerais, Índice de Qualidade das Águas – IQA, Contaminação por Tóxicos – CT e Teste de Toxicidade Crônica.

Na Figura 8.1 é apresentada a evolução temporal da freqüência de ocorrência do IQA no Estado de Minas Gerais em 2007. Ressalta-se que no ano de 2007, a média anual do IQA não foi calculada para algumas estações de amostragem monitoradas, nas quais houve perda de informações referentes ao parâmetro coliformes termotolerantes em uma ou mais campanhas de monitoramento. Na estação localizada no rio Carinhanha a montante da sua foz no rio São Francisco (SF034), pertencente à bacia do rio São Francisco, na estação da bacia do rio Paranaíba situada no rio Paranaíba a montante do Reservatório de Emborcação (PB005), e na estação do rio Jequitinhonha monitorada próximo à localidade de Caçaratiba (JE005), o cálculo da média anual do IQA também não foi realizado, uma vez que não houve amostragem em uma ou mais campanhas do ano em questão, devido à dificuldade de acesso ao local de coleta. Por tais razões, para comparar os resultados de IQA de 2007 com aqueles obtidos nos anos anteriores foi utilizada a condição de qualidade verificada em cada estação de amostragem por trimestre (Figura 8.1).

Pôde-se observar que nas 260 estações de amostragem dos corpos de água das bacias hidrográficas monitoradas no Estado de Minas Gerais, predomina o Índice de Qualidade das Águas Médio, resultado este que vem sendo observado desde o ano de 1997, ressaltando-se que os maiores registros foram nos anos de 1997 e 1998. A análise comparativa da distribuição dos valores trimestrais de IQA demonstra que não houve uma grande variação das condições de qualidade das águas ao longo de onze anos de monitoramento.

No ano de 2007, houve uma redução na ocorrência do Índice de Qualidade das Águas Bom, diminuindo de 36,2% em 2006 para 23,1% em 2007. Com isso, pode-se perceber ainda a ruptura de um aumento gradativo da sua ocorrência entre os anos de 2002 até 2006. Esse ainda é o menor nível de ocorrência de IQA Bom em toda a série histórica para o Estado de Minas Gerais. Ressalta-se a ocorrência de IQA não calculado com 15,3% de freqüência, o que provavelmente influenciou na tendência observada.

O IQA Médio ainda é predominante em todas as bacias hidrográficas monitoradas no Estado de Minas Gerais com ocorrência em 42,4% dos pontos de amostragem em 2007, ante 40,4% em 2006. Entretanto, pode-se verificar que, mesmo com esse pequeno aumento, há uma tendência de diminuição gradativa da sua ocorrência a partir do ano de 2002. Ressalta-se ainda a diminuição da ocorrência do IQA Ruim a partir de 2004, registrando uma freqüência de 17,1% em 2007.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 8.1: Evolução temporal do Índice de Qualidade das Águas - IQA, no Estado de Minas Gerais.

Com relação à Contaminação por Tóxicos (CT), observou-se um grande aumento na ocorrência de CT Baixa, de 57,9% em 2006 para 74,2% em 2007, atingindo assim, o seu maior percentual em toda a série histórica. Pelo outro lado, houve diminuição na ocorrência da CT Alta, de 18,9% em 2006 para 11,8% em 2007, alcançando também ao menor valor de toda série histórica. Destaca-se ainda a redução da CT Média, de 23,2% em 2006 para 14,1% em 2007, diminuindo gradativamente sua ocorrência a partir do ano de 2004 (Figura 8.2).




Figura 8.2: Evolução temporal da Contaminação por Tóxicos – CT, no Estado de Minas Gerais.

8.1. IQA – Índice de Qualidade das Águas nas Bacias Hidrográficas

A seguir são apresentadas as freqüências de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas calculadas para cada trimestre do ano de 2007, para cada bacia hidrográfica monitorada no Estado de Minas Gerais.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

Rio São Francisco e afluentes

Na Figura 8.3 é apresentada a freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas - IQA calculada por trimestre no rio São Francisco e seus afluentes em 2007. Observou-se o predomínio do IQA Médio no 1º e 4º trimestres (68,2% e 57,4%, respectivamente), ambos correspondentes ao período de chuvas. Nas amostragens realizadas durante o período de seca, nota-se o aumento da ocorrência de IQA Bom, uma vez que valores correspondentes a essa faixa foram registrados em 50% das estações no 2º trimestre e 73,1% no 3º trimestre.




Figura 8.3: Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA nas UPGRHs SF1, SF4, SF6, SF7, SF8, SF9 e SF10, no ano de 2007.

Sub-Bacia do Rio Pará

Na sub-bacia do rio Pará o predomínio de IQA Médio foi constatado no 1º, 2º e 4º trimestres de 2007, ocorrendo, respectivamente em 81,3%, 56,3% e 80% das estações. As maiores ocorrências de IQA Bom foram registradas no período de seca em 31,3% das estações no 2º trimestre e 50% no 3º trimestre (Figura 8.4).




Figura 8.4: Frequência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Pará – UPRH SF2, no ano de 2007.

Sub-Bacia do Rio Paraopeba

Observou-se na sub-bacia do rio Paraopeba a prevalência de IQA Médio na maioria das estações no 1º e 2º trimestres de 2007, com 54,5% e 68,2% de ocorrência, respectivamente. No 3º trimestre, caracterizado pelo período seco, 54,5% das estações apresentaram IQA Bom. Ressalta-se que no 4º trimestre 40% das estações não tiveram o IQA calculado devido à perda de informações do parâmetro coliformes termotolerantes. Nessa campanha, 30% das estações apresentaram IQA Médio e 20%, IQA Ruim. O IQA Muito Ruim apresentou ocorrências em todas as campanhas, com destaque para o 3º trimestre, com 9,1% de frequência (Figura 8.5).




Figura 8.5: Frequência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Paraopeba – UPGRH SF3, no ano de 2007.

Sub-Bacia do Rio das Velhas

Foi verificado na sub-bacia do rio das Velhas o predomínio da ocorrência de IQA Ruim (66,7%), de IQA Médio (45,5%) e de IQA Bom, (42,4%), no 1º, 2º e 3º trimestres, respectivamente. No 4º trimestre, quando o IQA não pôde ser calculado para 36,4% das estações de amostragem devido à perda de informações do parâmetro coliformes termotolerantes, 21,2% das estações apresentaram IQA Médio, tendo sido observado o mesmo percentual para a ocorrência de IQA Ruim, conforme Figura 8.6.




Figura 8.6: Frequência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio das Velhas – UPGRH SF5, no ano de 2007.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE

A Figura 8.7 apresenta o Índice de Qualidade das Águas – IQA observado nos quatro trimestres de 2007, no rio Grande e seus afluentes. Observou-se o predomínio do IQA Médio no 1º, 3º e 4º trimestres, com frequência de 83,3%, 47,6% e 48,1%, respectivamente. Nas amostragens realizadas durante o período de seca, nota-se o aumento da ocorrência de IQA Bom, uma vez que valores correspondentes a essa faixa foram registrados em 16,7% das estações no 2º trimestre e 42,9% no 3º trimestre. No 2º trimestre de 2007 não foi possível calcular o IQA em 50% das estações de amostragem, em razão da perda de informações de coliformes termotolerantes. No quarto trimestre de 2007 observou-se 1,9% de IQA Muito Ruim, fato não observado em nenhuma campanha de 2006.




Figura 8.7: Frequência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Grande – UPGRH's GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7 e GD8, no ano de 2007.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE

Na bacia do rio Doce o predomínio de IQA Médio foi constatado no 2º e 3º trimestres de 2007, ocorrendo, respectivamente, em 84,4% e 53,1% das estações. A maior ocorrência de IQA Ruim foi registrada no 1º trimestre, em 53,1% das estações, sendo que em 28,1% das estações de amostragem o IQA não foi calculado. O IQA Bom predominou no 4º trimestre de 2007 em 53,1% das estações de amostragem (Figura 8.8).




Figura 8.8: Frequência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Doce – UPGRH's DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6, no ano de 2007.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Na bacia do rio Paraíba do Sul observou-se o predomínio do IQA Ruim no 1º trimestre de 2007, com ocorrência em 62,1% das estações de amostragem. No 3º e 4º trimestres o IQA Ruim apresentou, respectivamente, 20,7% e 34,5% de frequência. O IQA Médio prevaleceu no 3º e 4º trimestres de amostragem, com 72,4% e 37,9% de ocorrência, respectivamente. Os IQA's Bom e Muito Ruim foram identificados, ambos, em 3,4% das ocorrências, somente no 3º trimestre. O IQA não foi calculado em 27,6% das estações de amostragem no 4º trimestre e em todas as estações no 2º trimestre de 2007, devido à perda de informações relativas ao parâmetro coliformes termotolerantes (Figura 8.9).




Figura 8.9: Frequência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Paraíba do Sul – UPGRH PS1 e PS2, no ano de 2007.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA

Na Figura 8.10 é apresentada a freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas nas quatro campanhas de monitoramento de 2007, na bacia hidrográfica do rio Paranaíba. Observou-se em 2007 a predominância do IQA Bom nas duas campanhas do período seco (2º e 3º trimestres), com 66,7% de freqüência. Por outro lado, o IQA Médio ocorreu em 52,9% e 61,1% das estações no período chuvoso (1º e 4º trimestres respectivamente). O IQA Ruim foi verificado em 5,9%, 11,1% e 22,2% das estações no 1º, 2º e 4º trimestres, respectivamente.

Ressalta-se que não foi registrada nenhuma ocorrência de IQA Muito Ruim ao longo de todo o período de monitoramento nessa bacia hidrográfica.




Figura 8.10: Freqüência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Paranaíba – UPGRH's PN1, PN2 e PN3, no ano de 2007.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JEQUITINHONHA

Na bacia do rio Jequitinhonha o IQA Bom ocorreu em 23,1% e 92,3% das estações no 2º e 3º trimestres de 2007, respectivamente. O IQA Médio apresentou 30,8% e 7,7% de frequência nesse mesmo período. No 1º trimestre, observou-se a ocorrência de IQA Ruim em 25% das estações monitoradas. Ressalta-se que o IQA não pôde ser calculado em 75%, 46,2% e 100% das estações no 1º, 2º e 4º trimestres, respectivamente, devido às perdas de informações do parâmetro coliformes termotolerantes (Figura 8.11).




Figura 8.11: Frequência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Jequitinhonha – UPGRHs JQ1, JQ2 e JQ3.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MUCURI

A Figura 8.12 apresenta o Índice de Qualidade das Águas - IQA na bacia do rio Mucuri nas quatro campanhas de monitoramento realizadas em 2007. O IQA Médio predominou nesta bacia no 1º, 2º e 3º trimestres, ocorrendo, respectivamente, em 62,5%, 75% e 62,5% das estações. Foi observado o aumento da ocorrência de IQA Bom no 2º e 3º trimestres, período de seca. O cálculo do IQA não foi possível para o 4º trimestre, devido à perdas de informações referentes ao parâmetro coliformes termotolerantes.




Figura 8.12: Frequência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Mucuri – UPGRH MU1.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO

A Figura 8.13 apresenta o Índice de Qualidade das Águas para a bacia hidrográfica do rio Pardo. Observou-se predomínio absoluto do IQA Médio no 1º trimestre, ocorrendo em 100% das estações de amostragem. O IQA Bom apresentou 33,3% e 100% de frequência, no 2º e 3º trimestres, respectivamente, período que corresponde à estiagem. Perdas de informações relativas ao parâmetro coliformes termotolerantes impossibilitaram o cálculo do IQA no 2º e 4º trimestres em 66,7% e 100% das estações, respectivamente.




Figura 8.13: Frequência de ocorrência do Índice de Qualidade das Águas- IQA na bacia do rio Pardo – UPRH PA1.

8.2. CT – Contaminação por Tóxicos nas Bacias Hidrográficas

Nas bacias hidrográficas monitoradas em 2007, pôde-se verificar uma grande melhora em relação à Contaminação por Tóxicos comparativamente ao ano de 2006. Assim, observa-se de forma geral o predomínio da Contaminação por Tóxicos Baixa nas bacias monitoradas em Minas Gerais em 2007, sendo que nas bacias dos rios Pardo, Mucuri e Paranaíba, não houve registro de CT Alta (Figura 8.14).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 8.14: Frequência de ocorrência de Contaminação por Tóxicos no Estado de Minas Gerais, no ano de 2007.

Analisando-se a Figura 8.15 pôde-se perceber que o chumbo total foi a substância tóxica que apresentou as maiores ocorrências em desconformidade com a legislação em todo o Estado de Minas Gerais em 2007, quando cerca de 22,7% das análises desse parâmetro não atenderam aos limites das classes de enquadramento dos corpos de água monitorados. Destacam-se também as ocorrências do parâmetro fenóis totais, com 21% de ocorrência. Vale ressaltar ainda os parâmetros nitrogênio amoniacal total, arsênio total, cromo total e cobre dissolvido, que apresentaram, respectivamente, 12,6%, 11,8%, 11,8% e 10,1% de ocorrências em desconformidade com os limites estabelecidos na Resolução CONAMA Nº357/05.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 8.15: Ocorrência de parâmetros avaliados na Contaminação por Tóxicos no Estado de Minas Gerais, no ano de 2007.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

Na bacia do rio São Francisco houve permanência de CT Alta na frequência de 15% em 2007, prevalecendo a condição de CT Baixa em todas as sub-bacias nesse ano (Figura 8.16).




Figura 8.16: Frequência de ocorrência de Contaminação por Tóxicos nas sub-bacias do rio São Francisco, no ano de 2007.

As Figuras a seguir destacam a contribuição dos parâmetros avaliados na Contaminação por Tóxicos nas faixas Média e Alta em cada sub-bacia do rio São Francisco em 2007.

Rio São Francisco e afluentes

No rio São Francisco e seus afluentes, houve redução das ocorrências de CT Média entre 2006 e 2007, com os percentuais variando de 20 para 17%. O parâmetro que mais contribuiu para a CT Média em 2007 foi o cobre dissolvido, que violou os limites legais em 40% das estações. As ocorrências de CT Alta, por sua vez, mostraram um aumento, variando de 71% em 2006 para 74% em 2007. Os parâmetros nitrogênio amoniacal, arsênio total, chumbo total, cobre dissolvido e cianeto livre contribuíram, cada um com 20% das ocorrências de CT Alta (Figura 8.17).




Figura 8.17: Frequência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRHs SF1, SF4, SF6, SF7, SF8, SF9 e SF10.

Sub-Bacia do Rio Pará

Na sub-bacia do rio Pará, as frequências de CT Média e Alta diminuíram, respectivamente, de 31% e 12% em 2006 para 8% e 8% em 2007 nas estações amostradas. Dentre as estações que registraram frequência de CT Média, os parâmetros nitrogênio amoniacal e chumbo total foram responsáveis por 25% das ocorrências, enquanto o parâmetro fenóis totais foi responsável por 50% das ocorrências. Em relação aos registros da frequência de CT Alta, os parâmetros nitrogênio amoniacal, chumbo total e cianeto livre registraram 20% das ocorrências contra 40% dos fenóis totais (Figura 8.18).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 8.18: Frequência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRH SF2.

Bacia do Rio Paraopeba

Na sub-bacia do rio Paraopeba verificou-se redução na ocorrência da CT Média de 41% em 2006 para 23% em 2007. Por outro lado, a frequência da CT Alta aumentou de 4% para 7% entre esses dois anos. Os parâmetros chumbo total e nitrogênio amoniacal foram os principais responsáveis pela CT Média 2007, ambos contribuindo com 33% das ocorrências. As ocorrências de CT Alta se deveram ao nitrogênio amoniacal, cianeto livre e fenóis totais (Figura 8.19).




Figura 8.19: Frequência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRH SF3.

Sub-Bacia do Rio das Velhas

Na sub-bacia do rio das Velhas observou-se o aumento da CT Alta de 30% em 2006 para 36% em 2007, enquanto a frequência de CT Média manteve-se em 24% nesses dois anos. Os parâmetros fenóis totais e nitrogênio amoniacal foram responsáveis, respectivamente, por 44,4% e 22,2% das ocorrências de Contaminação por Tóxicos Média em 2007. Arsênio total e chumbo total foram os principais responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta, com frequências de 45% e 20% das ocorrências, respectivamente (Figura 8.20).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 8.20: Frequência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRH SF5.

As Figuras a seguir destacam a contribuição dos parâmetros avaliados na Contaminação por Tóxicos nas faixas Média e Alta nas demais bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais, em 2007.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE

Em 2007 a bacia do rio Grande apresentou aumento de 7% da CT Média e diminuição de 8% da CT Alta, em relação ao ano de 2006. Os parâmetros chumbo total e cobre dissolvido foram os que mais contribuíram para a CT Média em 2007, com uma frequência de 50% e 40%, respectivamente. Os parâmetros nitrogênio amoniacal, cianeto livre, cromo total, fenóis totais e mercúrio total foram os responsáveis pela CT Alta nesta bacia, com cerca de 20% de frequência de cada um deles (Figura 8.21).




Figura 8.21: Frequência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRHs GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7 e GD8.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE

Na bacia do rio Doce, houve diminuição das frequências de CT Alta e Média, respectivamente, de 38% e 34% em 2006 para 12,5% e 9,4% em 2007, nas estações amostradas.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Ainda nessa bacia, os parâmetros bário total, mercúrio total e cromo total foram responsáveis, respectivamente, por 25%, 25% e 50% das ocorrências de CT Média no ano de 2007. Em relação aos registros da frequência de CT Alta, os parâmetros arsênio total, chumbo total e cromo total corresponderam a 33,3% das ocorrências (Figura 8.22).




Figura 8.22: Frequência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRHs DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Na bacia do rio Paraíba do Sul, a frequência de CT Alta aumentou de 17% em 2006 para 20,7% em 2007, nas estações amostradas. Em relação à CT Média, houve diminuição de sua frequência, de 17% em 2006 para 10,3% nas estações de monitoramento. Em 2007, na bacia do rio Paraíba do Sul foi registrada a ocorrência de Contaminação por Tóxicos Média em função dos parâmetros fenóis totais e cromo total com 42,9% e 28,6% de frequência, respectivamente. Os parâmetros nitrogênio amoniacal e chumbo total apresentaram 14,3% das ocorrências, cada um. O parâmetro chumbo total foi o responsável por 50% das ocorrências de CT Alta no ano em questão, enquanto os valores de cromo total e cádmio total foram responsáveis por 25% das ocorrências, cada um (Figura 8.23).




Figura 8.23: Frequência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta e Média no ano de 2007 – UPGRHs PS1 e PS2.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA

Na bacia do rio Paranaíba, a CT Alta, que apresentou 11% de freqüência em 2006, não foi detectada em 2007. Houve redução de CT Média de 22% em 2006 para 11,1 % em 2007. Os parâmetros que influenciaram a CT Média em 2007 foram cromo total e fenóis totais, com freqüência de 50% das ocorrências para cada um deles (Figura 8.24).




Figura 8.24: Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Média no ano de 2007 – UPGRHs PN1, PN2 e PN3.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JEQUITINHONHA

Na bacia do rio Jequitinhonha não se observou Contaminação por Tóxicos Média em 2007, o que se contrapõe à freqüência de 46% de ocorrência registrada em 2006. A ocorrência de CT Alta também apresentou uma redução entre 2006 e 2007, passando de 31% a 15%. Os parâmetros chumbo total e cromo total foram responsáveis, respectivamente, por 66,7% e 33,3% das ocorrências de CT Alta em 2007 (Figura 8.25).




Figura 8.25: Freqüência da ocorrência de parâmetros responsáveis pela Contaminação por Tóxicos Alta no ano de 2007 – UPGRHs JQ1, JQ2 e JQ3.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO

Na bacia do rio Pardo, a frequência de CT Alta diminuiu, de 33% em 2006 para 0% em 2007 nas estações de monitoramento. Na bacia do rio Pardo, não se observou ocorrência de CT Média ou Alta no ano de 2007.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MUCURI

Também não foram registradas ocorrências de Contaminação por Tóxicos Média ou Alta na bacia do rio Mucuri, diferente do observado em 2006, quando 37% das estações monitoradas haviam apresentado CT Média.

8.3. Parâmetros em desacordo com a legislação

8.3.1. No Estado de Minas Gerais

Na Figura 8.26 pode-se observar a ocorrência de metais em desconformidade com os limites estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 no Estado de Minas Gerais em 2007. O parâmetro manganês total permanece apresentando as maiores frequências de desconformidades no Estado, totalizando 36,2% das ocorrências, aumento de 5% em relação ao ano de 2006. O metal ferro dissolvido vem em seguida, com aumento de 12,7% nas ocorrências de desconformidades em relação a 2006, totalizando 27,7% das ocorrências em 2007. Merece destaque também o parâmetro alumínio dissolvido, que em 2007 totalizou 21,5% das ocorrências em desconformidade com os limites permitidos pela legislação, aumento de 15,1% em relação a 2006. Estes metais são importantes constituintes da camada de substratos dos solos no Estado de Minas Gerais, sendo assim, podem ser considerados constituintes naturais das águas das bacias hidrográficas do território mineiro.

A frequência constante e elevada das concentrações desses parâmetros em Minas Gerais pode estar relacionada às atividades do setor minerário e metalúrgico, além do manejo inadequado dos solos sem os devidos cuidados para preservação da vida aquática.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 8.26: Frequência da ocorrência de metais fora dos limites estabelecidos na legislação no Estado de Minas Gerais, em 2007.

Em relação aos demais parâmetros monitorados, pôde-se observar pela Figura 8.27, que a contagem de coliformes termotolerantes permanece apresentando a maior frequência de desconformidades no Estado de Minas Gerais, totalizando 54,2% das ocorrências em 2007. Ressalta-se o aumento das ocorrências do parâmetro cor verdadeira em 2007, totalizando 36,1% das ocorrências no Estado. Vale destacar ainda, as frequências dos parâmetros fósforo total e turbidez, com 26,2% e 16,5% das ocorrências, respectivamente, em 2007.

As violações das concentrações desses parâmetros em relação aos limites legais em Minas Gerais pode estar relacionada aos lançamentos de efluentes domésticos e industriais nos corpos de água, além do uso de fertilizantes na agricultura e manejo inadequado do solo.




Figura 8.27: Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação no Estado de Minas Gerais, em 2007.

8.3.2. Nas bacias hidrográficas

Os parâmetros que estiveram em desconformidade com os limites de classe de enquadramento nas bacias hidrográficas de Minas Gerais em 2007 são mostrados nas Figuras 8.28 a 8.38. O parâmetro coliformes termotolerantes apresentou as maiores ocorrências, predominando na maioria das bacias mineiras em 2007, como por exemplo na bacia do rio das Velhas (Figura 8.31). Nas bacias dos rios São Francisco e afluentes, Paranaíba e Jequitinhonha predominaram as ocorrências do parâmetro cor verdadeira (Figuras 8.28, 8.35 e 8.36, respectivamente).

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

Rio São Francisco e afluentes




Figura 8.28: Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRHs SF1, SF4, SF6, SF7, SF8, SF9 e SF10.

Sub-Bacia do Rio Pará




Figura 8.29: Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH SF2.

Sub-Bacia do Rio Paraopeba




Figura 8.30: Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH SF3.

Sub-Bacia do Rio das Velhas




Figura 8.31: Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH SF5.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE




Figura 8.32: Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRHs GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7 e GD8.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE




Figura 8.33: Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL




Figura 8.34: Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH PS1 e PS2.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA




Figura 8.35: Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPRHs PN1, PN2 e PN3.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JEQUITINHONHA




Figura 8.36: Frequência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPRHs JQ1, JQ2 e JQ3.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MUCURI




Figura 8.37: Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH MU1.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO




Figura 8.38: Freqüência da ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na legislação em 2007 – UPGRH PA1.

8.4. Ensaios de Ecotoxicidade

Com o objetivo de atender à demanda de informações mais completas sobre a qualidade das águas em todo o Estado, a rede de monitoramento das condições ecotoxicológicas dos corpos de água do Projeto Águas de Minas passou por um processo de atualização em 2007. Nesse processo, as 32 estações originais foram mantidas e 35 novas estações foram incluídas a partir do 3º trimestre de amostragem. As modificações realizadas foram a ampliação das redes de amostragem da bacia do rio Grande, com a inclusão de 13 estações e da bacia do rio São Francisco, onde foram incluídas 22 estações. Assim, a rede atual para o monitoramento ecotoxicológico é composta por 67 estações de amostragem, distribuídas da seguinte forma: 30 na bacia do rio Grande, 12 na bacia do rio Paranaíba, 24 na bacia do rio São Francisco, e uma na bacia do rio Doce.

A distribuição das estações foi determinada, principalmente, em função do uso do solo nas áreas adjacentes, priorizando áreas em que há predominância da agricultura com uso de agroquímicos. No entanto, também foram considerados corpos de água que recebem esgotos industriais e sanitários, bem como rejeitos de mineração.

Os resultados apresentados a seguir referem-se a 560 ensaios de toxicidade crônica, realizados nas 67 estações de amostragem monitoradas entre agosto de 2003 e dezembro de 2007 com frequência trimestral. O microcrustáceo *Ceriodaphnia dubia* foi o organismo-teste utilizado.

Nas estações em que se realizaram pelo menos quatro amostragens, as condições de ecotoxicidade foram avaliadas através dos percentuais de ocorrência durante os trimestres realizados. As estações onde efeitos tóxicos foram identificados em menos de 25% dos ensaios realizados foram caracterizadas como tendo **Baixa** ocorrência de ecotoxicidade; aquelas em que 25,1 a 50% dos ensaios apresentaram resultados positivos foram consideradas com ocorrência **Média** e aquelas estações cuja porcentagem de resultados positivos foi superior a 50% foram consideradas com **Alta** ocorrência de ecotoxicidade. Para as estações que tiveram a ecotoxicidade avaliada a partir do terceiro trimestre de 2007, estão apresentados os resultados obtidos em cada ensaio de ecotoxicidade crônica realizado.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE

Duzentos e oitenta e três amostras foram avaliadas na bacia do rio Grande, 270 delas correspondentes às 17 estações monitoradas desde 2003 e 13 referentes às novas estações incluídas no 4º trimestre de 2007. Pouco mais da metade (51%) das amostras avaliadas apresentaram propriedades tóxicas, refletidas principalmente na redução da fecundidade do organismo-teste.

Comparando os resultados obtidos a cada ano nas estações amostradas desde 2003, nota-se que, em relação à ecotoxicidade, as piores condições das águas da bacia do rio Grande foram registradas em 2006, quando 88% das amostras apresentaram resultados positivos para os testes de toxicidade crônica. O ano de 2004 também se destacou pelo fato da maioria das amostras (67%) terem apresentado efeitos tóxicos, enquanto as melhores condições ocorreram em 2007, já que apenas 33% das amostras tiveram efeitos tóxicos (Figura 8.39).




Figura 8.39: Variação dos percentuais de estações da bacia do rio Grande com resultados positivos para os ensaios de ecotoxicidade crônica.

Nenhuma das estações monitoradas desde 2003 se mostrou atóxica. A estação localizada no rio Grande a montante do reservatório de Furnas (BG019) continuou apresentando a melhor condição ecotoxicológica, com **Baixa** ocorrência de resultados positivos (19% das amostras analisadas). Foi apontada uma melhoria das águas do rio Verde na localidade de Flora (BG035), onde o percentual de amostras em que se observaram propriedades tóxicas foi reduzido de 54% (**Alta** ocorrência de ecotoxicidade) para 47% (**Média** ocorrência de ecotoxicidade). O inverso foi observado no rio São João a montante do reservatório de Peixoto (BG055), que havia apresentado 50% das amostras com resultados positivos em 2006 e 56%, em 2007, migrando da categoria **Média** para **Alta** ocorrência de ecotoxicidade.

As piores condições continuaram a ser observadas na sub-bacia do rio Verde, onde quatro das cinco estações monitoradas apresentaram **Alta** ocorrência de ecotoxicidade (Tabela 8.1). A estação localizada no rio Baependi próximo a sua foz no rio Verde (BG029) destacou-se pelo maior percentual de amostras (75%) com efeitos tóxicos.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 8.1: Avaliação dos resultados dos testes de ecotoxicidade realizados entre agosto/2003 e dezembro/2007 na bacia do rio Grande

BACIA DO RIO GRANDE - Estações monitoradas desde 2003			
Ocorrência de Toxicidade	Nº de ensaios		
UPGRH GD1 - Rio Grande			
M	16	BG001	Rio GRANDE na cidade de Liberdade
A	15	BG003	Rio GRANDE a montante do Reservatório de Camargos
A	16	BG007	Rio GRANDE a jusante do Reservatório de Itutinga
A	15	BG009	Rio CAPIVARI próximo de sua foz no Rio Grande
UPGRH GD2 - Rio das Mortes, Grande e Jacaré			
M	15	BG011	Rio das MORTES a montante da cidade de Barbacena
B	16	BG019	Rio GRANDE a montante do Reservatório de Furnas
M	15	BG021	Rio JACARÉ a montante do Reservatório de Furnas
UPGRH GD4 - Rio Verde			
A	17	BG028	Rio VERDE na cidade de Soledade de Minas
A	16	BG029	Rio BAEPENDI próximo de sua foz no Rio Verde
A	15	BG031	Rio LAMBARÍ próximo de sua foz no Rio Verde
M	17	BG035	Rio VERDE na localidade de Flora
A	16	BG036	Rio PALMELA na proximidade de sua foz no Rio Verde
UPGRH GD5 - Rio Sapucaí			
M	16	BG044	Rio SAPUCAÍ-MIRIM a montante da cidade de Pouso Alegre
M	17	BG047	Rio SAPUCAÍ a montante da cidade de Careçu
M	16	BG049	Rio SAPUCAÍ a montante do Reservatório de Furnas
UPGRH GD7 - Rio Grande			
A	16	BG055	Rio SÃO JOÃO a montante do Reservatório de Peixoto
UPGRH GD8 - Rio Grande			
M	16	BG059	Rio UBERABA a montante do Reservatório de Porto Colômbia

Legenda:

B = Baixa Ocorrência de Toxicidade = Resultados Positivos em até 25% dos ensaios realizados

M = Média Ocorrência de Toxicidade = Resultados Positivos em 25,1 a 50% dos ensaios realizados

A = Alta Ocorrência de Toxicidade = Resultados Positivos em 50,1 a 100% dos ensaios realizados

Conforme pode ser observado na Tabela 8.2, quatro das estações que tiveram o monitoramento das condições ecotoxicológicas iniciado em 2007 apresentaram resultados positivos para os ensaios realizados com o microcrustáceo *Ceriodaphnia dubia*. Duas delas (BG063 e BG083) localizam-se no rio das Antas, sugerindo grande impacto antrópico sobre esse corpo de água. No caso da estação situada no rio das Antas a jusante da cidade de Poços de Caldas (BG063), o principal impacto e provável causa das condições restritivas para a biota é o lançamento de esgoto não tratado da cidade de Poços de Caldas, enquanto aquela situada no rio das Antas a jusante de Bueno Brandão (BG083) encontra-se em área de pastagem. As águas do rio Mogi Guaçu na cidade de Inconfidentes (BG077) também tiveram efeitos crônicos nos ensaios de toxicidade.

A amostra coletada no córrego Liso a jusante de São Sebastião do Paraíso (BG071) chamou a atenção por causar a morte dos organismos-teste, configurando um quadro de toxicidade aguda. A presença de curtumes a montante dessa estação e o lançamento de esgoto não tratado proveniente do município de São Sebastião do Paraíso constituem os principais fator de degradação ambiental.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 8.2: Resultados dos testes de ecotoxicidade observados nas estações da bacia do rio Grande monitoradas na 4ª campanha de 2007

Nº de ensaios	Resultado 4a 2007	BACIA DO RIO GRANDE - Estações monitoradas a partir de 2007	
UPGRH's GD3 e GD4 - Rio Verde			
1	-	BG065	Ribeirão SÃO PEDRO a montante do lago de furnas
1	-	BG069	Rio MACHADO a jusante da cidade de Machado
1	-	BG067	Ribeirão da ESPERA a jusante do lixão da cidade de Varginha
UPGRH GD6 - Rios das Antas, Pardo, Mogi Guaçu			
1	+	BG063	Rio das ANTAS a jusante da cidade de Poços de Caldas
1	-	BG075	Rio PARDO a jusante de Ipuina
1	+	BG077	Rio MOGI GUAÇU na cidade de Inconfidentes
1	-	BG079	Ribeirão OURO FINO na cidade de Ouro Fino
1	-	BG081	Rio MOGI GUAÇU na divisa de Minas Gerais com São Paulo
1	+	BG083	Rio das ANTAS a jusante de Bueno Brandão
UPGRH GD7 - Entrono da Represa Peixoto			
1	+	BG071	Córrego LISO a Jusante de São Sebastião do Paraíso
1	-	BG073	Rio SANTANA a jusante do córrego Liso
UPGRH GD8 - Rio Grande			
1	-	BG085	Rio VERDE ou FEIO a montante do lago de Águas Vermelhas
1	-	BG087	Ribeirão TRONQUEIRA a jusante da cidade de Iturama

Legenda:

+ = Ocorrência de toxicidade

- = Toxicidade não detectada

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA

A rede de monitoramento ecotoxicológico da bacia do rio Paranaíba não sofreu alterações. Foram realizados 195 ensaios de ecotoxicidade crônica entre julho de 2003 e dezembro de 2007, referentes a 12 estações de amostragem com frequência trimestral.

A pior situação em relação à ecotoxicidade da água também ocorreu em 2006, quando 69% dos ensaios realizados tiveram resultados positivos (Figura 8.40). No entanto, a diferença entre os anos de monitoramento, especialmente 2005, 2006 e 2007, foi menos expressiva do que na bacia do rio Grande.




Figura 8.40: Variação dos percentuais de estações da bacia do rio Paranaíba com resultados positivos para os ensaios de ecotoxicidade crônica.

A categoria de porcentagem de ocorrência de resultados positivos para cada estação pode ser observada na Tabela 8.3. Nenhum dos corpos de água monitorados apresentou **Baixa** ocorrência de ecotoxicidade (resultados positivos em até 25% das amostras analisadas), sendo o percentual mínimo de amostras com efeitos deletérios observados nessa bacia de 31% (rio São Domingos, PB033).

As piores condições foram observadas na sub-bacia do rio Araguari, especialmente nas estações de amostragem no rio Quebra Anzol e no próprio rio Araguari, ambas localizadas a montante do reservatório de Nova Ponte (PB011 e PB017, respectivamente). Nesses pontos, mais de 80% das amostras testadas apresentaram resultados positivos para os ensaios de toxicidade crônica. Na bacia do rio Paranaíba, o rio Tijuco a montante do reservatório São Simão (PB027) também apresentou uma grande proporção de amostras (75%) com propriedades tóxicas para o organismo- teste.

Duas estações, PB019 e PB033, tiveram suas categorias de ocorrência de ecotoxicidade alteradas entre 2006 e 2007, evidenciando uma piora nas condições ambientais entre esses dois anos. Na estação localizada no rio Araguari a jusante do Reservatório de Miranda (PB019), o percentual de ocorrência de amostras com resultados positivos aumentou de 50 (**Baixa**) para 63% (**Média**) com a inclusão dos dados de 2007. Na estação do rio São Domingos (PB033), haviam sido registrados efeitos ecotoxicológicos em 16% dos ensaios realizados até 2006 e observou-se aumento desse percentual para 31% após a inclusão dos resultados de 2007, ano em que três das quatro amostras coletadas apresentaram ecotoxicidade crônica. As possíveis causas para esse aumento podem estar associadas às atividades de agricultura e à outras fontes de poluição difusa dessa região.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 8.3: Avaliação dos resultados dos testes de ecotoxicidade realizados entre agosto/2003 e dezembro/2007 na bacia do rio Paranaíba

BACIA DO RIO PARANAÍBA			
Ocorrência de Toxicidade	Nº de ensaios		
UPGRH PN1 - Rio Paranaíba			
M	16	PB003	Rio PARANAÍBA a jusante da cidade de Patos de Minas
A	17	PB007	Rio PARANAÍBA entre os Reservatórios de Emborcação e Itumbiara
A	16	PB009	Rio JORDÃO a jusante da cidade de Araguari
UPGRH PN2 - Rio Araguari			
A	17	PB011	Rio QUEBRA ANZOL a montante do Reservatório de Nova Ponte
M	16	PB013	Rio CAPIVARA a jusante da cidade de Araxá
A	16	PB017	Rio ARAGUARI a montante do Reservatório de Nova Ponte
A	16	PB019	Rio ARAGUARI a jusante do Reservatório de Miranda
M	15	PB023	Rio UBERABINHA a jusante da cidade de Uberlândia
UPGRH PN3 - Rio Paranaíba e afluentes			
M	17	PB025	Rio PARANAÍBA a jusante do Reservatório de Itumbiara
A	16	PB027	Rio TIJUCO a montante do Reservatório de São Simão
M	17	PB029	Rio da PRATA a montante do Reservatório de São Simão
M	16	PB033	Rio SÃO DOMINGOS próximo de sua foz no Rio Paranaíba

Legenda:

B = Baixa Ocorrência de Toxicidade = Resultados Positivos em até 25% dos ensaios realizados

M = Média Ocorrência de Toxicidade = Resultados Positivos em 25,1 a 50% dos ensaios realizados

A = Alta Ocorrência de Toxicidade = Resultados Positivos em 50,1 a 100% dos ensaios realizados

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

As principais modificações na rede de monitoramento ecotoxicológico ocorreram na bacia do rio São Francisco. Até 2006, eram monitoradas apenas duas estações nessa bacia, uma na sub-bacia do rio Paracatu e outra na sub-bacia do rio Verde Grande. No entanto, dada a importância sócio-econômica e ambiental do rio São Francisco, optou-se pela incorporação de outras vinte e duas estações a partir do terceiro trimestre de 2007. As novas estações foram distribuídas entre seis Unidades de Planejamento, abrangendo as sub-bacias dos rios das Velhas (10), Urucuia (6), Verde Grande (3) e Paracatu (1), além de duas estações localizadas no próprio rio São Francisco.

Nas duas estações monitoradas desde 2003, não se observaram mudanças na categoria de ocorrência de ecotoxicidade entre 2006 e 2007. Apesar do percentual de amostras tóxicas no rio Verde Grande próximo de sua foz no rio São Francisco (VG011) ter aumentado de 9 para 13% entre esses dois anos, esse trecho de rio permaneceu com **Baixa** ocorrência de ecotoxicidade. Nenhuma melhoria em relação às condições de ecotoxicidade foi observada no trecho do rio Preto a jusante da cidade de Unai (PT007), que continuou apresentando **Alta** ocorrência de ensaios com resultado positivo (Tabela 8.4).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 8.4: Avaliação dos resultados dos testes de ecotoxicidade realizados entre agosto/2003 e dezembro/2007 na bacia do rio São Francisco

Ocorrência de Toxicidade	BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - Porção Norte		
	Nº de ensaios		
		UPGRH SF07 - Rio Paracatu	
A	12	PT007	Rio PRETO a jusante da cidade de Unai
		UPGRH SF10 - Rio Verde Grande	
B	15	VG011	Rio VERDE GRANDE próximo de sua foz no Rio São Francisco

Legenda:

B = Baixa Ocorrência de Toxicidade = Resultados Positivos em até 25% dos ensaios realizados

M = Média Ocorrência de Toxicidade = Resultados Positivos em 25,1 a 50% dos ensaios realizados

A = Alta Ocorrência de Toxicidade = Resultados Positivos em 50,1 a 100% dos ensaios realizados

Dentre as estações monitoradas a partir de 2007 (Tabela 8.5), a pior condição de ecotoxicidade parece ocorrer na sub-bacia do rio Urucuia, onde todas as estações apresentaram efeitos tóxicos para o microcrustáceo *Ceriodaphnia dubia*. Devido a problemas técnicos, a ecotoxicidade não pôde ser avaliada nas novas estações do rio São Francisco a montante da foz no rio das Velhas (SF019) e a jusante de Januária (SF029) e no córrego Rico a jusante da cidade de Paracatu (PT005) ainda na terceira campanha de 2007. No quarto trimestre, nenhuma delas apresentou resultados positivos para os ensaios realizados. Deve-se destacar ainda, que, no terceiro trimestre de 2007, a amostra coletada no ribeirão dos Vieiras a jusante da cidade de Montes Claros (VG003) causou a morte do organismo teste, apontando condições ambientais extremamente restritivas para a vida aquática. Esse quadro parecer ter sido amenizado no período de chuvas, uma vez que não foram observados efeitos deletérios na quarta campanha.

Dois afluentes do rio das Velhas, ribeirão do Onça (BV154) e ribeirão Arrudas (BV155) se destacaram por apresentarem resultados positivos nos dois trimestres de amostragem realizados em 2007. Nestes dois ambientes, que recebem grandes cargas de esgotos domésticos e industriais, as condições ambientais parecem ter se tornado ainda mais críticas com a chegada das chuvas, uma vez que os ensaios de ecotoxicidade realizados no último trimestre de amostragem de 2007 culminaram com a morte dos organismos-teste, evidenciando um efeito agudo da água e condições extremamente restritivas para o desenvolvimento e a manutenção da vida aquática.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 8.5: Resultados dos testes de ecotoxicidade observados nas estações da bacia do rio São Francisco monitorados a partir do 3º trimestre de 2007

Nº de ensaios	Resultados		BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - Estações monitoradas a partir de 2007	
	3a 2007	4a 2007		
UPGRH SF5 - Rio das Velhas				
2	-	-	BV076	Ribeirão Sabará próximo de sua foz no Rio das Velhas
2	-	-	BV083	Rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão Arrudas
2	-	-	BV105	Rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão do Onça
2	-	-	BV130	Ribeirão da Mata próximo de sua foz no Rio das Velhas
2	-	-	BV135	Rio TAQUARAÇU próximo de sua foz no Rio das Velhas
2	-	-	BV137	Rio das Velhas na Ponte Raul Soares
2	-	-	BV153	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão da Mata
2	+	+	BV154	Ribeirão do Onça próximo de sua foz no Rio das Velhas
2	+	+	BV155	Ribeirão Arrudas próximo de sua foz no Rio das Velhas
2	-	+	BV160	Ribeirão das Neves próximo de sua foz no Ribeirão da Mata
UPGRH's SF6 e SF9 - Rio São Francisco				
1	*	-	SF019	Rio SÃO FRANCISCO a montante da foz do rio das Velhas
1	*	-	SF029	Rio São Francisco a jusante da cidade de Janaúria
UPGRH SF7 - Rio Paracatu				
	*	-	PT005	Córrego Rico a jusante da cidade de Paracatu
UPGRH SF8 - Rio Urucuia				
1		+	UR001	Rio Urucuia na cidade de Buritis
2	-	+	UR011	Ribeirão São Domingos no município de Buritis
2	-	+	UR013	Rio Urucuia a montante da cidade de Arinos
2	-	+	UR014	Rio São Miguel a jusante da cidade de Uruana de Minas
2	+	-	UR016	Ribeirão Santo André na MG-181, próximo à cidade de Bonfinópolis de Minas
2	+	-	UR017	Rio Urucuia a montante da sua confluência com o rio São Francisco
UPGRH SF10 - Rio Verde Grande				
1	+	-	VG003	Ribeirão dos Vieiras a jusante da cidade de Montes Claros
1	*	-	VG007	Rio Gorutuba a jusante da cidade de Janaúba e da barragem da ASSIEG
1	*	-	VG009	Rio Gorutuba a montante da confluência com o rio Pacuí

A bacia do rio doce, representada no projeto Águas de Minas pela estação localizada no rio Manhuaçu em Santana do Manhuaçu (RD064), apresentou uma piora das condições ecotoxicológicas entre 2006 e 2007, tendo sua porcentagem de resultados positivos aumentada 31 para 38%. Apesar desse aumento, não houve mudança na categoria de ocorrência, que permaneceu **Média**. Através da avaliação temporal (Figura 8.41), nota-se que nenhuma das amostras coletadas em 2004 e 2005 apresentou efeitos ecotoxicológicos, enquanto as piores condições nessa estação foram verificadas em 2006 (75% das amostras).




Figura 8.41: Variação dos percentuais de amostras do rio Manhuaçu com resultados positivos para os ensaios de ecotoxicidade crônica.

Considerações Finais

Os resultados mostram que em todas as bacias houve resultados positivos de ecotoxicidade das águas. Dentre as 32 estações monitoradas no período compreendido entre 2003 e 2007, trinta (94%) apresentaram **Alta** ou **Média** ocorrência de ecotoxicidade, evidenciando condições restritivas ao desenvolvimento da biota em pelo menos um quarto das amostras coletadas em cada uma delas (Figura 8.42). Somente duas estações (6%), mostraram baixa ocorrência de ensaios com resultados positivos, quais sejam: rio Verde Grande próximo de sua foz no rio São Francisco (VG011) e rio Grande a montante do Reservatório de Furnas (BG019).




Figura 8.42: Distribuição das estações entre as categorias Alta, Média e Baixa ocorrência de ecotoxicidade.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

As piores condições foram registradas no rio Quebra-Anzol a montante do Reservatório de Nova Ponte (PB011) e no rio Araguari a montante do Reservatório de Nova Ponte (PB017) e a jusante do Reservatório de Miranda (PB019), ambos localizados na bacia do rio Paranaíba e rio Baependi próximo de sua foz no rio Verde (BG029), localizado na bacia do rio Grande, os quais apresentaram efeitos tóxicos em mais de 75% das amostras coletadas entre 2003 e 2007.

Dentre os novos corpos de água monitorados, deve-se destacar o rio das Antas a jusante da cidade de Poços de Caldas (BG063) e a jusante de Bueno Brandão (BG083), cujas duas estações amostradas apresentaram condições restritivas para a biota e o córrego Liso a jusante de São Sebastião do Paraíso (BG071), onde a amostra coletada causou a morte dos organismos-teste. A letalidade também foi observada em três estações da bacia do rio São Francisco: Ribeirão dos Vieiras a jusante da cidade de Montes Claros (VG003), pertencente à sub-bacia do rio Verde Grande, e nos ribeirões do Onça (BV154) e Arrudas (BV155), na sub-bacia do rio das Velhas. Todas estas estações recebem grandes cargas de esgotos domésticos e industriais, e estão próximas aos grandes centros urbanos.

9. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA SUB-BACIA DO RIO PARÁ

Com uma área de drenagem igual a 12.270 Km², representando cerca de 2% da superfície do todo o Estado de Minas Gerais, o rio Pará é o principal corpo de água da bacia e afluente para o rio São Francisco após quase 300 Km. Nasce com o nome de ribeirão Cajurú, nas vertentes das serras do Galga e da Cebola a uma altitude de 1.180 m, desaguando no rio São Francisco, próximo ao reservatório de Três Marias, na divisa dos municípios de Pompéu e Martinho Campos – MG. Seus principais afluentes são os rios São João e Peixe à margem direita e os rios Lambari e Picão à margem esquerda. A bacia sedia 27 municípios, quais sejam: Araújos, Bom Despacho, Carmo da Mata, Carmo do Cajurú, Carmópolis de Minas, Cláudio, Conceição do Pará, Desterro de Entre Rios, Divinópolis, Igaratinga, Itaguara, Itapecerica, Itaúna, Leandro Ferreira, Martinho Campos, Nova Serrana, Onça do Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Passa Tempo, Pedra do Indaiá, Perdigão, Piracema, Pitangui, Santo Antônio do Monte, São Gonçalo do Pará, São Sebastião do Oeste.

Os dados gerais da sub-bacia do rio Pará estão descritos na Tabela 9.1.

Tabela 9.1: Dados Gerais da Sub-Bacia do rio Pará em Minas Gerais

Área de Drenagem	12.270 km ²	
Sede municipal na bacia	27 municípios	
População aproximada (IBGE, 2000)	Urbana	547.941 habitantes
	Rural	83.946 habitantes
Outorgas Superficiais vigentes em 2007	10,801 m ³ /s	
Outorgas Subterrâneas vigentes em 2007	0,700 m ³ /s	

Usos do Solo

A atividade minerária é desenvolvida em toda a sub-bacia do rio Pará, com predomínio da extração de minerais não metálicos. No alto e médio cursos do rio Pará destacam-se areia e granito, enquanto que na sub-bacia do rio do Peixe, baixo curso, verificam-se a exploração e beneficiamento de ardósia. O parque industrial é diversificado, abrangendo os ramos metalúrgico (guseiras, siderúrgicas e fundições), têxtil e confecção, curtume e alimentício. Os curtumes estão localizados na região dos municípios de Perdigão, São Gonçalo do Pará, Divinópolis e Itaúna; os laticínios se concentram em Araújos. O município de Divinópolis, inserido na sub-bacia do rio Itapecerica, bem como os de Itaúna e Pará de Minas, integrantes da sub-bacia do rio São João, constituem os mais importantes aglomerados urbanos e industriais da região. Além desses, ressaltam-se os municípios de Santo Antônio do Monte e Pedra do Indaiá, principal pólo de fabricação de fogos de artifício do Estado de Minas Gerais, bem como Nova Serrana no ramo de calçados.

A agricultura e pecuária são, também, atividades importantes desenvolvidas na sub-bacia do rio Pará, especialmente no alto e médio cursos. Merecem destaque a horticultura, desenvolvida na parte alta, nas sub-bacias dos rios Japão, Grande e São João em Carmópolis de Minas, Cláudio e Passa Tempo, e a avicultura e suinocultura nas sub-bacias dos rios Itapecerica, São João, Lambari e Paciência.

Um outro destaque é a extração de argila para a produção de cerâmica no município de Igaratinga e Araújos e as plantações de café e de cana-de-açúcar.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Atualmente, a parte noroeste da sub-bacia do rio Pará, municípios de Bom Despacho e Martinho Campos, é grande produtora de carvão e possui amplas áreas reflorestadas com eucalipto em virtude das atividades industriais desenvolvidas na região.

No rio Pará ocorre a extração de areia provocando assoreamentos em diversos trechos do corpo de água (Figura 9.1), assim como a exploração de ardósia (Figura 9.2) alterando a morfologia da região.



Figura 9.1: A esquerda: extração de areia no Rio Pará, na localidade de Pará dos Vilelas (PA003); e a direita, assoreamento entre Passa Tempo e desterro de Entre Rios (PA001).



Figura 9.2: Extração de ardósia às margens do Rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará.

Usos da Água

A sub-bacia do rio Pará é caracterizada principalmente pela presença dos seguintes tipos de uso dos recursos hídricos: abastecimento doméstico e industrial, geração de energia elétrica, irrigação, dessedentação de animais, pesca, piscicultura e recreação de contato primário.

De acordo com as outorgas concedidas pelo IGAM, válidas em 2007, os usos destinados à irrigação e dessedentação de animais se concentram na região noroeste da bacia. A aquicultura e usos industriais predominam na região central, onde se encontram os



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas


QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

municípios mais populosos como Divinópolis e Itaúna, enquanto o abastecimento encontra-se distribuído ao longo de toda a bacia (Mapa 9.1).

As áreas que apresentaram os maiores volumes outorgados na Bacia do Rio Pará são o norte da região, próximo ao município de Martinho Campos e na região central nos municípios de Divinópolis, Itaúna e Pará de Minas onde predominam vazões de 0,027 a 0,55 m³/s. A irrigação é bastante utilizada nestas áreas. As vazões de 0,013 a 0,041 m³/s são bastante comuns na sub-bacia (Mapa 9.2). Estes valores estão relacionados às atividades agropecuárias desenvolvidas nestas regiões.


Os usos industriais na região, em sua maioria, não apresentam grandes volumes outorgados. As áreas de maior concentração do uso industrial são Divinópolis, Itaúna e Nova Serrana.

USO DA ÁGUA NA SUB-BACIA DO RIO PARÁ SEGUNDO AS OUTORGAS CONCEDIDAS PELO IGAM, VÁLIDAS EM 2007



"Outros Usos Diversos" corresponde a usos pouco frequentes relacionados geralmente a desvios ou alterações da calha do curso de água, obras de contenção de encostas entre outros. Os usos correspondem às finalidades de captação, declaradas pelos usuários requisitantes de outorgas.

Localização



Legenda

- Sedes Municipais
- Principais Rios
- UPGRHs
- Usos da Água**
- Origem (Forma)**
- Superficial
- ▲ Subterrânea

Usos (Cor)

- Abastecimento
- Agroindústria
- Aquicultura
- Consumo Humano
- Dessedentação de Animais
- Indústria
- Irrigação
- Lavagem de Veículos
- Mineração
- Outros Usos Diversos
- Outros Usos Agropecuários
- Paisagismo

Sistema de Coordenadas Geodésicas South American Datum 1969

Fonte:
 - Bases Digitais Geominas, 1995
 - Banco de dados de Outorgas IGAM, Agosto de 2008
 Edição: Setembro de 2008
 DMFA - GEMOG
 Rua Espírito Santo, 495/12°
 031-3219-5797


1:800.000

0 9 18 36 Km

2007022606 - A4


Mapa 9.1: Uso da água na sub-bacia do rio Pará, segundo outorgas concedidas pelo IGAM, válidas em 2007.

**VOLUME DE ÁGUA
OUTORGADO PELO IGAM
NA SUB-BACIA DO RIO PARÁ,
VÁLIDO EM 2007**



Os volumes de água concedidos não correspondem à vazão do corpo ou recurso hídrico, mas à quantidade de água que se permitiu captar durante o processo de outorga.

Localização



Legenda

— Principais Rios

UPGRHs

Usos da Água

Origem (Forma)

- Superficial
- ▲ Subterrânea

Vazão m³/s (Cor)

Menos que 0,00279	0,027779 – 0,055556
0,00279 – 0,001389	0,055557 – 0,111111
0,001390 – 0,004167	Mais que 0,111112
0,004168 – 0,013889	
0,013890 – 0,027778	

1:800.000

0 9 18 36 Km

Sistema de Coordenadas
Geodésicas
South American
Datum 1969

Fonte:
- Bases Digitais Geominas, 1995
- Banco de dados de Outorgas
IGAM, Agosto de 2008
Edição: Setembro de 2008
DMFA - GEMOG
Rua Espírito Santo, 495/12°
031-3219-5797

2007022706 - A4

Mapa 9.2: Volume de água outorgado pelo IGAM na sub-bacia do rio Pará, válido em 2007.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Analisando a totalidade das outorgas de água vigentes em 2007, que utilizou como critério as vazões outorgadas pelo IGAM na sub-bacia do rio Pará (Figura 9.3), observa-se que as outorgas de águas superficiais se destinam principalmente aos usos múltiplos (53,6%), seguido do abastecimento (25,5%). A irrigação e indústria representam 14,3 e 5,8% das vazões outorgadas, respectivamente. Vale ressaltar que a categoria de usos múltiplos refere-se aos locais para onde um único registro de outorga foi realizado, porém com mais de um uso declarado pelo requerente.




Figura 9.3: Porcentagem de água superficial utilizada na sub-bacia do rio Pará em 2007, em função da vazão outorgada.

Em relação às águas subterrâneas, na sub-bacia do rio Pará prevalecem as vazões outorgadas referentes aos usos múltiplos (40,2%), abastecimento (31,2%) e uso industrial (18,7%). As atividades minerárias e outros que se destinam a lavagem de veículos, paisagismo, recreação e dessedentação de animais e correspondem respectivamente a 0,2, e 9,6% das vazões outorgadas (Figura 9.4). Os usos múltiplos se concentram em abastecimento industrial e também a dessedentação de animais.




Figura 9.4: Porcentagem de água subterrânea utilizada na sub-bacia do rio Pará em 2007, em função da vazão outorgada.

Distribuição das Estações de Amostragem na sub-bacia do rio Pará

A Tabela 9.2 apresenta a descrição das estações de amostragem monitoradas na sub-bacia do rio Pará em ordem numérica crescente.

Tabela 9.2: Descrição das estações de amostragem da sub-bacia do rio Pará

Ponto	Descrição	UPGRH	Coordenadas		Altitude
PA001	Rio PARÁ entre as cidades de Passa-Tempo e Desterro de Entre Rios	SF2	20°37'56"	44°25'52"	840
PA002	Ribeirão PAIOL a jusante de Carmópolis de Minas	SF2	20°31'3"	44°37'9"	753
PA003	Rio PARÁ na localidade de Pará dos Vilelas, a jusante da foz do ribeirão Campo Grande	SF2	20°24'24"	44°37'30"	700
PA004	Rio ITAPECERICA a montante da cidade de Divinópolis	SF2	20°13'3"	44°54'59"	746
PA005	Rio PARÁ a montante da foz do Rio Itapecerica, próximo da UHE de Gafanhoto	SF2	20°6'25"	44°50'29"	680
PA007	Rio ITAPECERICA a jusante da cidade de Divinópolis	SF2	20°7'16"	44°52'46"	680
PA009	Rio SÃO JOÃO a jusante da cidade de Itaúna	SF2	20°3'37"	44°36'25"	840
PA010	Ribeirão PACIÊNCIA a jusante de Pará de Minas	SF2	19°47'20"	44°42'26"	727
PA011	Rio SÃO JOÃO na localidade de Vargem do Santiago, próximo de sua foz no Rio Pará	SF2	19°43'25"	44°51'27"	650
PA013	Rio PARÁ na localidade de Velho da Taipa, próximo ao município de Pitangui	SF2	19°41'40"	44°55'47"	650
PA015	Rio LAMBARI próximo de sua foz no Rio Pará	SF2	19°31'47"	45°1'19"	650
PA017	Rio PICÃO próximo de sua foz no Rio Pará	SF2	19°17'51"	45°8'48"	650
PA019	Rio PARÁ a montante de sua foz no Rio São Francisco	SF2	19°15'24"	45°7'20"	600
PA020	Ribeirão FARTURA ou GAMA a jusante da cidade de Nova Serrana (próximo de sua foz no rio Pará)	SF2	19°52'45"	44°55'52"	680
PA021	Rio do PICÃO a jusante da cidade de Bom Despacho	SF2	19°35'17"	45°17'58"	612
PA022	Ribeirão DIAMANTE próximo de sua foz no Rio Lambari.	SF2	20°2'50"	45°12'9"	802
*PA024	Ribeirão Passa Tempo na cidade de Passa Tempo	SF2	20°37'55"	44°30'4"	933
*PA026	Rio do Peixe a montante do município de Piracema	SF2	20°30'58"	44°28'16"	792
*PA028	Rio Pará à montante da cidade de Carmo do Cajuru	SF2	20°10'50"	44°47'38"	625
*PA032	Ribeirão Boa Vista a jusante do município de Carmo da Mata	SF2	20°27'20"	44°53'31"	780
*PA030	Rio Itapecerica a jusante da cidade de Itapecerica	SF2	20°23'22"	44°47'09"	476
*PA034	Córrego do Pinto ou Córrego Buriti a jusante do município de São Gonçalo do Pará	SF2	19°58'5"	44°52'12"	736
*PA036	Rio São João na localidade de São João	SF2	20°14'22"	44°30'42"	714
*PA040	Rio Lambari na MG 050 no município de Pedra do Indaiá	SF2	20°16'58"	45°8'52"	985
*PA042	Rio do Peixe na localidade de Rio do Peixe	SF2	19°33'46"	44°50'38"	712
*PA044	Córrego Salobro a jusante do município de Pompéu	SF2	19°17'44"	45°1'27"	593

*Pontos novos implantados em 2007.

Qualidade das Águas Superficiais

Os Mapas 9.3 a 9.6 apresentam a distribuição espacial das estações de amostragem monitoradas na sub-bacia do rio Pará, a Contaminação por Tóxicos – CT e o Índice de Qualidade das Águas - IQA para cada trimestre de 2007. Ressalta-se que qualidade das águas das estações de monitoramento implantadas nesse ano pode ser visualizada no Mapa 9.6. O Mapa 9.7 mostra a CT e a média anual do IQA em 2007.

45°40'0"W

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W

19°00'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

21°0'0"S

19°00'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S


20°40'0"S

21°0'0"S



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - UPGRH SF2 SUB-BACIA DO RIO PARÁ QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2007



Legenda

- Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS



- Baixa
- Média
- Alta

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25

UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Rio Pará



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69
Fonte: -Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2007 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas

45°40'0"W

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W

2007010028 - A4 - 1T

Mapa 9.3: Qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Pará no primeiro trimestre de 2007 - UPGRH SF2.

45°40'0"W

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W

19°00'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

21°0'0"S

19°00'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S


20°40'0"S

21°0'0"S



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - UPRGH SF2 SUB-BACIA DO RIO PARÁ QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007



Legenda

- Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS



- Baixa
- Média
- Alta

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25

UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Rio Pará



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69
Fonte: -Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2007 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas

45°40'0"W

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W

2007010028 - A4 - 2T

Mapa 9.4: Qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Pará no segundo trimestre de 2007 - UPRGH SF2.

45°40'0"W

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W

19°00'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

21°0'0"S

19°00'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

21°0'0"S




Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - UPRGH SF2

SUB-BACIA DO RIO PARÁ

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - TERCEIRO TRIMESTRE DE 2007



Legenda

- Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS



- Baixa
- Média
- Alta

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25

UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Rio Pará



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69
Fonte: -Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2007 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas

45°40'0"W

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W

2007010028 - A4 - 3T

Mapa 9.5: Qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Pará no terceiro trimestre de 2007- UPRGH SF2.

45°40'0"W

45°20'0"W

45°0'0"W

44°40'0"W

44°20'0"W

19°00'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S

21°0'0"S

19°00'0"S

19°20'0"S

19°40'0"S

20°0'0"S

20°20'0"S

20°40'0"S




21°0'0"S

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - UPGRH SF2 SUB-BACIA DO RIO PARÁ

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - QUARTO TRIMESTRE DE 2007



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas




Projeção: Latitude/Longitude
 Datum SAD69
 Fonte: -Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
 Dados de qualidade das águas: 2007 - IGAM - CETEC
 Execução: Projeto Águas de Minas

Mapa 9.6: Qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Pará no quarto trimestre de 2007 - UPGRH SF2.

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - UPGRH SF2

SUB-BACIA DO RIO PARÁ

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - 2007



Legenda

- Sede Municipal

CONTAMINAÇÃO POR TÓXICOS



- Baixa
- Média
- Alta
- Coleta Não Realizada

ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

- Sem Estação de Amostragem
- Excelente 90 < IQA ≤ 100
- Bom 70 < IQA ≤ 90
- Médio 50 < IQA ≤ 70
- Ruim 25 < IQA ≤ 50
- Muito Ruim 00 < IQA ≤ 25

UNIDADES DE PLANEJAMENTO

- Rio Pará



Projeção: Latitude/Longitude
Datum SAD69
Fonte: -Base Digital GeoMINAS / Prodemge, 1996
Dados de qualidade das águas: 2007 - IGAM - CETEC
Execução: Projeto Águas de Minas

Mapa 9.7: Qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Pará em 2007 – UPGRH SF2.

10. CONSIDERAÇÕES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE 2007

10.1 Rio Pará e seus afluentes

A evolução temporal da média anual do IQA na sub-bacia do rio Pará, no período de 1997 a 2007 (Figura 10.1), mostra a predominância de águas com condição de qualidade Média. Nota-se que a melhor e a pior condição em termos de valores de IQA foram identificadas nos anos de 2004 (68,82) e 2005 (61,02), respectivamente.




Figura 10.1: Evolução temporal da média anual do IQA na sub-bacia do Rio Pará.

10.1.1 Rio Pará

UPGRH: SF2

Estações de Amostragem: PA001, PA003, PA005, PA013, PA019 e PA028

A média anual do Índice de Qualidade das Águas – IQA em 2007 apresentou-se no nível Médio em 80% dos pontos monitorados ao longo do rio Pará. Na estação localizada entre as cidades de Passa-Tempo e Desterro de Entre Rios (PA001), bem como na localidade de Pará dos Vilelas a jusante da foz do ribeirão Campo Grande (PA003), a média anual do IQA manteve-se na faixa Média, como no ano anterior. Os parâmetros que mais influenciaram nesse resultado foram coliformes termotolerantes e turbidez. No entanto, os trechos do rio Pará situados a montante da foz do rio Itapecerica, próximo da UHE de Gafanhoto (PA005) e na localidade de Velho da Taipa próximo ao município de Pitangui (PA013) mostraram piora do IQA, passando de Bom para Médio em 2007, influenciado pelos valores de coliformes termotolerantes. O rio Pará a montante de sua foz no rio São Francisco (PA019), obteve melhora no IQA passando de Médio para Bom em 2007.

As contagens de coliformes termotolerantes excederam o limite legal nos trechos do rio Pará localizados entre as cidades de Passa-Tempo e Desterro de Entre Rios (PA001), na localidade de Pará dos Vilelas a jusante da foz do ribeirão Campo Grande (PA003) e a montante da foz do rio Itapecerica, próximo da UHE de Gafanhoto (PA005) nas quatro campanhas de monitoramento realizadas em 2007 (Figura 10.2), evidenciando o lançamento de esgotos dos municípios de Pitangui, Passa Tempo e Desterro de Entre Rios.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Na estação de monitoramento localizada no rio Pará na localidade de Velho da Taipa próximo ao município de Pitangui (PA013), os valores de coliformes termotolerantes estiveram acima limite preconizado na Resolução CONAMA nº 357/05 na primeira e quarta campanhas desse ano, período chuvoso, devido a poluição por carga difusa na região que apresenta atividades de pecuária.




Figura 10.2: Ocorrência de coliformes termotolerantes ao longo do rio Pará, no ano de 2007.

O parâmetro turbidez violou o limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 nas estações de amostragem localizadas no rio Pará entre as cidades de Passa-Tempo e Desterro de Entre Rios (PA001) e na localidade de Pará dos Vilelas a jusante da foz do ribeirão Campo Grande (PA003) na primeira e quarta campanhas de 2007 e a montante da foz do rio Itapecerica, próximo da UHE de Gafanhoto (PA005), na primeira campanha, como mostra a Figura 10.3. Esse fato está relacionado ao período das chuvas que gera aumento da poluição por carga difusa.




Figura 10.3: Ocorrência de turbidez ao longo do rio Pará, no ano de 2007.

O parâmetro cor verdadeira excedeu o limite legal no rio Pará na localidade de Velho da Taipa próximo ao município de Pitangui (PA013) e a montante de sua foz no rio São Francisco (PA019), na primeira campanha de 2007. Esse fato está relacionado à poluição por carga difusa que ocorre no período das chuvas (Figura 10.4).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.4 : Ocorrência de cor verdadeira no rio Pará na localidade de Velho da Taipa próximo ao município de Pitangui (PA013) e a montante de sua foz no rio São Francisco (PA019), no período de 1997 a 2007.

As concentrações de ferro dissolvido mostraram-se em desacordo com o limite legal em 2007, nas estações de amostragem situadas no rio Pará entre as cidades de Passa-Tempo e Desterro de Entre Rios (PA001) e a montante de sua foz no rio São Francisco (PA019) na primeira e quarta campanhas. No trecho do rio Pará na localidade de Velho da Taipa próximo ao município de Pitangui (PA013) a ocorrência desse metal em teores acima do limite de Classe estabelecido na legislação foi observada na primeira e segunda campanhas, enquanto no trecho situado na localidade de Pará dos Vilelas a jusante da foz do ribeirão Campo Grande (PA003) e a montante da foz do rio Itapecerica, próximo da UHE de Gafanhoto (PA005) a violação do limite legal ocorreu na primeira, segunda e quarta campanhas (Figura 10.5). Esses resultados estão associados às atividades minerárias de extração de areia desenvolvidas na região. As atividades agropecuárias desenvolvidas na região também evidenciam o mau uso do solo.




Figura 10.5: Ocorrência de ferro dissolvido ao longo do rio Pará, no ano de 2007.

No trecho do rio Pará localizado a montante da confluência com o rio Itapecerica (PA005) os teores de clorofila-a mostraram-se mais elevados que o limite estabelecido para águas de Classe 1 na primeira e segunda campanhas de amostragem. O limite legal também foi ultrapassado nas estações do rio Pará localizadas a montante da foz do rio Itapecerica, próximo da UHE de Gafanhoto (PA005) na primeira e segunda campanhas de 2007 e na

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

localidade de Pará dos Vilelas a jusante da foz do ribeirão Campo Grande (PA003) na quarta campanha conforme Figura 10.6.




Figura 10.6: Ocorrência de clorofila-a ao longo do rio Pará, no ano de 2007.

A Contaminação por Tóxicos (CT) apresentou-se Média no rio Pará a montante de sua foz no rio São Francisco (PA019) em função da conformidade dos parâmetros tóxicos em relação aos limites legais para chumbo total e fenóis totais na segunda campanha de 2007, conforme figura 10.7.




Figura 10.7: Ocorrência de chumbo total e fenóis totais na estação de amostragem no rio Pará a montante de sua foz no rio São Francisco (PA019), no período de amostragem.

10.1.2 Ribeirão Passa Tempo

UPGRH: SF2

Estação de Amostragem: PA024

A estação de monitoramento localizada no ribeirão Passa Tempo na cidade de Passa Tempo (PA024) foi implantada em 2007 e a primeira coleta de amostras de água foi realizada em novembro (quarta campanha anual).

O Índice de Qualidade das Águas – IQA, calculado para o quarto trimestre de 2007, apresentou-se no nível Médio, influenciado pelos parâmetros coliformes termotolerantes e ferro dissolvido. A concentração de coliformes termotolerantes excedeu o limite estabelecido



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

na Resolução CONAMA 357/05 em função de do lançamento de esgotos domésticos de Passa Tempo.

O parâmetro ferro dissolvido também ultrapassou o limite legal para Classe 2, devido ao mau uso do solo por atividades agrícolas desenvolvidas na região.

A Contaminação por Tóxicos (CT) apresentou-se Baixa em função da conformidade dos parâmetros tóxicos em relação aos limites legais.

10.1.3 Rio do Peixe

UPGRH: SF2

Estação de Amostragem: PA026

A estação de monitoramento situada no rio do Peixe a montante do município de Piracema (PA026) foi implantada em 2007, e a primeira campanha de amostragem foi realizada no último trimestre desse mesmo ano (quarta campanha anual).

Esse trecho do rio do Peixe apresentou Índice de Qualidade das Águas – IQA Médio no quarto trimestre de 2007. O parâmetro que mais influenciou o resultado do IQA foi a contagem de coliformes termotolerantes que ultrapassou o limite legal para Classe 2. Esse resultado se deve à pecuária desenvolvida na região e ao lançamento de esgoto doméstico da cidade de Piracema.

A Contaminação por Tóxicos (CT) foi considerada Baixa nessa estação de amostragem, uma vez que não foi observada a presença de substâncias tóxicas em concentrações superiores a 20% do limite previsto na Resolução CONAMA nº 357/05.

10.1.4 Ribeirão Paiol

UPGRH: SF2

Estação de Amostragem: PA002

As águas do ribeirão Paiol, monitoradas a jusante da cidade de Carmópolis de Minas (PA002), apresentaram Índice de Qualidade das Águas – IQA Médio em 2007. O parâmetro oxigênio dissolvido foi o que mais influenciou no resultado da média anual do IQA.

A Figura 10.8 apresenta as concentrações de oxigênio dissolvido ao longo da série de monitoramento. Observa-se que esse parâmetro violou o limite estabelecido na legislação para Classe 2 na quarta campanha de 2007. O fato se deve ao lançamento de esgotos doméstico de Carmópolis de Minas.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.8: Ocorrência de oxigênio dissolvido na estação de amostragem no ribeirão Paiol a jusante da cidade de Carmópolis de Minas (PA002), no período de 2000 a 2007.

Os teores de manganês total, ferro dissolvido e cor verdadeira também excederam o limite legal da Classe de enquadramento na primeira, segunda e quarta campanhas de 2007, evidenciando o mau uso do solo, com conseqüente poluição difusa por atividades da agroindústria, na sub-bacia do ribeirão Paiol (Figura 10.9).




Figura 10.9: Ocorrência de manganês total, ferro dissolvido e cor verdadeira na estação de amostragem no ribeirão Paiol a jusante da cidade de Carmópolis de Minas (PA002), no período de 2000 a 2007.

O ribeirão Paiol apresentou Contaminação por Tóxicos Baixa, devido à conformidade dos parâmetros tóxicos em relação aos limites legais.

10.1.5 Rio Itapecerica

UPGRH:SF2

Estações de amostragem: PA004, PA007 e PA030

O Índice de Qualidade das Águas – IQA no rio Itapecerica na estação monitorada a montante da cidade de Divinópolis (PA004) e a jusante da cidade de Divinópolis (PA007), apresentou-se Médio em 2007, assim como no ano anterior. Influenciaram o resultado do IQA principalmente os parâmetros coliformes termotolerantes, turbidez e fósforo total.

Os resultados de coliformes termotolerantes no rio Itapecerica a montante da cidade de Divinópolis (PA004) apresentaram-se em desconformidade com o padrão de qualidade para Classe 1, na primeira, terceira e quarta campanhas (Figura 10.10) devido às atividades agropecuárias desenvolvidas na região. No trecho do rio Itapecerica a jusante de Divinópolis (PA007) os valores de coliformes termotolerantes violaram o limite legal em todas as campanhas de 2007 e a concentração de fósforo total excedeu o limite previsto na legislação na quarta campanha desse ano (Figura 10.11).

Esse quadro reflete, principalmente, o lançamento de esgotos sanitários sem tratamento no rio Itapecerica, pelo município de Divinópolis.




Figura 10.10: Ocorrência de coliformes termotolerantes no rio Itapecerica a montante de Divinópolis (PA004), no período de 2000 a 2007.




Figura 10.11: Ocorrência de fósforo total e coliformes termotolerantes no rio Itapecerica a jusante da cidade de Divinópolis (PA007), no período de 1997 a 2007.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

O parâmetro turbidez ultrapassou o limite legal na primeira campanha de monitoramento de 2007, no rio Itapecerica a montante da cidade de Divinópolis (PA004) refletindo a contribuição de poluentes de origem difusa na degradação da qualidade das águas desse rio, que são disponibilizados através das atividades agropecuárias desenvolvidas na região (Figura 10.12).




Figura 10.12: Ocorrência de turbidez no rio Itapecerica a montante de Divinópolis (PA004), no período de 2000 a 2007.

Quanto ao manganês total, foi observada concentração superior ao padrão de qualidade para Classe 1 no trecho do rio Itapecerica a montante da cidade de Divinópolis (PA004), na primeira campanha de 2007, fato que vem sendo observado ao longo da série histórica do monitoramento. Esse resultado pode estar relacionado ao mau uso do solo em função das atividades agropecuárias desenvolvidas de modo insustentável e ao lançamento de efluentes industriais de siderúrgicas presentes na região. No período chuvoso ocorre o carreamento de partículas de solo para o corpo de água e o aumento da vazão proporciona o revolvimento dos sedimentos de fundo depositados ao longo dos anos, disponibilizando esse metal (Figura 10.13).




Figura 10.13: Ocorrência de manganês total no rio Itapecerica a montante da cidade de Divinópolis (PA004), no período de 2000 a 2007.

O parâmetro cor verdadeira ultrapassou o limite para Classe 3 no rio Itapecerica a jusante da cidade de Divinópolis (PA007) na primeira campanha de 2007, demonstrando a contribuição da poluição de origem difusa para a degradação da qualidade desse corpo de água (Figura 10.14).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.14: Ocorrência de cor verdadeira no rio Itapecerica a jusante da cidade de Divinópolis (PA007), no período de 2000 a 2007.

A Contaminação por Tóxicos (CT) melhorou em relação ao ano anterior, quando havia sido considerada Média, no trecho do rio Itapecerica a montante de Divinópolis (PA004), passando para CT Baixa em 2007. A CT manteve-se Baixa na estação localizada no rio Itapecerica a jusante da cidade de Divinópolis (PA007) como em 2006.

A estação de monitoramento localizada no rio Itapecerica a jusante da cidade de Itapecerica (PA030) foi implantada em 2007. Entretanto, devido às dificuldades de acesso, não houve qualquer campanha de amostragem. Desse modo, essa estação será desativada e substituída no próximo ano.

10.1.6 Ribeirão Boa Vista

UPGRH:SF2

Estação de Amostragem: PA032

A estação de amostragem no ribeirão Boa Vista a jusante do município de Carmo da Mata (PA032) foi implantada em 2007 e a campanha de amostragem foi realizada no último trimestre de 2007, no mês de novembro.

O Índice de Qualidade das Águas – IQA nessa campanha apresentou-se na faixa Média, resultado influenciado pelos parâmetros coliformes termotolerantes, fósforo total e turbidez. Esse resultado se deve ao lançamento de esgotos sem tratamento nos corpos de água da região.

Em função da conformidade em relação aos limites legais dos parâmetros tóxicos a Contaminação por Tóxicos (CT) obtida no quarto trimestre foi Baixa no do ribeirão Boa Vista.

10.1.7 Córrego do Pinto ou Buriti

UPGRH: SF2

Estação de Amostragem: PA034

A estação de monitoramento no Córrego do Pinto ou Buriti a jusante do município de São Gonçalo do Pará (PA034) foi implantada em 2007 apresentando coleta apenas na última campanha anual.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Na campanha realizada em novembro de 2007, o Índice de Qualidade das Águas – IQA apresentou-se no nível Muito Ruim, em função principalmente dos resultados de coliformes termotolerantes, fósforo total, OD e DBO. Os valores verificados para esses parâmetros estão associados aos lançamentos de esgotos sanitários sem tratamento nos corpos de água e aos curtumes e tinturarias instalados nessa região.

Ocorreram também violações dos parâmetros cor verdadeira e ferro dissolvido, ambos influenciados pelo mau uso do solo decorrente da atividade agropecuária local.

A Contaminação por Tóxicos (CT) foi Alta em função das violações dos parâmetros cianeto livre e fenóis totais. O parâmetro nitrogênio amoniacal também apresentou violação do limite legal. Essas ocorrências podem estar associadas à existência de curtumes e tinturarias na região.

10.1.8 Ribeirão da Fartura ou Gama

UPGRH:SF2

Estação de amostragem: PA020

O ribeirão da Fartura ou Gama, monitorado na estação localizada a montante de sua foz no rio Pará, município de Nova Serrana (PA020), apresentou Índice de Qualidade das Águas – IQA na faixa Muito Ruim em 2007. Os parâmetros que mais influenciaram nos resultados de IQA foram coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido, DBO, fósforo total e turbidez.

Os parâmetros oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio e fósforo total (Figura 10.15) mostraram-se acima do limite legal da Classe 2 de enquadramento dos corpos de água. Esses resultados se devem ao lançamentos de esgotos domésticos e industriais.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.15: Ocorrência de coliformes termotolerantes, OD, fósforo total e DBO no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará, município de Nova Serrana (PA020) no período de 2005 a 2007.

A presença de substâncias tensoativas acima do limite legal foi observada no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará, município de Nova Serrana (PA020), evidenciando a contribuição de esgotos domésticos e industriais para degradação das águas desse corpo hídrico (Figura 10.16).




Figura 10.16: Ocorrência de substâncias tensoativas no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará, município de Nova Serrana (PA020) no período de 2005 a 2007.

Os valores de cor verdadeira violaram o limite para Classe 2 na primeira e na terceira campanhas e a turbidez na primeira campanha de 2007 (Figura 10.17), devido à agricultura e mineração desenvolvidas nessa região.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.17: Ocorrência de turbidez e cor verdadeira no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará no município de Nova Serrana (PA020), no período de 2005 a 2007.

Os teores de manganês total apresentaram-se em desconformidade com o limite legal para águas de Classe 2 na primeira e terceira campanhas de monitoramento de 2007. As concentrações de ferro dissolvido estiveram acima do limite da legislação, na segunda, terceira e quarta campanhas. A ocorrência desses metais, associada aos altos valores de turbidez em períodos de chuvas, reflete o uso inadequado do solo na região das nascentes do rio Pará, especialmente devido à agricultura e mineração, indicando contribuição de poluição de origem difusa. (Figura 10.18).




Figura 10.18: Ocorrência de ferro dissolvido e manganês total no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará no município de Nova Serrana (PA020), no período de monitoramento.

A Contaminação por Tóxicos (CT) apresentou-se Alta no ribeirão Fartura na localidade de Nova Serrana (PA020) em função dos valores de nitrogênio amoniacal e fenóis totais observados na segunda, terceira e quarta campanhas e do chumbo total na terceira campanha, violando os limites para Classe 2 em 2007 (Figura 10.19). O crescimento desordenado de Nova Serrana com o lançamento dos esgotos sanitários sem tratamento nos corpos de água e das várias indústrias de calçados é responsável pela ocorrência dessas substâncias tóxicas.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.19: Ocorrência de nitrogênio amoniacoal, fenóis totais e chumbo total no ribeirão da Fartura a montante de sua foz no rio Pará no município de Nova Serrana (PA020), no período de 2005 a 2007.

10.1.9 Rio São João e seu afluente

10.1.9.1 Rio São João

UPGRH: SF2

Estações de amostragem: PA009, PA011 e PA036

O Índice de Qualidade das Águas – IQA do rio São João, monitorado a jusante da cidade de Itaúna (PA009) e na localidade de Vargem do Santiago próximo de sua foz no rio Pará (PA011), permaneceram no nível Ruim e Médio, respectivamente, em 2007, assim como em 2006. Os parâmetros coliformes termotolerantes, fósforo total e DBO foram os que mais influenciaram nos resultados do IQA.

Em 2007 foram detectados valores em desacordo com os limites legais da classe de enquadramento para os parâmetros sanitários nas duas estações de amostragem. Os valores de coliformes termotolerantes, fósforo total e DBO violaram os limites legais no rio São João a jusante da cidade de Itaúna (PA009) em todas as campanhas de 2007. No rio São João na localidade de Vargem do Santiago (PA011), as contagens de coliformes termotolerantes violaram os limites legais na primeira e segunda campanhas de 2007 e o fósforo total na terceira e quarta campanhas.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

As principais causas dessas ocorrências são os lançamentos dos esgotos domésticos, bem como o desenvolvimento de pecuária nos municípios de Itaúna e Pará de Minas (Figura 10.20).




Figura 10.20: Ocorrência de coliformes termotolerantes , fósforo total e DBO no rio São João a jusante do município de Itaúna (PA009) e próximo á sua foz no rio Pará (PA011), no período de 1997 a 2007.

Na primeira campanha do ano de 2007, foram detectados óleos e graxas e na segunda campanha substâncias tensoativas no rio São João a jusante do município de Itaúna (PA009). Os esgotos de indústrias alimentícias contribuem para a degradação da qualidade desse corpo de água. (Figura 10.21).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.21: Alterações em substâncias tensoativas e óleos e no rio São João a jusante do município de Itaúna (PA009), no período de 1997 a 2007.

Os valores de ferro dissolvido apresentaram desconformidade com o limite legal na primeira e segunda campanhas de 2007 na localidade de Vargem do Santiago próximo de sua foz no rio Pará (PA011). Esse resultado indica o uso inadequado dos solos, uma vez que o ferro é um constituinte natural do solo e sua disponibilização é facilitada pelo carreamento de materiais oriundos da bacia de drenagem (Figura 10.22).




Figura 10.22: Ocorrência de ferro dissolvido no rio São João próximo à sua foz no rio Pará (PA011), no período de 1997 a 2007.

A cor verdadeira apresentou desconformidade para Classe 3 no rio São João a jusante do município de Itaúna (PA009), na primeira e terceira campanhas de 2007 e na localidade de Vargem do Santiago próximo de sua foz no rio Pará (PA011) na primeira campanha. Esse fato pode estar relacionado ao período das chuvas e à poluição difusa citada anteriormente (Figura 10.23).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.23: Ocorrência de cor verdadeira no rio São João a jusante do município de Itaúna (PA009) e próximo à sua foz no rio Pará (PA011), no período de 1997 a 2007.

Nas duas últimas campanhas de 2007, os teores de clorofila-a mostraram-se bastante elevados no trecho do rio São João a montante de sua confluência como o rio Pará (PA011) (Figura 10.24). Esses valores estão relacionados ao aumento da densidade do fitoplâncton observada nesse corpo de água, que apresentou uma floração de cianobactérias durante as amostragens realizadas em novembro.




Figura 10.24: Ocorrência de clorofila-a no rio São João próximo à sua foz no rio Pará (PA011), no período de monitoramento.

A Contaminação por Tóxicos apresentou-se Média devido à conformidade dos parâmetros tóxicos em relação aos limites expressos na Resolução CONAMA nº 357/05 para fenóis totais na estação de amostragem localizadas no rio São João a jusante da cidade de Itaúna (PA009) e Baixa próximo da sua foz no rio Pará (PA011). Figura 10.25

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.25: Ocorrência de fenóis totais no rio São João a jusante do município de Itaúna (PA009), no período de 1997 a 2007.

A estação de monitoramento localizada no rio São João na localidade de São João (PA036) foi implantada em 2007. Houve uma campanha em dezembro desse mesmo ano.

Nessa estação, o Índice de Qualidade das Águas – IQA apresentou-se no nível Médio e os parâmetros que mais influenciaram nesse resultado foram coliformes termotolerantes e fósforo total.

As concentrações de coliformes termotolerantes e fósforo total excederam o limite legal para corpos de água Classe 1, devido ao lançamento de esgotos da localidade de São João e às atividades pecuárias desenvolvidas na região.

O parâmetro ferro dissolvido também ultrapassou o limite legal, evidenciando a contribuição da poluição por carga difusa para a degradação da qualidade das águas desse corpo hídrico.

A Contaminação por Tóxicos (CT) mostrou-se Baixa, devido à conformidade dos parâmetros tóxicos em relação aos limites expressos na Resolução CONAMA nº 357/05.

10.1.9.2 Ribeirão Paciência

UPGRH: SF2

Estação de Amostragem: PA010

O ribeirão Paciência, a jusante de Pará de Minas (PA010), apresentou o Índice de Qualidade das Águas – IQA Ruim em 2007, assim como em 2006. Os parâmetros que mais contribuíram para essa condição vêm sendo os mesmos observados desde 2001 – coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido, fósforo total e demanda bioquímica de oxigênio.

Os resultados de coliformes termotolerantes e de fósforo total apresentaram-se fora dos padrões legais da Classe 3 em três das quatro campanhas anuais (Figura 10.26). Os valores de oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio violaram o limite legal na terceira campanha de 2007. Destaca-se que o ribeirão Paciência vem sofrendo forte influência dos lançamentos de esgotos domésticos brutos da cidade de Pará de Minas, bem como de efluentes de atividades industriais e da pecuária desenvolvida na região.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.26: Ocorrência de coliformes termotolerantes e fósforo total no ribeirão Paciência a jusante de Pará de Minas (PA010), no período de 2000 a 2007.

Nesse mesmo ano, o parâmetro cor verdadeira ultrapassou o limite legal na primeira e terceira campanhas (Figura 10.27). Possivelmente essas violações são em decorrência dos despejos domésticos da cidade de Pará de Minas e das atividades industriais e pecuária presentes na região.




Figura 10.27: Alterações em DBO, oxigênio dissolvido e cor verdadeira no ribeirão Paciência a jusante de Pará de Minas (PA010), no período de 2000 a 2007.

A Contaminação por Tóxicos apresentou-se Baixa em 2007, devido à conformidade dos parâmetros tóxicos em relação aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05.

10.1.10 Rio Lambari e seu afluente

10.1.10.1 Rio Lambari

UPGRH: SF2

Estações de Amostragem: PA015 e PA040

O Índice de Qualidade das Águas – IQA do rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará (PA015), permaneceu no nível Médio em 2007, em função, principalmente, dos resultados de coliformes termotolerantes e de turbidez.

As contagens de coliformes termotolerantes violaram o limite para Classe 1 na primeira e quarta campanhas de 2007 e os valores de turbidez na primeira campanha (Figura 10.28). Esses resultados podem estar relacionados às atividades agropecuárias desenvolvidas na região.




Figura 10.28: Ocorrência de turbidez e coliformes termotolerantes no rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará (PA015), no período de 2000 a 2007.

Foi observado no rio Lambari valor superior ao padrão de Classe 1, para o resultado de ferro dissolvido, na quarta campanha de 2007 (Figura 10.29). Esse fato está associado ao mau uso do solo decorrente das atividades de pecuária e extração de argila, que no período chuvoso aumentam a poluição de origem difusa.




Figura 10.29: Ocorrência de ferro dissolvido no rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará (PA015), no período de 1997 a 2007.

O parâmetro clorofila-a foi violado na quarta campanha de 2007, na estação localizada no rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará (PA015) (Figura 10.30). A tendência ao aumento da concentração de clorofila-a neste ponto sugere uma eutrofização gerada no período chuvoso pelo carreamento de matéria orgânica para o curso d'água.




Figura 10.30: Ocorrência de clorofila-a no rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará (PA015), no período de monitoramento.

A Contaminação por Tóxicos, no rio Lambari, foi Baixa rio Lambari próximo de sua foz no rio Pará (PA015) em 2007, fato esse devido à conformidade em relação aos limites legais de todos os parâmetros tóxicos monitorados nesse corpo de água.

A estação de monitoramento localizada no rio Lambari no município de Pedra do Indaiá (PA040) foi implantada em 2007.

Na campanha realizada em novembro de 2007, verificou-se nessa estação de amostragem o Índice de Qualidade das Águas Médio. O parâmetro coliformes termotolerantes foi o que mais influenciou o resultado do IQA. A violação na contagem de coliformes termotolerantes se deve ao lançamento de esgotos sanitários do município de Pedra do Indaiá.

O parâmetro do ferro dissolvido também excedeu o limite legal, devido ao mau uso do solo.

Foi observado ainda, concentração de clorofila-a acima do limite previsto na Resolução CONAMA 357/05. O fato se deve a descarga de matéria orgânica levando a eutrofização do curso d'água e conseqüente proliferação de algas.

A Contaminação por Tóxicos, no rio Lambari, foi Baixa rio Lambari no município de Pedra do Indaiá (PA040) em 2007, fato esse devido à conformidade em relação aos limites legais.

10.1.10.2 Ribeirão Diamante

UPGRH: SF2

Estação de Amostragem: PA022

O Índice de Qualidade das Águas – IQA do ribeirão Diamante, estação monitorada a jusante da cidade de Santo Antônio do Monte (PA022), apresentou-se no nível Médio em 2007. Os principais parâmetros que influenciaram o resultado do IQA foram coliformes termotolerantes e fósforo total.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

As concentrações de coliformes termotolerantes e fósforo total apresentaram desconformidade em relação ao limite legal na quarta campanha de 2007. O lançamento de esgotos domésticos sem tratamento nesse corpo de água é o responsável por essas violações (Figura 10.31).




Figura 10.31: Ocorrência de coliformes termotolerantes e fósforo total no ribeirão Diamante a jusante da cidade de Santo Antônio do Monte (PA022), no período de 2005 a 2007.

O parâmetro cor verdadeira ficou acima do limite legal na primeira campanha de 2007 (Figura 10.32). Essa ocorrência pode estar relacionada ao mau uso do solo decorrente das atividades agropecuárias.




Figura 10.32: Alterações de cor verdadeira no ribeirão Diamante a jusante da cidade de Santo Antônio do Monte (PA022), no período de 2005 a 2007.

O teor de ferro dissolvido apresentou-se desconforme em relação ao limite estabelecido na legislação na quarta campanha de 2007, devido ao mau uso do solo (Figura 10.33).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.33: Ocorrência de ferro dissolvido no ribeirão Diamante a jusante da cidade de Santo Antônio do Monte (PA022), no período de 2005 a 2007.

A Contaminação por Tóxicos apresentou-se Baixa no ribeirão Diamante a jusante da cidade de Santo Antônio do Monte (PA022) em 2007, em razão da conformidade dos parâmetros tóxicos monitorados nesse corpo de água em relação aos limites legais.

10.1.11 Rio do Peixe

UPGRH: SF2

Estação de Amostragem: PA042

A estação de monitoramento no rio do Peixe na localidade de rio do Peixe (PA042) foi implantada em novembro de 2007. Entretanto, não foi realizada campanha de amostragem nessa estação em 2007.

10.1.12 Córrego Salobro

UPGRH: SF2

Estação de Amostragem: PA044

A estação de monitoramento no Córrego Salobro a jusante do município de Pompéu (PA044) foi implantada em 2007.

Na campanha de monitoramento realizada no último trimestre de 2007 no mês de novembro, o Índice de Qualidade das Águas – IQA foi Bom. Não se observou violação do limite legal para águas de Classe 2 para qualquer parâmetro monitorado nesse corpo de água.

10.1.13 Rio do Picão

UPGRH: SF2

Estações de Amostragem: PA017 e PA021

O Índice de Qualidade das Águas – IQA do rio do Picão, próximo de sua foz no rio Pará (PA017) passou de Médio em 2006 para Bom em 2007. O ponto de amostragem a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021) permaneceu com IQA Médio em 2007. Os principais

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

parâmetros relacionados a essa condição foram os coliformes termotolerantes e fósforo total.

Para o ponto de amostragem situado no rio Picão próximo de sua foz no rio Pará (PA017) os valores de coliformes termotolerantes na segunda e quarta campanhas de 2007 e oxigênio dissolvido na quarta campanha não atenderam ao limite de Classe 1. Na estação localizada no rio Picão a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021) a contagem de coliformes termotolerantes violou os limites legais na quarta campanha e a concentração de fósforo total na terceira e quarta campanhas de 2007. Essa condição mostra a degradação da qualidade das águas do rio do Picão pela presença de atividades agropecuárias e laticínios na região (Figura 10.34).




Figura 10.34: Ocorrências de coliformes termotolerantes, OD no rio do Picão próximo de sua foz no rio Pará (PA017) e coliformes termotolerantes e fósforo total a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021), no período de monitoramento.

Na estação de monitoramento localizada no rio do Picão próximo de sua foz no rio Pará (PA017), as concentrações de ferro dissolvido e o manganês total violaram o limite legal na primeira e quarta campanhas de 2007. Na estação situada a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021), a concentração de ferro dissolvido ultrapassou o limite legal na primeira e quarta campanhas e a de manganês na primeira campanha de 2007, como mostra a Figura 10.35. Essas ocorrências se devem às atividades agrícolas e mau uso do solo na região.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.35: Ocorrência de manganês total e ferro dissolvido no rio Picão próximo de sua foz no rio Pará (PA017) e a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021), no período de monitoramento.

O parâmetro cor verdadeira ultrapassou o limite previsto na legislação para águas de Classe 1 na primeira campanha de 2007 na estação localizada no rio Picão a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021) (Figura 10.36). Atividades agrícolas associadas ao mau uso do solo influenciam no resultado desse parâmetro.




Figura 10.36: Ocorrência de cor verdadeira no rio Picão a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021), no período de monitoramento.

O rio Picão próximo a sua foz no rio Pará (PA017) apresentou um aumento da concentração de clorofila-a na última campanha de 2007, ultrapassando o limite estabelecido para águas de Classe 2, sugerindo processo de eutrofização nesse corpo de água (Figura 10.37).

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007




Figura 10.37: Ocorrência de clorofila-a no rio do Picão próximo de sua foz no rio Pará (PA017) no período de monitoramento.

A Contaminação por Tóxicos (CT) apresentou-se Baixa nas estações no rio Picão próximo de sua foz no rio Pará (PA017) e a jusante da cidade de Bom Despacho (PA021), uma vez que os parâmetros considerados tóxicos estiveram dentro do limite estabelecido na legislação para a Classe 1.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

11. AVALIAÇÃO AMBIENTAL

11.1. Análise das Violações

Considerando a série de dados compreendida entre 1997 e 2007, para as 26 estações de amostragem da sub-bacia do rio Pará, avaliaram-se os parâmetros monitorados com relação ao percentual de amostras cujos resultados das análises violaram em mais de 20% os limites legais. Vale destacar que, para os dados referentes ao período de 1997 a 2004 foi seguida a DN COPAM 10/86 e, para aqueles obtidos a partir de 2005, a CONAMA nº357/05, considerando o enquadramento do curso de água no local de cada estação. A Tabela 11.1 apresenta o percentual de violações em ordem decrescente do valor obtido para cada parâmetro, indicando os constituintes mais críticos da sub-bacia.

Pode-se observar que, de toda a série histórica, os parâmetros que apresentaram os maiores percentuais de violação estão associados aos despejos domésticos (fósforo total, coliformes, óleos e graxas e fenóis totais) e a fatores relacionados ao mau uso do solo (ferro dissolvido, cor verdadeira, turbidez e manganês total).

Observa-se na Tabela 11.1 que a contagem de coliformes termotolerantes e coliformes totais possuem os maiores percentuais de violações em relação ao seu limite legal em toda a bacia do rio Pará, com 60,2% e 56,4% das ocorrências, respectivamente. O desenvolvimento de atividades pecuárias e lançamentos de esgotos sanitários nos corpos de água, explica os elevados valores de coliformes termotolerantes encontrados em 21 dos 26 pontos de amostragem da bacia do rio Pará.

Em seguida o parâmetro fósforo total, apresenta 56,3% das ocorrências, e está associado principalmente aos esgotos sanitários que são lançados sem tratamento nos corpos de água da bacia do rio Pará e a atividades agropecuárias na região através da contribuição da carga difusa.

Os parâmetros ferro dissolvido, cor verdadeira, manganês total e turbidez apresentaram 35,5%, 26,4%, 18,3 e 18% de violações em relação ao limite legal. Esses resultados estão relacionados às atividades minerárias e agrícolas desenvolvidas na bacia.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 11.1: Classificação dos parâmetros monitorados em ordem decrescente segundo o percentual de violações de classe de enquadramento em toda a sub-bacia do rio Pará, no período de 1997 a 2007.

PARÂMETRO	Nº DE VIOLAÇÃO	Nº TOTAL DE COLETAS	% VIOLAÇÃO
Coliformes Termotolerantes	338	561	60,2%
Coliformes Totais**	208	369	56,4%
Fósforo Total	316	561	56,3%
Ferro Dissolvido	166	467	35,5%
Óleos e Graxas*	72	271	26,6%
Cor Verdadeira	97	368	26,4%
Fenóis Totais	132	561	23,5%
Manganês Total	61	333	18,3%
Turbidez	101	561	18,0%
Demanda Bioquímica de Oxigênio	65	559	11,6%
Clorofila a	7	80	8,8%
Cobre Total**	23	353	6,5%
Oxigênio Dissolvido	28	561	5,0%
Nitrogênio Amoniacal Total	27	561	4,8%
Cádmio Total	17	538	3,2%
Chumbo Total	12	554	2,2%
Níquel Total	11	555	2,0%
Cobre Dissolvido	3	158	1,9%
Mercúrio Total	7	413	1,7%
Zinco Total	8	538	1,5%
Substâncias Tensoativas	7	561	1,2%
Cianeto Livre	5	538	0,9%
Sulfeto	5	538	0,9%
Cromo VI**	1	365	0,3%
Amônia Não Ionizável**	1	369	0,3%
Alumínio Dissolvido	0	0	0,0%
Arsênio Total	0	270	0,0%
Bário Total	0	270	0,0%
Boro Total	0	32	0,0%
Cloreto Total	0	561	0,0%
Cromo Total	0	160	0,0%
Densidade de Cianobactérias	0	11	0,0%
Nitrato	0	561	0,0%
Nitrito	0	347	0,0%
pH	0	561	0,0%
Selênio Total	0	270	0,0%
Sólidos Dissolvidos Totais	0	471	0,0%
Sulfato Total	0	270	0,0%
Alumínio Total**	0	0	0,0%
Cromo III**	0	282	0,0%

* Considerou-se como violação as ocorrências maiores que 1mg/L.

** Dados correspondentes ao período de 1997 a 2004, limites estabelecidos pela Deliberação Normativa nº 10/86.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Em complementação foram identificadas as principais violações de parâmetros em relação aos limites legais nos pontos de monitoramento da sub-bacia do rio Pará. Os quadros a seguir mostram os principais fatores de PRESSÃO associados aos indicadores de degradação em 2007 e ainda os parâmetros que apresentaram as maiores violações no período de 1997 a 2007 para cada estação de amostragem, caracterizando o ESTADO da qualidade das águas. Os metais e outras substâncias tóxicas responsáveis por Contaminação por Tóxicos Alta em 2007 estão realçados em vermelho.

Foram implantados em 2007, mais 10 pontos de monitoramentos que tiveram apenas uma coleta na quarta campanha deste ano e assim não estão representados nas tabelas a seguir.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Corpo de água: Rio Pará

UPGRH: SF2

ESTAÇÃO	CLASSE	PRESSION	ESTADO	
		FATORES DE PRESSÃO	INDICADORES DE DEGRADAÇÃO EM 2007	INDICADORES COM MAIOR Nº DE VIOLAÇÕES NO PERÍODO DE 1997 A 2007
PA001	1	Carga difusa Agricultura Assoreamento Atividade Minerária Resíduos sólidos	Turbidez, coliformes termotolerantes e ferro dissolvido	Coliformes termotolerantes, coliformes totais, óleos e graxas, turbidez e cor verdadeira
PA003	1	Lançamento de esgoto sanitário Carga difusa Agricultura Atividade Minerária Erosão	Turbidez, coliformes termotolerantes, fósforo total, ferro dissolvido e manganês total	Coliformes termotolerantes, coliformes totais, cor verdadeira, fósforo total e turbidez
PA005	1	Lançamento de esgoto sanitário Carga difusa	Fósforo total, coliformes termotolerantes, turbidez, clorofila e ferro dissolvido	Coliformes totais, coliformes termotolerantes, fenóis totais, ferro dissolvido e cor verdadeira
PA013	2	Lançamento de esgoto sanitário Lançamento de efluente industrial Carga difusa Atividade Minerária Agropecuária	Fósforo total, cor verdadeira, coliformes termotolerantes e ferro dissolvido	Fósforo total, ferro dissolvido, fenóis totais coliformes termotolerantes e coliformes totais
PA019	2	Lançamento de esgoto sanitário Lançamento de efluente industrial Carga difusa Atividade Minerária Agropecuária Agricultura	Cor verdadeira, fenóis totais, chumbo total e ferro dissolvido	Fósforo total, fenóis totais, ferro dissolvido, cor verdadeira e coliformes termotolerantes



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Corpo de água: Ribeirão Paiol

UPGRH: SF2

Estação	Classe	PRESSÃO	ESTADO	
		Fatores de Pressão	Indicadores de Degradação em 2007	Indicadores com maior nº de violações no período de 1997 a 2007
PA002	2	Lançamento de esgoto sanitário Carga difusa Atividade Minerária Agricultura Agropecuária	OD, ferro dissolvido, manganês total, e cor verdadeira	Manganês total, ferro dissolvido, fósforo total, óleos e graxas, fenóis totais e cor verdadeira

Corpo de água: Rio Itapecerica

UPGRH: SF2

ESTAÇÃO	CLASSE	PRESSÃO	ESTADO	
		FATORES DE PRESSÃO	INDICADORES DE DEGRADAÇÃO EM 2007	INDICADORES COM MAIOR Nº DE VIOLAÇÕES NO PERÍODO DE 1997 A 2007
PA004	1	Lançamento de esgoto sanitário Lançamento de efluente industrial Carga difusa Agricultura Avicultura	Turbidez, coliformes termotolerantes e manganês total	Coliformes totais, coliformes termotolerantes, coliformes totais, cor verdadeira, fósforo total, manganês total e ferro dissolvido
PA007	3	Lançamento de esgoto sanitário Lançamento de efluente industrial Carga difusa Resíduo sólido urbano Expansão urbana	Cor verdadeira, fósforo total e coliformes termotolerantes	Coliformes totais, coliformes termotolerantes, fósforo total, e óleos e graxas



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Corpo de água: Rio São João

UPGRH: SF2

ESTAÇÃO	CLASSE	PRESSÃO	ESTADO	
		FATORES DE PRESSÃO	INDICADORES DE DEGRADAÇÃO EM 2007	INDICADORES COM MAIOR Nº DE VIOLAÇÕES NO PERÍODO DE 1997 A 2007
PA009	3	Lançamento de esgoto sanitário Lançamento de efluente industrial Carga difusa Suinocultura Resíduo sólido urbano Expansão urbana Atividades Minerárias	Fósforo total, DBO, óleos e graxas, coliformes termotolerantes e cor verdadeira	Fósforo total, coliformes totais, coliformes termotolerantes, Surfactante Aniônico, DBO, óleos e graxas, fenóis totais e cor verdadeira
PA011	2	Lançamento de esgoto sanitário Lançamento de efluente industrial Carga difusa Resíduos sólidos	Fósforo total, cor verdadeira, coliformes termotolerantes, clorofila a e ferro dissolvido	Fósforo total, ferro dissolvido, fenóis totais, coliformes termotolerantes, óleos e graxas e coliformes totais



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Corpo de água: Ribeirão Paciência

UPGRH: SF2

ESTAÇÃO	CLASSE	PRESSÃO	ESTADO	
		FATORES DE PRESSÃO	INDICADORES DE DEGRADAÇÃO EM 2007	INDICADORES COM MAIOR Nº DE VIOLAÇÕES NO PERÍODO DE 1997 A 2007
PA010	3	Lançamento de esgoto sanitário Lançamento de efluente industrial Expansão urbana Resíduos sólidos Agropecuária Suinocultura Avicultura	Turbidez, fósforo total, DBO, OD, cor verdadeira e coliformes termotolerantes	Fósforo total, coliformes termotolerantes, coliformes totais, Surfactante Aniônico, óleos e graxas, nitrogênio amoniacal e cor verdadeira

Corpo de água: Rio Lambari

UPGRH: SF2

ESTAÇÃO	CLASSE	PRESSÃO	ESTADO	
		FATORES DE PRESSÃO	INDICADORES DE DEGRADAÇÃO EM 2007	INDICADORES COM MAIOR Nº DE VIOLAÇÕES NO PERÍODO DE 1997 A 2006
PA015	1	Lançamento de esgoto sanitário Atividade Minerária Carga difusa Assoreamento Erosão Suinocultura Resíduos sólidos Agropecuária	Cor verdadeira, coliformes termotolerantes, clorofila a e ferro dissolvido	Fósforo total, coliformes totais, coliformes termotolerantes, cor verdadeira, óleos e graxas e ferro dissolvido



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Corpo de água: Rio Picão

UPGRH: SF2

ESTAÇÃO	CLASSE	PRESSÃO	ESTADO	
		FATORES DE PRESSÃO	INDICADORES DE DEGRADAÇÃO EM 2007	INDICADORES COM MAIOR Nº DE VIOLAÇÕES NO PERÍODO DE 1997 A 2007
PA017	1	Lançamento de esgoto sanitário Carga difusa Resíduo sólido Atividade mineraria Agropecuária	OD, coliformes termotolerantes, clorofila a, ferro dissolvido e manganês total	Coliformes termotolerantes, ferro dissolvido, coliformes totais, cor verdadeira, turbidez, fósforo total e clorofila a
PA021	2	Lançamento de esgoto sanitário Carga difusa Resíduo sólido Atividade mineraria Agropecuária	Cor verdadeira, coliformes termotolerantes, ferro dissolvido e manganês total	Coliformes termotolerantes, coliformes totais, cor verdadeira, óleos graxas e manganês total



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Corpo de água: Ribeirão da Fartura ou Gama

UPGRH: SF2

ESTAÇÃO	CLASSE	PRESSÃO	ESTADO	
		FATORES DE PRESSÃO	INDICADORES DE DEGRADAÇÃO EM 2007	INDICADORES COM MAIOR Nº DE VIOLAÇÕES NO PERÍODO DE 1997 A 2007
PA020	2	Lançamento de esgoto sanitário Carga difusa Resíduo sólido Atividade mineraria Agropecuária Assoreamento	Turbidez, cor verdadeira, fósforo total, OD, DBO, óleos e graxas, coliformes termotolerantes, fenóis totais , substâncias tensoativas, chumbo total , ferro dissolvido, manganês total e nitrogênio amoniacal	Coliformes termotolerantes, nitrogênio amoniacal, OD, DBO, ferro dissolvido, coliformes totais, Surfactante Aniônico, cor verdadeira, turbidez, óleos e graxas, manganês total e fósforo total

As substâncias responsáveis pela CT Alta estão destacadas em vermelho

Corpo de água: Ribeirão Diamante

UPGRH: SF2

ESTAÇÃO	CLASSE	PRESSÃO	ESTADO	
		FATORES DE PRESSÃO	INDICADORES DE DEGRADAÇÃO EM 2007	INDICADORES COM MAIOR Nº DE VIOLAÇÕES NO PERÍODO DE 1997 A 2007
PA022	2	Lançamento de esgoto sanitário Carga difusa Resíduo sólido Atividade mineraria Agropecuária	Cor verdadeira, fósforo total, coliformes termotolerantes, e ferro dissolvido	Coliformes termotolerantes, ferro dissolvido, coliformes totais, cor verdadeira, turbidez, chumbo e fósforo total



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

12. AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL – RESPOSTA

12.1. Contaminação por esgoto sanitário

Dos parâmetros que representam um indicativo de contaminação dos corpos de água por lançamento de esgoto sanitário, os que apresentaram maior número de violações no Estado de Minas Gerais, entre 1997 e 2007, foram fósforo total, coliformes termotolerantes e coliformes totais com, respectivamente, 57,9%, 51,5% e 46,7% de ocorrências acima dos limites legais, condição que vem sendo observada ao longo dos anos. Estes parâmetros representam um forte indicativo de contaminação dos corpos de água por lançamento de esgoto sanitário sem tratamento prévio, que é o fator de PRESSÃO mais comum sobre a qualidade das águas, conforme observado no item 11.1.

Portanto, foi feito um levantamento dos municípios da sub-bacia do rio Pará com população urbana superior a 30.000 habitantes, de acordo com o Censo 2000 do IBGE, os quais possuem estação de amostragem em trecho de corpo de água a montante e/ou a jusante de núcleos urbanos. Para cada estação avaliou-se a evolução do IQA – Índice de Qualidade das Águas ao longo dos anos (Tabela 12.1). O IQA é um bom indicador da contaminação por esgotos sanitários, pois é uma síntese da ocorrência de sólidos, nutrientes e principalmente matéria orgânica e fecal. Além disso, foram verificadas as ocorrências de desconformidades em relação aos parâmetros mais característicos dos esgotos sanitários, quais sejam, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio (matéria orgânica), bem como amônia não ionizável e nitrogênio amoniacal (nutrientes), os quais estão dispostos na Tabela 12.2.

Os municípios mais populosos da sub-bacia do rio Pará (Divinópolis, Itaúna, Pará de Minas, Bom Despacho e Nova Serrana) são os que mais contribuem com matéria orgânica e nutrientes para os corpos de água monitorados. Desse modo, verificou-se a prevalência do IQA Médio no rio Itapecerica devido à interferência do município de Divinópolis. O IQA Ruim, ao longo dos anos, vem caracterizando a má qualidade dos corpos de água que recebem os lançamentos dos esgotos dos municípios de Itaúna e Pará de Minas, enquanto o município de Bom Despacho contribui para a ocorrência de IQA Muito Ruim no rio Picão, conforme apresentado na Tabela 12.1.

Observa-se na Tabela 12.2 que no período de 1997 a 2007 o rio Itapecerica a montante de Divinópolis (PA004) apresentou 61% das violações do parâmetro coliformes termotolerantes e 46% de fósforo total, enquanto que as violações observadas no trecho a jusante de Divinópolis (PA007) foram de 90% e 79%, respectivamente, evidenciando o impacto na qualidade das água desse rio pelo lançamento de esgotos provenientes do município de Divinópolis. No rio São João a jusante de Itaúna (PA009) as violações dos parâmetros fósforo total, coliformes termotolerantes e DBO foram de 97%, 92% e 58%, respectivamente. No ribeirão Paciência a jusante de Pará de Minas (PA010) as violações neste período foram de 86% e 96% para as variáveis coliformes termotolerantes e fósforo total. No rio Picão a jusante de Bom Despacho (PA021) houve 78% de violação do parâmetro coliformes termotolerantes e no ribeirão Fatura ou Gama a jusante de Nova Serrana (PA020) as variáveis DBO, fósforo total, coliformes termotolerantes, nitrogênio amoniacal e OD, apresentaram 100%, 100%, 89%, 78% e 78%, respectivamente, de violações no período.

Portanto, recomenda-se a definição de ação conjunta entre a FEAM, Concessionárias de água e esgoto, CEMIG, Prefeituras Municipais e Ministério Público, com participação do CBH do rio Pará, do COPAM e do CERH, para priorizar a implantação ou otimização dos sistemas de esgotamento sanitário dos municípios da sub-bacia do rio Pará, especialmente, Divinópolis, Itaúna e Pará de Minas.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 12.1: Evolução da média anual do IQA da sub-bacia do rio Pará nos municípios que possuem população urbana superior a 30.000 habitantes

Estações	Corpo de água	Localização	Município	População Urbana	Média anual do IQA										
					1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PA004	Rio Itapecerica	Montante	Divinópolis	177.973	-	-	-	Bom	Médio	Bom	Médio	Bom	Médio	Médio	Médio
PA007	Rio Itapecerica	Jusante			Ruim	Médio	Médio	Médio	Ruim	Médio	Ruim	Médio	Médio	Médio	Médio
PA009	Rio São João	Jusante	Itaúna	71.770	Ruim	Médio	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim
PA010	Ribeirão Paciência	Jusante	Pará de Minas	67.993	-	-	-	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim	Ruim
PA021	Rio de Picão	Jusante	Bom Despacho	37.221	-	-	-	-	-	-	-	-	Muito Ruim	Muito Ruim	Muito Ruim
PA020	Ribeirão Fartura ou Gama	Jusante	Nova Serrana	35.321	-	-	-	-	-	-	-	-	Médio	Médio	Médio



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Tabela 12.2: Avaliação dos parâmetros associados aos esgotos sanitários dos municípios da sub-bacia do rio Pará que possuem população urbana superior a 30.000 habitantes

Estações	Corpo de água	Localização	Município	População Urbana							
					Coliformes Termot.	Nitrogênio Amoniacal Total	OD	DBO	Fósforo Total	Nitrogênio Amoniacal Total	Amônia não ionizável*
PA004	Rio Itapecerica	Montante	Divinópolis	177.973	61	0	0	4	46		0
PA007	Rio Itapecerica	Jusante			90	8	0	0	79	0	-
PA009	Rio São João	Jusante	Itaúna	71.770	92	15	0	58	97	7	0
PA010	Ribeirão Paciência	Jusante	Pará de Minas	67.993	86	57	18	32	96	50	0
PA021	Rio de Picão	Jusante	Bom Despacho	37.221	78	0	0	11	33		0
PA020	Ribeirão Fartura ou Gama	Jusante	Nova Serrana	35.321	89	78	78	100	100		0

*Violações baseadas na Deliberação Normativa COPAM nº10/86 para corpos de água Classe 1 e 2

** Violações baseadas na Deliberação Normativa COPAM nº10/86 para corpos de água Classe 3

12.2. Contaminação por atividades industriais e minerárias

No Estado de Minas Gerais foram verificadas no período de 1997 a 2007 algumas ocorrências de metais tóxicos em desconformidade com os padrões legais, quais sejam, cobre total, cobre dissolvido, mercúrio total, arsênio total, cádmio total, zinco total, bário total, cromo VI, cromo total e chumbo total, bem como outras substâncias tóxicas como fenóis totais, amônia não ionizável e íons cianeto livres. Em 2007, na bacia do rio Pará identificaram-se ocorrências de **chumbo total, nitrogênio amoniacal e fenóis totais** provenientes de atividades industriais em concentrações que resultaram na Contaminação por Tóxicos Alta em 2007.

Nos corpos de água da sub-bacia do rio Pará, a Contaminação por Tóxicos apresentou-se Baixa em cerca de 70% dos pontos de amostragem no ano de 2007. Foram responsáveis pela CT Alta os parâmetros **chumbo total, nitrogênio amoniacal e fenóis totais** na estação localizada no ribeirão Fartura ou Gama a jusante da cidade de Nova Serrana (PA020), sendo que o nitrogênio amoniacal e fenóis totais destacaram-se nas três últimas campanhas e cobre dissolvido na terceira campanha de 2007. Vale destacar que este trecho de amostragem sofreu a influência de esgotos domésticos e de indústrias de calçados do município de Nova Serrana.

12.3. Contaminação por mau uso do solo

Entre 1997 e 2007, foram verificadas em Minas Gerais várias ocorrências de alumínio total e dissolvido, manganês total, ferro dissolvido e turbidez em desconformidade com os padrões legais. Esses parâmetros se destacam por caracterizar, principalmente, o mau uso do solo no Estado.

Em 2007, na bacia do rio Pará identificaram-se violações em relação ao parâmetro turbidez, no rio Lambari próximo à sua foz no rio Pará (PA015) e no ribeirão Fartura ou Gama a montante de sua foz no rio Pará no município de Nova Serrana (PA020). O desmatamento, a exploração das áreas próximas para atividades agropecuárias sem controle, gera o quadro atual das estações, o que favorece assoreamentos visíveis nesses trechos.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

13 – BIBLIOGRAFIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Denominações urbanas. Disponível em <www.almg.gov.br>.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12649: caracterização de cargas poluidoras na mineração. Rio de Janeiro, 1992. 30p.

_____. NBR 9897: planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. Rio de Janeiro, 1987. 23p.

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. Dados de municípios mineiros. Disponível em: <<http://www.amm-mg.org.br>>.

APHA (American Public Health Association). 1985. Biological examination of water. *In* :---. 16.ed. Washington : APHA, AWWA, WPCF. p-1041-1215.

APHA (American Public Health Association). 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. AWWA/WPCH, 20^a ed. Washington: Lenore S. Clesceri et al..

BRAILE, P.M., CAVALCANTI, J.E.W.A. Manual de tratamento de águas residuárias industriais: São Paulo: CETESB, 1993. 765 p.

BRANCO, S. M. Hidrobiologia aplicada à engenharia sanitária. 3^a ed., São Paulo, CETESB/ASCETESB, 1986.

BRIGANTE, J. & ESPÍNOLA, E.L.G. Limnologia Fluvial: um estudo no rio Mogi-Guaçu. São Carlos: RIMA, 2003. 278p.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Relatório de qualidade das águas interiores do Estado de São Paulo: Relatórios ambientais. São Paulo: CETESB, 2005. 265p. Disponível em: <<http://www.cetesb.sp.gov.br>>

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. Inventário das estações fluviométricas. Brasília: DNAEE, 1997.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Consumo e reservas de minério de ferro. Disponível em: <www.dnpm.gov.br/pluger16.html>. 2002.

DERÍSIO, C.A. Introdução ao controle de poluição ambiental. São Paulo: CETESB, 1992. 202p.

DVWK (Deutscher Verband Für Wasserwirtschaft Und Kulturbau). 1999. Manuais para gerenciamento de recursos hídricos: Relevância de parâmetros de qualidade de águas aplicados a águas correntes. Trad. J. H. Saar, Florianópolis: FATMA/GTZ.

ESTEVES, FRANCISCO A. 1998. Fundamentos de limnologia. 2^a. Edição. Rio de Janeiro: Interciência/FINEP. 602 p.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

FATMA/GTZ. 1999. Relevância de parâmetros de qualidade das águas aplicados às águas correntes. Parte I: Características gerais, nutrientes, elementos-traço e substâncias nocivas inorgânicas, características biológicas. Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, Florianópolis. 108 p.

FIGUEIREDO, V.L.S. Enquadramento das águas da bacia hidrográfica do rio Verde. Belo Horizonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente, 1998. 50p.

FIGUEIREDO, V.L.S.; MAZZINI, A.L.A. Enquadramento das águas da bacia hidrográfica do rio das Velhas. Belo Horizonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente, 1997. 60p.

FLORENCIO, E. Enquadramento das águas da bacia hidrográfica do rio Paraibuna. Belo Horizonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente, 1997. 50p

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS. Diagnóstico ambiental do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1983. v. 4 (Série de Publicações Técnicas, 10).

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL. Processos de licenciamento e fiscalização (Sistema FEAM). Belo Horizonte, 1989 a 2000.

_____. Licenciamento ambiental: coletânea de legislação. Belo Horizonte: FEAM, 1998. 380p. v. 5.(Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para os Municípios)

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Qualidade das águas superficiais do Estado de Minas Gerais em 1998. Belo Horizonte: FEAM, 1999. 87p.

_____. Qualidade das águas superficiais do Estado de Minas Gerais em 1999. Belo Horizonte: FEAM, 2000. 81p.

_____. Qualidade das águas superficiais do Estado de Minas Gerais em 2000. Belo Horizonte: FEAM, 2000. 112p.

_____. Eventos de mortandade de peixes acompanhados pela FEAM de 1996 a 2002. Belo Horizonte: FEAM, 2005.

_____. Agenda Marrom: Indicadores Ambientais 2002. Belo Horizonte: FEAM, 2002. 68p.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cartas topográficas. Rio de Janeiro: IBGE. Escalas de 1:50.000; 1:100.000 e 1:250.000.

_____. Pesquisa da pecuária municipal. Minas Gerais: IBGE, 2000.

_____. Pesquisa de informações básicas municipais. Disponível em: <www.ibge.gov.br>.

_____. Pesquisa de informações básicas municipais 1999. Perfil dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro, 2001. 121p.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

_____. Pesquisa industrial 2000. Volume 19, número 1, EMPRESA. Rio de Janeiro, 2000.

_____. Pesquisa industrial 2000. Volume 19, número 1, PRODUTO. Rio de Janeiro, 2000.

_____. Pesquisa nacional de saneamento básico 2000. Rio de Janeiro, 2002.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio Doce em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 138 p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio Grande em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 165 p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio Jequitinhonha em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 110 p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio Mucuri em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 111 p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio Pará em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 119 p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio Paraíba do Sul em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 147 p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio Paranaíba em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 125 p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio Paraopeba em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 127 p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio Pardo em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 101 p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio São Francisco - Norte em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 141p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio São Francisco - Sul em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 125 p.

_____. Monitoramento das águas superficiais na bacia do rio das Velhas em 2005. Belo Horizonte: IGAM, 2006. 146 p.

_____. Sistema de Cálculo de Índice de Qualidade de Água (SCQA) - estabelecimento das equações do Índice de Qualidade das Águas (IQA). Belo Horizonte: IGAM, 2005. 18p.



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

_____. Programa de gerenciamento integrado das atividades desenvolvidas em terra na bacia do rio São Francisco: avaliação das interferências ambientais da mineração nos recursos hídricos na bacia do Alto rio das Velhas. sub-projeto 1.2. Belo Horizonte: IGAM, 2001. 20p.

KNIE, J. Proteção ambiental com testes ecotoxicológicos: Experiências com a análise das águas e dos efluentes no Brasil. Florianópolis, 1998. 14p.

KRENKEL, P.A.; NOVOTNY, V. Water quality management. New York: Academic Press, 1980. 671p.

LEÃO, M.M.D. et al. Desenvolvimento tecnológico para controle ambiental na indústria têxtil/malha de pequeno e médio porte. Belo Horizonte: DESA-UFMG, 1998. 204p.

MACÊDO, J. A. B. Introdução a química ambiental: Química, meio ambiente e sociedade 1ª ed. Juiz de Fora: Jorge Macedo, 2002, 487p.

_____. Águas & Águas. 1ª ed. Juiz de Fora: ORTOFARMA, 2000, 505p.

MALAVOLTA, E. Fertilizantes e seu impacto ambiental: metais pesados, mitos, mistificações e fatos. São Paulo: ProduQuímica, 1994. 153p.

MINAS GERAIS. Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia et al, Diagnóstico ambiental do Vale do Paraopeba. Belo Horizonte, 1996.

ODUM, E. 1983. Ecologia. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara. 423 p.

PÁDUA, H. B. Alcalinidade, condutividade e salinidade em sistemas aquáticos. Disponível em <www.ccinet.com.br/tucunare/alcalinidade.htm>. Acesso em: 06 ago. 2001.

PAREY, V.P. Manuais para gerenciamento de recursos hídricos: relevância de parâmetros de qualidade das águas aplicados a águas correntes. Paraná: GTZ, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, 1993. 227p.

PATRÍCIO, F.C. Avaliação da toxicidade do pesticida aldicarbe e duas espécies de peixes de água doce, *Brachydanio rerio* e *Orthospinus franciscensis*. Dissertação de mestrado. Lavras: UFLA, 1998. 76p.

Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco. GEF / PNUMA / OEA / SRH. Sub-projeto 1.2. Avaliação das Interferências Ambientais da Mineração sobre os Recursos Hídricos na Bacia do Alto Rio das Velhas. IGAM. GOLDER ASSOCIATES. 2001.

QUEIROZ, J.F.; STRIXINO, S.T.; NASCIMENTO, V.M.C. Organismos bentônicos bioindicadores da qualidade das águas da bacia do médio São Francisco. EMBRAPA, 2000. 4p.

Resumo da 1ª versão do relatório "Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos de Minas Gerais". Processo de Codificação de Cursos D'água, jun 1999



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

ROMANELLI, M.C.M.; MACIEL, P. Enquadramento das águas da bacia hidrográfica do rio Paraopeba. Belo Horizonte: FEAM, 1996. 50p.

SCHVARTSMAN, S. Intoxicações agudas. 4ª ed. São Paulo: UFMG Editora Universitária, 1991.

SHREVE, R.N., BRINK Jr. J.A. Indústrias de processos químicos. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1980. 718p.

Von SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. VOL 1, 2 ed. Belo Horizonte: UFMG, 1996. 243p.

STANDART METHODS: for the examination of water and wastewater. 18 ed. Baltimore: APHA, 1992.

TEIXEIRA, J.A.O. Enquadramento das águas da bacia hidrográfica do rio Pará. Belo Horizonte: FEAM, 1998. 45p

TRAIN, R.E. Quality criteria for water. Washington D.C.: Environmental Protection Agency, 1979. 256p.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

ANEXOS

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Anexo A
Municípios com Sede na Sub-Bacia do Rio Pará



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

UPGRH SF2			
MUNICÍPIO	POPULAÇÃO		
	TOTAL	URBANA	RURAL
Araújos	6217	5080	1137
Bom Despacho	39943	37221	2722
Carmo da Mata	10400	7668	2732
Carmo do Cajuru	17157	14122	3035
Carmópolis de Minas	14348	9075	5273
Cláudio	22522	17189	5333
Conceição do Pará	4793	1722	3071
Desterro de Entre-Rios	6807	3040	3767
Divinópolis	183962	177973	5989
Igaratinga	7355	5416	1939
Itaguara	11302	7805	3497
Itapecerica	21235	16220	5015
Itaúna	76862	71770	5092
Leandro Ferreira	3227	1938	1289
Martinho Campos	11817	9300	2517
Nova Serrana	37447	35321	2126
Onça de Pitangui	2985	922	2063
Papagaios	12472	10207	2265
Pará de Minas	73007	67993	5014
Passa-Tempo	8480	6131	2349
Pedra do Indaiá	3814	1818	1996
Perdigão	5707	4425	1282
Piracema	6509	2764	3745
Pitangui	22269	18629	3640
Santo Antônio do Monte	23473	19042	4431
São Gonçalo do Pará	7969	6213	1756
São Sebastião do Oeste	4648	1624	3024
TOTAL	646727	560628	86099



QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Anexo B
Curvas de Qualidade e Equações para Cálculo do Índice de
Qualidade das Águas

1. Coliformes Fecais


As equações para o cálculo da qualidade (q_s) do parâmetro Coliformes Fecais (CF) são:

Para $CF \leq 10^5$ NMP/100ml

$$q_s = 98,24034 - 34,7145 \times (\log(CF)) + 2,614267 \times (\log(CF))^2 + 0,107821 \times (\log(CF))^3$$

Para $CF > 10^5$ NMP/100ml

$$\Rightarrow q_s = 3,0$$



2. Potencial Hidrogeniônico – pH

As equações para o cálculo da qualidade (q_s) do parâmetro Potencial Hidrogeniônico (pH) são:

Para $pH \leq 2,0$

$$\Rightarrow q_s = 2,0$$

Para $2,0 < pH \leq 6,9$

$$q_s = -37,1085 + 41,91277 \times pH - 15,7043 \times pH^2 + 2,417486 \times pH^3 - 0,091252 \times pH^4$$

Para $6,9 < pH \leq 7,1$

$$q_s = -4,69365 - 21,4593 \times pH - 68,4561 \times pH^2 + 21,638886 \times pH^3 - 1,59165 \times pH^4$$


Para $7,1 < pH \leq 12$

$$q_s = -7,698,19 + 3,262,031 \times pH - 499,494 \times pH^2 + 33,1551 \times pH^3 - 0,810613 \times pH^4$$

Para $\text{pH} \geq 12,0$

\Rightarrow

$$q_s = 3,0$$



3. Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO

As equações para o cálculo da qualidade (q_s) do parâmetro Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) são:


Para $\text{DBO} \leq 30 \text{ mg/l}$

$$q_s = 100,9571 - 10,7121 \times \text{DBO} + 0,49544 \times \text{DBO}^2 - 0,011167 \times \text{DBO}^3 + 0,0001 \times \text{DBO}^4$$

Para $\text{DBO} > 30,0 \text{ mg/l}$

\Rightarrow

$$q_s = 2,0$$



4. Nitrato – NO₃


As equações para o cálculo da qualidade (qs) do parâmetro Nitrato (NO₃) são:

Para NO₃ ≤ 10 mg/l ⇒ $q_s = -5,1 \times NO_3 + 100,17$

Para 10 < NO₃ ≤ 60 mg/l ⇒ $q_s = -22,853 \times \ln(NO_3) + 101,18$

Para 60 < NO₃ ≤ 90 mg/l ⇒ $q_s = 10.000.000.000 \times (NO_3)^{5,1161}$

Para NO₃ > 90 mg/l ⇒ $q_s = 1,0$




5. Fosfato Total – PO₄

As equações para o cálculo da qualidade (qs) do parâmetro Fosfato Total (PO₄) são:

Para PO₄ ≤ 10 mg/l ⇒ $q_s = 79,7 \times (PO_4 + 0,821)^{-1,15}$


Para PO₄ > 10,0 mg/l ⇒ $q_s = 5,0$



6. Temperatura (afastamento da temperatura de equilíbrio)

As equações para o cálculo da qualidade (q_s) do parâmetro Temperatura são:

Para $\Delta T < -5,0$	\Rightarrow	$q_s \text{ é indefinido}$
Para $-5,0 \leq \Delta T \leq -2,5$	\Rightarrow	$q_s = 10 \times \Delta T + 100$
Para $-2,5 < \Delta T \leq -0,625$	\Rightarrow	$q_s = 8 \times \Delta T + 95$
Para $-0,625 < \Delta T \leq 0$	\Rightarrow	$q_s = 4,8 \times \Delta T + 93$
Para $0 < \Delta T \leq 0,625$	\Rightarrow	$q_s = -4,8 \times \Delta T + 93$
Para $0,625 < \Delta T \leq 2,5$	\Rightarrow	$q_s = -8 \times \Delta T + 95$
Para $2,5 < \Delta T \leq 5,0$	\Rightarrow	$q_s = -10 \times \Delta T + 100$
Para $5,0 < \Delta T \leq 10,0$	\Rightarrow	$q_s = 124,57 \times e^{(-0,1842 \times \Delta T)}$
Para $10,0 < \Delta T \leq 15,0$	\Rightarrow	$q_s = 1.002,2 \times \Delta T^{1,7083}$
Para $\Delta T > 15,0$	\Rightarrow	$q_s = 9,0$



Nota: O Projeto Água de Minas adota o Dt sempre igual a zero onde $q_s=92,00$.

7. Turbidez

As equações para o cálculo da qualidade (q_s) do parâmetro Turbidez são:

Para $Tu \leq 100$


$$q_s = 90,37 \times e^{(-0,0169 \times Tu)} - 1,5 \times \cos(0,0571 \times (Tu - 30)) + 10,22 \times e^{(-0,231 \times Tu)} - 0,8$$

Para $Tu > 100$

$$\Rightarrow \boxed{q_s = 5,0}$$

Observação: os cálculos de seno são considerando os valores em *RADIANO* e não em graus.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007



8. Sólidos Totais - ST

As equações para o cálculo da qualidade (q_s) do parâmetro Sólidos Totais (ST) são:


Para $ST \leq 500$

$$q_s = 133,17 \times e^{(-0,0027 \times ST)} - 53,17 \times e^{(-0,0141 \times ST)} + ((-6,2 \times e^{(-0,00462 \times ST)}) \times \text{sen}(0,0146 \times ST))$$

Para $ST > 500$

$$\Rightarrow q_s = 30,0$$

Observação: os cálculos de seno são considerando os valores em *RADIANO* e não em graus.



9. Oxigênio Dissolvido – (OD = % oxigênio de saturação)

As equações para o cálculo da qualidade (q_s) do parâmetro Oxigênio Dissolvido são:

Para OD% saturação ≤ 100 %

$$q_s = 100 \times (\text{sen}(y_1))^2 - ((2,5 \times \text{sen}(y_2) - 0,018 \times OD + 6,86) \times \text{sen}(y_3)) + \frac{12}{e^{y_4} + e^{y_5}}$$

Onde:

$$y_1 = 0,01396 \times OD + 0,0873$$

$$y_2 = \frac{\pi}{56} \times (OD - 27)$$

$$y_3 = \frac{\pi}{85} \times (OD - 15)$$

$$y_4 = \frac{(OD - 65)}{10}$$

$$y_5 = \frac{(65 - OD)}{10}$$

Para $100 \leq OD$ % saturação ≤ 140 %


$$q_s = -0,00777142857142832 \times (OD)^2 + 1,27854285714278 \times OD + 49,8817148572$$

Para OD% saturação > 140 %

$$\Rightarrow q_s = 47,0$$

Observação: para os cálculos de *seno* considera-se os valores em *RADIANO* e não em graus.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007



QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Anexo C
Classificação das Coleções de Água



Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, em sua resolução Nº 357/2005, classifica as águas segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes. A esse sistema, chama-se enquadramento dos corpos de água, que estabelece o nível de qualidade (classe) a ser mantido ou alcançado em um corpo de água ao longo do tempo, em termos dos usos possíveis com segurança determinada.

As coleções de água doce são classificadas de acordo com seus usos preponderantes em 5 classes:

I - Classe especial: águas destinadas:

- a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;
- b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,
- c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral.

II - Classe 1: águas que podem ser destinadas:

- a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;
- b) à proteção das comunidades aquáticas;
- c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000;
- d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e
- e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.

III - Classe 2: águas que podem ser destinadas:

- a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;
- b) à proteção das comunidades aquáticas;
- c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme
- d) Resolução CONAMA no 274, de 2000;
- e) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e
- f) à aquicultura e à atividade de pesca.

IV - Classe 3: águas que podem ser destinadas:

- a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado;
- b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
- c) à pesca amadora;
- d) à recreação de contato secundário; e
- e) à dessedentação de animais.

V - Classe 4: águas que podem ser destinadas:

- a) à navegação; e
- b) à harmonia paisagística.



QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2007

Anexo D
Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade
das Águas em 2007



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Pará entre Passa Tempo e Desterro de Entre Rios.

Variável	Padrão			Unidade	PA001	PA001	PA001	PA001
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Data de Amostragem					23/02/07	10/05/07	08/08/07	07/11/07
Hora de Amostragem					8:40	9:00	8:45	8:45
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Bom
Temperatura do Ar				° C	20	14	17	19
Temperatura da Água				° C	19,8	16,3	14,8	20,4
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,9	6,4	6,2	6,3
Condutividade Elétrica				µmho/cm	23,7	22,6	24,6	26,3
Turbidez	40	100	100	NTU	63,4	32,3	21,4	71,1
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPT	147	126	74	
Sólidos Totais				mg / L	84	66	137	100
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	36		34	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	48	40	103	63
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	9,7		11,5	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	9,7		11,5	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	11,500		9,700	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	6,5		5,4	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	5		4,3	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	0,47	0,36	< 0,3	0,34
Potássio Dissolvido				mg / L K	0,75		0,99	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	1,51		2,19	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	< 1		< 1	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5		< 0,5	
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	< 0,01	0,02	< 0,01	0,1
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,3		< 0,1	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,04	0,05	0,03	0,02
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,003		< 0,001	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000365	0,000089	0,000050	0,000096
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	7,1	6,7	8,7	7,6
% OD Saturação				%	83,930	73,537	92,500	90,990
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	< 2	< 2	< 2
DQO				mg / L	< 5		15	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01		< 0,01	
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	2300	5000	3000	8000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	1300	1300	300	5000
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	5000		2200	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	0,6675	0	0,5933333	5,933333
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,038		0,0215	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005		< 0,0005	
Cálcio Total				mg / L Ca	2,6		2,2	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004		< 0,004	
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,68	0,26	0,12	1,11
Magnésio Total				mg / L Mg	1,2		1	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,106		0,0775	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2		< 0,2	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005		< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02		< 0,02	
Toxicidade Crônica								

IQA					63,71	63,56	71,14	55,96
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Ribeirão Passa Tempo na cidade de Passa Tempo

Variável	Padrão			Unidade	PA024
UPGRH					SF2
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1
Data de Amostragem					07/11/07
Hora de Amostragem					9:45
Condições do Tempo					Nublado
Temperatura do Ar				° C	21
Temperatura da Água				° C	21,5
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,3
Condutividade Elétrica				µmho/cm	50
Turbidez	40	100	100	NTU	17,8
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	84
Sólidos Totais				mg / L	79
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	17
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	1,5
Potássio Dissolvido				mg / L K	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,1
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	0,5
Nitrato	10	10	10	mg / L N	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000520
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,9
% OD Saturação				%	85,474
DBO	3	5	10	mg / L	< 2
DQO				mg / L	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	90000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	50000
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	8,01
Feofitina a				µg / L	
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL	
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al	
Alumínio Total				mg / L Al	
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	
Boro Dissolvido				mg / L B	
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	
Cálcio Total				mg / L Ca	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	
Cobre Total				mg / L Cu	
Cromo Hexavalente				mg / L Cr	
Cromo Trivalente				mg / L Cr	
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,97
Magnésio Total				mg / L Mg	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	
Mercúrio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	
Toxicidade Crônica					

IQA					52,43
CT					BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio do Peixe a montante do município de Piracema

Variável	Padrão			Unidade	PA026
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2
UPGRH					
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1
Data de Amostragem					07/11/07
Hora de Amostragem					13:10
Condições do Tempo					Nublado
Temperatura do Ar				° C	25
Temperatura da Água				° C	24,9
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,4
Condutividade Elétrica				µmho/cm	53
Turbidez	40	100	100	NTU	38,9
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	83
Sólidos Totais				mg / L	105
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	50
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	1,16
Potássio Dissolvido				mg / L K	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,07
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000167
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	7,2
% OD Saturação				%	94,311
DBO	3	5	10	mg / L	< 2
DQO				mg / L	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	50000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	1700
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	1,602
Feofitina a				µg / L	
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL	2,77
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al	
Alumínio Total				mg / L Al	
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	
Boro Dissolvido				mg / L B	
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	
Cobre Total				mg / L Cu	
Cromo Hexavalente				mg / L Cr	
Cromo Trivalente				mg / L Cr	
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,28
Magnésio Total				mg / L Mg	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,088
Mercúrio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02
Toxicidade Crônica					

IQA					63,02
CT					BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Ribeirão Paiol a jusante de Carmópolis de Minas.

Variável	Padrão			Unidade	PA002	PA002	PA002	PA002
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Data de Amostragem					23/02/07	10/05/07	08/08/07	07/11/07
Hora de Amostragem					10:00	10:15	10:05	10:40
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				° C	24	17	23	23
Temperatura da Água				° C	21,9	18,7	16,3	23,4
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,6	6,3	6,3	5,8
Condutividade Elétrica				µmho/cm	64,1	58,9	61,6	75,6
Turbidez	40	100	100	NTU	13,6	15,7	8,17	16,1
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	93	79	82	87
Sólidos Totais				mg / L	59	76	66	94
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	51		47	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	8	17	19	16
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	26,6		20,6	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	26,6		20,6	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	23,400		16,600	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	12,8		7,9	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	10,6		8,7	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	2,24	2,76	4,2	3,96
Potássio Dissolvido				mg / L K	1,45		2,31	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	3,84		6,12	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	< 1		< 1	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	< 0,01	0,03	0,06	0,06
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,5		0,2	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	0,2	< 0,1	< 0,1	0,4
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,04	0,1	0,04	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,005		0,008	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000426	0,000085	0,000071	0,000151
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	4,7	4,8	6,1	3,6
% OD Saturação				%	57,515	54,886	66,292	45,478
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	< 2	< 2	< 2
DQO				mg / L	< 5		14	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	1100	1400	800	1300
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	170	110	220	300
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	700		80	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	14,418	16,02	3,090278	14,49429
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,117		0,079	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	5,1		3,2	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	0,006	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000		< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	1,14	1,05	0,35	1,39
Magnésio Total				mg / L Mg	2,6		2,1	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,298	0,491	0,1005	0,138
Mercúrio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Toxicidade Crônica								

IQA					69,31	67,66	69,38	58,49
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Pará em Pará dos Vilelas.

Variável	Padrão			Unidade	PA003	PA003	PA003	PA003
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Data de Amostragem					23/02/07	10/05/07	08/08/07	07/11/07
Hora de Amostragem					10:50	11:05	11:00	11:30
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				° C	25	19	25	24
Temperatura da Água				° C	23,9	20,8	20,1	24,4
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		7	6,6	7,2	6,4
Condutividade Elétrica				µmho/cm	40,8	36	38,7	45
Turbidez	40	100	100	NTU	69,4	33,1	24,9	90,3
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	156	91	84	213
Sólidos Totais				mg / L	123	87	75	159
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	44		44	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	79	45	31	85
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	22,6		16,8	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	22,6		16,8	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	15,100		12,800	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	8,1		5,5	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	6,9		7,3	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	0,92	0,93	0,92	1,7
Potássio Dissolvido				mg / L K	1,38		1,66	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	2,65		3,74	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	< 1		< 1	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,02	0,05	0,16	0,08
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,4		0,3	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,04	0,09	0,02	0,02
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,003		< 0,001	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,001231	0,000197	0,000742	0,000161
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,7	6,9	7,8	6,8
% OD Saturação				%	85,026	81,994	91,324	87,215
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	< 2	< 2	< 2
DQO				mg / L	8		13	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	11000	8000	2800	13000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	3000	5000	500	2200
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	2300		70	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	3,957321	2,945476	1,107556	10,93118
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		0,0005	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,048		0,034	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	3,3		2,2	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000		< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,85	0,33	0,22	1,17
Magnésio Total				mg / L Mg	1,7		1,8	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,128	0,084	0,081	0,114
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	0,1	< 0,02
Toxicidade Crônica								
IQA					60,32	59,77	68,37	57,13
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Pará à montante da cidade de Carmo do Cajurú

Variável	Padrão			Unidade	PA028
UPGRH					SF2
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1
Data de Amostragem					08/11/07
Hora de Amostragem					10:55
Condições do Tempo					Chuvoso
Temperatura do Ar				° C	21
Temperatura da Água				° C	24,8
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,5
Condutividade Elétrica				µmho/cm	44,3
Turbidez	40	100	100	NTU	14,8
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	52
Sólidos Totais				mg / L	65
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	14
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	1,3
Potássio Dissolvido				mg / L K	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,13
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,03
Nitrito	1	1	1	mg / L N	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000208
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,4
% OD Saturação				%	82,087
DBO	3	5	10	mg / L	< 2
DQO				mg / L	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	800
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	300
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	4,272
Feofitina a				µg / L	
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL	
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al	
Alumínio Total				mg / L Al	
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	
Boro Dissolvido				mg / L B	
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu	
Cromo Hexavalente				mg / L Cr	
Cromo Trivalente				mg / L Cr	
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,46
Magnésio Total				mg / L Mg	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	
Mercúrio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02
Toxicidade Crônica					

IQA					69,31
CT					BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Pará a montante da confluência com o rio
Itapeçerica.

Variável	Padrão			Unidade	PA005	PA005	PA005	PA005
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Data de Amostragem					23/02/07	10/05/07	08/08/07	08/11/07
Hora de Amostragem					14:30	14:45	14:45	13:35
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Chuvoso
Temperatura do Ar				° C	28	22	29	22
Temperatura da Água				° C	26,1	24,6	23,7	25,8
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,9	6,8	6,9	6,3
Condutividade Elétrica				µmho/cm	38,3	39,3	37	46
Turbidez	40	100	100	NTU	57,8	17,1	4,06	12,4
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	284	70	23	60
Sólidos Totais				mg / L	84	61	43	59
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	59		34	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	25	19	9	< 1
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	19,7		16	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	19,7		16	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	12,900		13,100	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	8,6		7,6	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	4,4		5,5	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	1,75	1,52	1	1,73
Potássio Dissolvido				mg / L K	1,69		1,58	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	2,63		3,93	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	1,2		< 1	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,03	0,02	0,04	0,09
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,5		0,2	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,03	0,05	< 0,01	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,006		0,002	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,001142	0,000409	0,000483	0,000141
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,4	5,9	7,9	6,6
% OD Saturação				%	84,905	75,822	99,605	87,003
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	< 2	< 2	< 2
DQO				mg / L	< 5		11	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,002	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	24000	17000	28000	5000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	2300	700	2300	1700
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	2300		30000	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	12,66227	18,07385	2,403	7,295756
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL			19,37	19,37
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,04		0,024	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	3,4		3	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000		< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,44	0,57	0,08	0,61
Magnésio Total				mg / L Mg	1,1		1,3	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,042		0,025	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2		< 0,2	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005		< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,03
Toxicidade Crônica								
IQA					61,83	68,69	68,05	64,38
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Itapecerica a montante de Divinópolis ou a
montante da confluência com o ribeirão Boa Vista.

Variável	Padrão			Unidade	PA004	PA004	PA004	PA004
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Data de Amostragem					27/02/07	14/05/07	10/08/07	12/11/07
Hora de Amostragem					9:00	9:20	8:45	9:00
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				° C	26	19	16	24
Temperatura da Água				° C	22,8	19,5	17,5	24,6
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,9	6,6	6,6	6,6
Condutividade Elétrica				µmho/cm	41,2	41,1	55,4	54,7
Turbidez	40	100	100	NTU	60,3	11	10,8	18,4
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	203		56	
Sólidos Totais				mg / L	98	59	56	71
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	48		51	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	50	14	5	9
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	20		15,7	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	20		15,7	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	13,600		17,400	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	9,6		10,8	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	4,1		6,6	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	0,98	0,86	0,99	1,48
Potássio Dissolvido				mg / L K	1,4		1,84	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	2,7		4,26	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	< 1		6,7	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,06	0,02	0,06	0,12
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,4		0,2	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	0,4	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,1	0,1	0,06	0,02
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,009		0,014	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,001811	0,000179	0,000155	0,000258
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,5	7	7,6	6,6
% OD Saturação				%	81,008	81,345	84,651	85,454
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	3	< 2	< 2
DQO				mg / L	9		13	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,002	< 0,001	0,002
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	0,05	< 0,05	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	13000	1300	800	700
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	5000	230	500	300
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	22000		500	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	3,608901	2,4475	0,6161538	2,67
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,11		0,034	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	3,8		4,3	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,13		0,18	
Magnésio Total				mg / L Mg	1		1,6	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,326		0,079	
Mercúrio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2		< 0,2	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	0,03	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Toxicidade Crônica								

IQA					57,85	72,45	70,16	69,84
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Ribeirão Boa Vista a jusante do município de
Carmo da Mata

Variável	Padrão			Unidade	PA032
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2
UPGRH					SF2
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 2
Data de Amostragem					06/11/07
Hora de Amostragem					13:50
Condições do Tempo					Chuvoso
Temperatura do Ar				° C	19
Temperatura da Água				° C	24,7
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,5
Condutividade Elétrica				µmho/cm	61,4
Turbidez	40	100	100	NTU	52,6
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	
Sólidos Totais				mg / L	122
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	46
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	2,42
Potássio Dissolvido				mg / L K	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,37
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000207
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	7
% OD Saturação				%	91,179
DBO	3	5	10	mg / L	< 2
DQO				mg / L	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	0,002
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	5000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	800
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	1,295735
Feofitina a				µg / L	
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL	
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al	
Alumínio Total				mg / L Al	
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	
Boro Dissolvido				mg / L B	
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	
Cobre Total				mg / L Cu	
Cromo Hexavalente				mg / L Cr	
Cromo Trivalente				mg / L Cr	
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	
Magnésio Total				mg / L Mg	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	
Mercúrio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02
Toxicidade Crônica					

IQA					59,79
CT					BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Itapecerica a jusante da cidade de Divinópolis.

Variável	Padrão			Unidade	PA007	PA007	PA007	PA007
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3
Data de Amostragem					27/02/07	14/05/07	10/08/07	12/11/07
Hora de Amostragem					9:50	10:05	9:25	9:45
Condições do Tempo					Nublado	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				° C	25	22	20	25
Temperatura da Água				° C	24,1	21,5	19,7	25,2
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		7,2	7,2	6,4	6,4
Condutividade Elétrica				µmho/cm	55,4	60,8	75,1	76
Turbidez	40	100	100	NTU	50,7	19,1	16	21,8
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	166		78	
Sólidos Totais				mg / L	99	74	78	90
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	53		58	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	46	18	20	28
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	20,5		24,7	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	20,5		24,7	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	16,500		19,200	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	11,7		11,7	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	4,8		7,5	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	1,86	2,89	3,03	2,91
Potássio Dissolvido				mg / L K	1,63		2,28	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	3,74		6,54	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	< 1		5,2	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,05	0,09	0,13	0,28
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,5		0,3	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	0,3	0,4	0,6	0,5
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,11	0,1	0,05	0,03
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,01		0,033	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,002959	0,003282	0,000689	0,000850
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,8	6,7	7,3	6,2
% OD Saturação				%	86,467	80,627	84,558	80,698
DBO	3	5	10	mg / L	3	4	3	< 2
DQO				mg / L	8		21	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,004	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,06
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	90000	90000	90000	90000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	50000	50000	30000	28000
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	50000	50000	50000	50000
Clorofila a	10	30	60	µg / L	2,33625	2,175555	1,525714	2,053846
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,056		0,042	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	4,7		4,7	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,52		0,33	
Magnésio Total				mg / L Mg	1,2		1,8	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,108		0,093	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2		< 0,2	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,03
Toxicidade Crônica								
IQA					51,64	52,22	53,45	51,55
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Córrego do Pinto ou Córrego Buriti a jusante do
município de São Gonçalo do Pará

Variável	Padrão			Unidade	PA034
UPGRH					SF2
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 2
Data de Amostragem					08/11/07
Hora de Amostragem					12:55
Condições do Tempo					Chuvoso
Temperatura do Ar				° C	23
Temperatura da Água				° C	25,9
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,1
Condutividade Elétrica				µmho/cm	243
Turbidez	40	100	100	NTU	46,1
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	149
Sólidos Totais				mg / L	197
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	39
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	16,5
Potássio Dissolvido				mg / L K	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,73
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	5
Nitrato	10	10	10	mg / L N	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,004480
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	0,5
% OD Saturação				%	6,648
DBO	3	5	10	mg / L	37
DQO				mg / L	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	0,1
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	0,011
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	0,17
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	> 160000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	> 160000
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	11,37839
Feofitina a				µg / L	
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL	2794,33
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al	
Alumínio Total				mg / L Al	
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	
Boro Dissolvido				mg / L B	
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu	
Cromo Hexavalente				mg / L Cr	
Cromo Trivalente				mg / L Cr	
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	4,44
Magnésio Total				mg / L Mg	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	
Mercúrio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02
Toxicidade Crônica					

IQA					17,60
CT					ALTA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Ribeirão Fartura ou Gama a jusante da cidade de
Nova Serrana (próximo de sua foz no rio Pará)

Variável	Padrão			Unidade	PA020	PA020	PA020	PA020
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Data de Amostragem					26/02/07	11/05/07	09/08/07	09/11/07
Hora de Amostragem					8:30	8:30	8:30	8:15
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				° C	22	14	18	22
Temperatura da Água				° C	21,9	18,5	17,1	22,4
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,8	6,7	6,5	6,6
Condutividade Elétrica				µmho/cm	110	223	300	401
Turbidez	40	100	100	NTU	210	30,5	74,1	53,7
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPT	252		182	
Sólidos Totais				mg / L	291	136	221	253
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	96	110	146	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	195	26	75	53
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	44,2		105,7	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	44,2		105,7	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	35,900		32,000	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	24,9		24,8	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	11		7,2	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	4,05	13	16,4	22
Potássio Dissolvido				mg / L K	3,43		6,79	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	4,82		22,7	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	3,1		5,7	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,14	0,8	1,07	1,31
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,8	0,8	0,6	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	1,5	8,5	12,8	17,2
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,09	0,02	< 0,01	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,054	0,003	0,002	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,005063	0,017821	0,015281	0,038003
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	4,5	1,1	1,1	0,5
% OD Saturação				%	54,614	12,423	12,060	6,134
DBO	3	5	10	mg / L	7	14	33	94
DQO				mg / L	23	37	133	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,006	0,018	0,008
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	0,64	< 0,05	0,5
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	> 160000	> 160000	> 160000	> 160000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	30000	30000	> 160000	> 160000
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	13000		> 160000	
Clorofila a	10	30	60	µg / L		3,204	5,134615	6,890323
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		0,002	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,117		0,089	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	10		10	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	0,021	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,08	1,47	0,93	1,35
Magnésio Total				mg / L Mg	2,7		1,7	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,193		0,37	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	0,01	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	0,03	< 0,02	0,05	0,05
Toxicidade Crônica								

IQA					36,89	27,12	18,49	12,54
CT					BAIXA	ALTA	ALTA	ALTA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio São João na localidade de São João

Variável	Padrão			Unidade	PA036
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2
UPGRH					
Classe de Enquadramento					Classe 1
Data de Amostragem					07/11/07
Hora de Amostragem					15:20
Condições do Tempo					Nublado
Temperatura do Ar				° C	26
Temperatura da Água				° C	24,8
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,2
Condutividade Elétrica				µmho/cm	21,7
Turbidez	40	100	100	NTU	17,2
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	
Sólidos Totais				mg / L	52
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	15
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	< 0,3
Potássio Dissolvido				mg / L K	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,07
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000104
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	7
% OD Saturação				%	90,687
DBO	3	5	10	mg / L	< 2
DQO				mg / L	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	1700
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	1100
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	5,34
Feofitina a				µg / L	
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL	2,77
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al	
Alumínio Total				mg / L Al	
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	
Boro Dissolvido				mg / L B	
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu	
Cromo Hexavalente				mg / L Cr	
Cromo Trivalente				mg / L Cr	
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	1,08
Magnésio Total				mg / L Mg	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,042
Merúrio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02
Toxicidade Crônica					
IQA					65,76
CT					BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio São João a jusante da cidade de Itaúna.

Variável	Padrão			Unidade	PA009	PA009	PA009	PA009
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Data de Amostragem					23/02/07	10/05/07	08/08/07	08/11/07
Hora de Amostragem					13:20	13:30	13:40	10:00
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				° C	27	20	27	22
Temperatura da Água				° C	26,4	23	22,7	23,8
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,9	6,6	6,6	6,5
Condutividade Elétrica				µmho/cm	93,2	121	144	168
Turbidez	40	100	100	NTU	23,8	30,4	28,1	19,6
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	149		100	
Sólidos Totais				mg / L	99	153	164	143
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	70		122	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	29	72	42	28
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	33,1		44,2	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	33,1		44,2	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	21,800		19,700	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	17,4		10,2	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	4,4		9,5	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	3,94	5	6,24	5,38
Potássio Dissolvido				mg / L K	2,73		3,92	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	9,97		19,9	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	9,1		16,7	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,21	0,35	0,7	0,5
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,8		1,6	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	0,9	1,3	1,7	3,2
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,03	0,06	0,02	0,02
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,019		0,019	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,005247	0,002998	0,003837	0,006206
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	5,6	5,1	5,2	5
% OD Saturação				%	76,143	64,522	65,371	64,340
DBO	3	5	10	mg / L	13	18	33	21
DQO				mg / L	31		73	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,003	0,006	0,003
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	2		1	
Substâncias Tensioativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	0,68	0,3	0,07
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	> 160000	> 160000	> 160000	> 160000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	> 160000	> 160000	> 160000	> 160000
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	> 160000	> 160000	> 160000	> 160000
Clorofila a	10	30	60	µg / L	1,78	1,5575	5,933333	10,68
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,04		0,03	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	7		4,1	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	0,009	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,7	0,3	0,34	0,25
Magnésio Total				mg / L Mg	1,1		2,3	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,093	0,183	0,06	0,09
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2		< 0,2	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	0,04	0,03
Toxicidade Crônica								
IQA					41,19	35,97	30,44	34,63
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Ribeirão Paciência a jusante de Pará de Minas.

Variável	Padrão			Unidade	PA010	PA010	PA010	PA010
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3
Data de Amostragem					27/02/07	14/05/07	10/08/07	12/11/07
Hora de Amostragem					11:25	11:40	10:55	11:15
Condições do Tempo					Nublado	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				° C	27	25	24	29
Temperatura da Água				° C	24,6	21,5	20,1	27
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		7,1	7,2	6,9	7
Condutividade Elétrica				µmho/cm	115	138	354	271
Turbidez	40	100	100	NTU	38,9	9,31	29,8	33,5
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	136		170	
Sólidos Totais				mg / L	111	100	207	190
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	77		173	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	34	5	34	134
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	41,6		135,7	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	41,6		135,7	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	31,600		41,100	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	20,5		23,7	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	11,1		17,5	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	6,61	7,2	24	8,96
Potássio Dissolvido				mg / L K	2,72		6,57	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	6,64		36,5	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	2,1		8,5	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,1	0,38	0,76	0,59
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,7		0,4	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	1,4	2,9	8,4	7,8
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,41	0,33	< 0,01	0,03
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,163		0,013	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,011381	0,023795	0,031332	0,059594
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	5,2	4,4	2,4	3,5
% OD Saturação				%	67,186	53,234	28,192	47,583
DBO	3	5	10	mg / L	8	10	22	9
DQO				mg / L	14		64	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,004	0,003	0,003
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,06
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	90000	5000	> 160000	8000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	50000	1700	30000	5000
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	90000		90000	
Clorofila a	10	30	60	µg / L		2,136	21,20294	19,224
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,04		0,038	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	8,2		9,5	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	0,008	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	0,005
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000		< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,5	0,55	0,53	1
Magnésio Total				mg / L Mg	2,7		4,2	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,096		0,288	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,03
Toxicidade Crônica								
IQA					46,01	50,39	29,79	43,30
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio São João a montante da confluência com o rio
Pará.

Variável	Padrão			Unidade	PA011	PA011	PA011	PA011
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Data de Amostragem					27/02/07	14/05/07	10/08/07	12/11/07
Hora de Amostragem					12:20	13:15	12:00	11:55
Condições do Tempo					Nublado	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				° C	28	26	26	29
Temperatura da Água				° C	26,2	25	22,3	27,3
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		7,2	7,2	6,8	6,5
Condutividade Elétrica				µmho/cm	86,9	104	123	147
Turbidez	40	100	100	NTU	26,9	10,2	5,8	9,75
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	97		32	
Sólidos Totais				mg / L	98	93	102	114
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	72		90	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	26	9	12	12
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	28,5		32,4	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	28,5		32,4	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	23,000		25,200	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	17,9		23,1	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	5,1		2,2	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	3,93	5,49	8,33	7,38
Potássio Dissolvido				mg / L K	2,54		3,45	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	6,56		15,3	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	3,8		9,4	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,07	0,12	0,19	0,2
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,5		0,4	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	0,3	0,3	0,5	0,3
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,2	0,42	0,21	0,18
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,047		0,061	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,003425	0,003152	0,001737	0,000743
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,3	6,1	7,8	5,5
% OD Saturação				%	83,475	78,796	95,153	74,597
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	4	5	< 2
DQO				mg / L	6		28	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,003	< 0,001	0,002
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	5000	5000	2200	700
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	3000	1100	700	300
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	> 160000		2300	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	10,68	4,806	60,07978	55,536
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL			614,2	19458,89
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,049		0,032	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	7,2		9,2	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000		< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,64	0,7	0,16	0,2
Magnésio Total				mg / L Mg	1,2		0,5	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,083		0,073	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,04
Toxicidade Crônica								
IQA					62,47	63,93	65,38	67,01
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Pará em Velho da Taipa.

Variável	Padrão			Unidade	PA013	PA013	PA013	PA013
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Data de Amostragem					27/02/07	14/05/07	10/08/07	12/11/07
Hora de Amostragem					14:05	14:05	13:20	13:15
Condições do Tempo					Nublado	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				°C	28	27	27	30
Temperatura da Água				°C	26,4	25	23,7	29,2
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		7,2	7,2	7,1	6,6
Condutividade Elétrica				µmho/cm	55,5	59,2	64,7	75,9
Turbidez	40	100	100	NTU	57,8	1,38	5,43	11,7
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	192		35	
Sólidos Totais				mg / L	100	66	61	78
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	60		59	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	40	6	2	16
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	21		22,3	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	21		22,3	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	15,900		16,700	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	12,3		11,2	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	3,6		5,5	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	2,26	3,13	2,82	3,77
Potássio Dissolvido				mg / L K	1,95		2,13	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	3,83		6,93	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	< 1		3,5	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,07	0,06	0,1	0,16
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,6		0,3	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	< 0,1	0,3	< 0,1	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,08	0,2	0,05	0,24
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,016		0,052	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,001158	0,003152	0,000763	0,000355
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,8	6,9	8,1	7,4
% OD Saturação				%	90,481	89,128	101,784	104,488
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	3	< 2	< 2
DQO				mg / L	< 5		12	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,002	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	0,06	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	8000	300	1100	13000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	5000	170	500	1700
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	> 160000		140	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	2,937	1,958	16,02	14,37692
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,048		0,031	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	4,9		4,5	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000		< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,69	0,35	0,2	0,16
Magnésio Total				mg / L Mg	0,9		1,3	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,065		0,042	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	0,005	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005		< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Toxicidade Crônica								
IQA					59,12	75,75	72,19	64,05
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Lambari na MG 050 no município de Pedra do Indaiá

Variável	Padrão			Unidade	PA040
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2
UPGRH					
Classe de Enquadramento					Classe 1
Data de Amostragem					08/11/07
Hora de Amostragem					14:25
Condições do Tempo					Chuvoso
Temperatura do Ar				° C	21
Temperatura da Água				° C	23,9
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,3
Condutividade Elétrica				µmho/cm	40,9
Turbidez	40	100	100	NTU	44,8
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	
Sólidos Totais				mg / L	106
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	46
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	1,3
Potássio Dissolvido				mg / L K	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,07
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000123
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,8
% OD Saturação				%	89,170
DBO	3	5	10	mg / L	
DQO				mg / L	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	8000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	5000
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	13,35
Feofitina a				µg / L	
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL	
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al	
Alumínio Total				mg / L Al	
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	
Boro Dissolvido				mg / L B	
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu	
Cromo Hexavalente				mg / L Cr	
Cromo Trivalente				mg / L Cr	
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	1,33
Magnésio Total				mg / L Mg	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	
Merúrio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02
Toxicidade Crônica					
IQA					56,45
CT					BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Ribeirão Diamante próximo de sua foz no Rio
Lambari.

Variável	Padrão			Unidade	PA022	PA022	PA022	PA022
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Data de Amostragem					26/02/07	11/05/07	09/08/07	09/11/07
Hora de Amostragem					15:00	15:40	14:40	13:35
Condições do Tempo					Chuvoso	Nublado	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				°C	20	20	26	22
Temperatura da Água				°C	25,7	22	23,1	23,9
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,7	6,8	6,3	6,1
Condutividade Elétrica				µmho/cm	30,9	30,1	36,4	45,1
Turbidez	40	100	100	NTU	50,8	26,8	19,2	58,7
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	153		89	
Sólidos Totais				mg / L	113	75	78	137
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	39	37	45	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	74	38	33	83
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	12,3		12,1	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	12,3		12,1	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	8,900		11,400	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	5,4		6,1	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	3,5		5,3	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	1,1	1,25	1,48	2,14
Potássio Dissolvido				mg / L K	1,6		2,15	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	2,37		3,84	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	< 1		< 1	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	< 0,01	0,05	0,07	0,17
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,5	0,2	0,4	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,11	0,17	0,05	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,006	0,005	0,008	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000702	0,000340	0,000117	0,000078
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	5,1	6,2	7,6	6,3
% OD Saturação				%	68,024	76,457	95,933	80,884
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	< 2	< 2	< 2
DQO				mg / L	7	10	18	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,002	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	11000	8000	500	24000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	800	170	300	5000
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	1700		300	
Clorofila a	10	30	60	µg / L		0,8153548	1,068	
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		0,0015	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,072		0,056	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	2,2		2,4	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,008
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,36	0,34	0,17	1,2
Magnésio Total				mg / L Mg	0,8		1,3	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,067		0,047	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Toxicidade Crônica								
IQA					63,44	71,30	70,66	53,97
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Lambari a montante da confluência com o rio
Pará.

Variável	Padrão			Unidade	PA015	PA015	PA015	PA015
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Data de Amostragem					28/02/07	15/05/07	13/08/07	13/11/07
Hora de Amostragem					9:10	9:30	9:00	10:45
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				° C	24	22	22	23
Temperatura da Água				° C	24,2	22,4	19	26,3
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		7,2	6,8	7	6,7
Condutividade Elétrica				µmho/cm	48,5	48,5	53,6	55,5
Turbidez	40	100	100	NTU	65,1	22,5	15,2	33,4
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	171	82	73	110
Sólidos Totais				mg / L	123	70	64	84
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	55		51	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	68	21	13	26
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	20,3		17,9	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	20,3		17,9	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	14,700		18,200	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	11,5		13,4	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	3,2		4,8	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	0,99	1,2	1,1	1,74
Potássio Dissolvido				mg / L K	1,82		2,19	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	3,11		4,52	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	1,1		< 1	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,04	0,02	0,04	0,09
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,5		0,2	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,1	0,08	0,02	0,02
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,003		< 0,001	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000993	0,000350	0,000433	0,000366
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	7	7	8,1	6,8
% OD Saturação				%	88,897	85,569	92,129	90,289
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	< 2	< 2	< 2
DQO				mg / L	< 5		12	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	2200	500	700	2200
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	1100	220	80	1300
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	500		220	
Clorofila a	10	30	60	µg / L		0,712	4,195714	14,37692
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,069		0,043	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	4,6		5,4	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,35	0,23	0,19	0,93
Magnésio Total				mg / L Mg	0,8		1,2	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,059		0,029	0,037
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Toxicidade Crônica								
IQA					63,98	73,28	78,11	64,62
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Córrego Salobro a jusante do município de
Pompéu

Variável	Padrão			Unidade	PA044
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		
UPGRH					SF2
Classe de Enquadramento					Classe 2
Data de Amostragem					13/11/07
Hora de Amostragem					14:50
Condições do Tempo					Nublado
Temperatura do Ar				° C	27
Temperatura da Água				° C	27,5
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,9
Condutividade Elétrica				µmho/cm	118
Turbidez	40	100	100	NTU	15,5
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	62
Sólidos Totais				mg / L	92
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	15
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	3,6
Potássio Dissolvido				mg / L K	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,05
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000629
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,8
% OD Saturação				%	92,027
DBO	3	5	10	mg / L	< 2
DQO				mg / L	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	500
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	230
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	
Clorofila a	10	30	60	µg / L	0,356
Feofitina a				µg / L	
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL	
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al	
Alumínio Total				mg / L Al	
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	
Boro Dissolvido				mg / L B	
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu	
Cromo Hexavalente				mg / L Cr	
Cromo Trivalente				mg / L Cr	
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	2
Magnésio Total				mg / L Mg	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	0,03
Toxicidade Crônica					

IQA					74,11
CT					BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio do Picão a jusante da cidade de Bom
Despacho

Variável	Padrão			Unidade	PA021	PA021	PA021	PA021
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Data de Amostragem					26/02/07	11/05/07	09/08/07	09/11/07
Hora de Amostragem					10:10	10:30	10:00	9:15
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Chuvoso
Temperatura do Ar				° C	25	20	23	20
Temperatura da Água				° C	24,3	21,1	18,6	22,6
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		6,9	7,3	6,7	6,8
Condutividade Elétrica				µmho/cm	110	120	143	177
Turbidez	40	100	100	NTU	48,1	28,3	20,5	37,3
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	128		59	
Sólidos Totais				mg / L	126	119	110	148
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	73	77	89	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	53	42	21	41
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	53,4		70,1	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	53,4		70,1	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	51,900		68,700	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	43,5		57,3	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	8,4		11,4	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	1,19	1,62	1,6	2,4
Potássio Dissolvido				mg / L K	0,77		1,22	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	1,99		3,4	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	< 1		< 1	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	< 0,01	0,07	0,13	0,14
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,6	0,2	0,3	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	0,2	< 0,1	< 0,1	0,2
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,08	0,14	0,04	0,02
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,005	0,01	0,012	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,001007	0,001002	0,000211	0,000710
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	4,9	6,7	7,8	6,5
% OD Saturação				%	62,095	79,336	87,594	79,456
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	< 2	< 2	< 2
DQO				mg / L	10	8	15	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,003	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	0,06	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	2300	3000	1100	3000
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	300	300	220	1700
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	700		130	
Clorofila a	10	30	60	µg / L		1,1125	2,403	6,408
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,091		0,031	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	17,4		22,9	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,45	0,26	0,18	0,65
Magnésio Total				mg / L Mg	2,1		2,8	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,221		0,047	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	0,04	< 0,02	< 0,02	0,05
Toxicidade Crônica								
IQA					65,90	69,89	70,71	61,21
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Picão a montante da confluência com o rio
Pará.

Variável	Padrão			Unidade	PA017	PA017	PA017	PA017
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Data de Amostragem					28/02/07	15/05/07	13/08/07	13/11/07
Hora de Amostragem					10:20	10:40	10:00	11:40
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				° C	28	24	23	25
Temperatura da Água				° C	26,6	23,1	20,4	26
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		7	6,8	7,2	6,8
Condutividade Elétrica				µmho/cm	111	121	143	157
Turbidez	40	100	100	NTU	27,2	33,2	25,2	32,1
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	111	77	81	156
Sólidos Totais				mg / L	106	120	108	240
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	74		88	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	32	39	20	130
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	52,7		70,6	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	52,7		70,6	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	52,900		72,300	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	45,5		63,3	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	7,4		9,1	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	0,95	0,9	0,88	2,46
Potássio Dissolvido				mg / L K	0,94		1,03	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	1,59		2,47	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	< 1		2,2	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	< 0,01	0,04	0,02	0,09
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,4		0,2	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	3,7 p/ pH <= 7,5 2,0 p/ 7,5 < pH <= 8,0 1,0 p/ 8,0 < pH <= 8,5 0,5 p/ pH > 8,5	13,3 p/ pH <= 7,5 5,6 p/ 7,5 < pH <= 8,0 2,2 p/ 8,0 < pH <= 8,5 1,0 p/ pH > 8,5	mg / L N	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,07	0,13	< 0,01	< 0,01
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,004		0,002	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,000743	0,000368	0,000758	0,000451
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	4	5,7	6,8	5,5
% OD Saturação				%	53,450	70,719	79,673	72,566
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	< 2	< 2	< 2
DQO				mg / L	9		11	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	< 0,001	0,002	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	1300	1300	5000	1400
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	80	300	50	280
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	800		3500	
Clorofila a	10	30	60	µg / L		2,314	1,335	39,16
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,056		0,03	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	18,2		25,3	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,44	0,16	0,12	0,34
Magnésio Total				mg / L Mg	1,8		2,2	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,147	0,082	0,06	0,16
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	0,007
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	0,06	0,04
Toxicidade Crônica								
IQA					69,20	68,09	77,59	66,99
CT					BAIXA	BAIXA	BAIXA	BAIXA



Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas

Rio Pará a montante da confluência com o rio São Francisco.

Variável	Padrão			Unidade	PA019	PA019	PA019	PA019
	Classe 1	Classe 2	Classe 3		SF2	SF2	SF2	SF2
UPGRH								
Classe de Enquadramento	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Data de Amostragem					28/02/07	15/05/07	13/08/07	13/11/07
Hora de Amostragem					11:50	11:55	11:30	13:25
Condições do Tempo					Bom	Bom	Bom	Nublado
Temperatura do Ar				°C	31	29	26	27
Temperatura da Água				°C	26,4	25,1	22,9	27,6
pH	6 a 9	6 a 9	6 a 9		7,2	6,9	7,1	6,7
Condutividade Elétrica				µmho/cm	59,3	74,2	70,1	78,8
Turbidez	40	100	100	NTU	55,1	15,1	7,42	43
Cor Verdadeira	cor natural	75	75	UPt	160		24	
Sólidos Totais				mg / L	118	76	59	96
Sólidos Dissolvidos Totais	500	500	500	mg / L	60		50	
Sólidos Suspensos Totais				mg / L	58	18	9	30
Alcalinidade Total				mg / L CaCO ₃	23,3		24,1	
Alcalinidade de Bicarbonato				mg / L CaCO ₃	23,3		24,1	
Dureza Total				mg / L CaCO ₃	23,700		23,400	
Dureza de Cálcio				mg / L CaCO ₃	15,6		17,2	
Dureza de Magnésio				mg / L CaCO ₃	8,1		6,2	
Cloreto Total	250	250	250	mg / L Cl	1,64	2,23	2,5	3,18
Potássio Dissolvido				mg / L K	1,65		1,96	
Sódio Dissolvido				mg / L Na	3,07		5,77	
Sulfato Total	250	250	250	mg / L SO ₄	1,5		1,9	
Sulfeto	0,002	0,002	0,3	mg / L S	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fósforo Total (limites p/ ambiente lótico)	0,1	0,1	0,15	mg / L P	0,06	0,03	0,12	0,06
Nitrogênio Orgânico				mg / L N	0,4		0,3	
Nitrogênio Amoniacal Total	3,7 p/ pH <=7,5 2,0 p/ 7,5<pH<=8,0 1,0 p/ 8,0<pH<=8,5 0,5 p/ pH>8,5	3,7 p/ pH <=7,5 2,0 p/ 7,5<pH<=8,0 1,0 p/ 8,0<pH<=8,5 0,5 p/ pH>8,5	13,3 p/ pH <=7,5 5,6 p/ 7,5<pH<=8,0 2,2 p/ 8,0<pH<=8,5 1,0 p/ pH>8,5	mg / L N	0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nitrato	10	10	10	mg / L N	0,17	0,17	0,02	0,02
Nitrito	1	1	1	mg / L N	0,005		0,012	
Amônia não Ionizável				mg / L NH ₃	0,002315	0,000533	0,000721	0,000400
OD	> 6	> 5	> 4	mg / L	6,4	6,8	8	7,1
% OD Saturação				%	84,682	87,529	98,283	96,366
DBO	3	5	10	mg / L	< 2	< 2	< 2	< 2
DQO				mg / L	< 5		11	
Cianeto Livre	0,005	0,005	0,022	mg / L CN	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,003	0,003	0,01	mg / L C ₆ H ₅ OH	0,003	0,004	< 0,001	< 0,001
Óleos e Graxas	ausentes	ausentes	ausentes	mg / L	< 1		< 1	
Substâncias Tensoativas	0,5	0,5	0,5	mg / L LAS	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Coliformes Totais				NMP / 100 ml	2800	2200	500	1400
Coliformes Termotolerantes	200	1000	4000	NMP / 100 ml	800	220	< 2	300
Estreptococos Fecais				NMP / 100 ml	130		< 2	
Clorofila a	10	30	60	µg / L		3,56	12,015	12,905
Feofitina a				µg / L				
Densidade de Cianobactérias	20000	50000	100000	cel / mL				
Alumínio Dissolvido	0,1	0,1	0,2	mg / L Al				
Alumínio Total				mg / L Al				
Arsênio Total	0,01	0,01	0,033	mg / L As	< 0,0003		< 0,0003	
Bário Total	0,7	0,7	1	mg / L Ba	0,049		0,029	
Boro Dissolvido				mg / L B				
Boro Total	0,5	0,5	0,75	mg / L B	< 0,07		< 0,07	
Cádmio Total	0,001	0,001	0,01	mg / L Cd	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cálcio Total				mg / L Ca	6,2		6,9	
Chumbo Total	0,01	0,01	0,033	mg / L Pb	< 0,005	0,018	< 0,005	< 0,005
Cobre Dissolvido	0,009	0,009	0,013	mg / L Cu	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Cobre Total				mg / L Cu				
Cromo Hexavalente				mg / L Cr				
Cromo Trivalente				mg / L Cr				
Cromo Total	0,05	0,05	0,05	mg / L Cr	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000	< 0,040000
Ferro Dissolvido	0,3	0,3	5	mg / L Fe	0,46	0,22	0,11	0,63
Magnésio Total				mg / L Mg	2		1,5	
Manganês Total	0,1	0,1	0,5	mg / L Mn	0,075		0,027	
Mercurio Total	0,2	0,2	2	µg / L Hg	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Níquel Total	0,025	0,025	0,025	mg / L Ni	< 0,004	< 0,004	< 0,004	< 0,004
Selênio Total	0,01	0,01	0,05	mg / L Se	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Zinco Total	0,18	0,18	5	mg / L Zn	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Toxicidade Crônica								
IQA					64,82	74,02	87,21	69,77
CT					BAIXA	MÉDIA	BAIXA	BAIXA

Legenda:

9,5: Valores em **vermelho** indicam resultados não conformes em 20% do padrão de classe.

IQA:	Excelente	$90 < \text{IQA} \leq 100$
	Bom	$70 < \text{IQA} \leq 90$
	Médio	$50 < \text{IQA} \leq 70$
	Ruim	$25 < \text{IQA} \leq 50$
	Muito Ruim	$0 < \text{IQA} \leq 25$
CT:	Baixa	Concentração $\leq 1,2 \cdot P$
	Média	$1,2 \cdot P < \text{Concentração} \leq 2 \cdot P$
	Alta	Concentração $> 2 \cdot P$

P = Limite de classe definido na CONAMA No 357/05

Vazão: Inferida por método de regionalização.